

Thuốc tiêm

Vin-Hepa

Thành phần: cho một ống 5 ml chứa:

Dược chất: L-ornithin-L-aspartat 1000 mg

Tá dược: Nước cất pha tiêm vđ..... 5 ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm.

Đóng gói: Hộp 2 vial x 5 ống x 5 ml; Hộp 10 vial x 5 ống x 5 ml.

Dược động học:

L-aspartat và L-ornithin bị đào thải dưới dạng không chuyển hóa qua nước tiểu.

Dược lực học:

L-ornithin tham gia vào chu trình urê, kích thích sự tạo thành acid uric ở gan, qua đó gián tiếp làm giảm nồng độ NH_3 .

L-aspartat kích thích sự tạo thành ϵ -ketoglutarat và glutamat nhằm giảm nồng độ amoniac ở não.

L-aspartat kích thích cho sự tạo thành ATP liên quan đến chu trình T.C.A, kích thích sự chuyển hóa năng lượng giữa ty thể với bào tương, qua đó cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp urê và kích thích cho các chức năng gan khác, đặc biệt là chức năng chuyển hóa mỡ và tái tạo nhu mô gan.

Sự phối hợp L-aspartat và L-ornithin có tác dụng tương hỗ trong làm giảm nồng độ NH_3 .

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các bệnh lý ở gan, viêm gan mạn tính, viêm gan do rượu.

Liều dùng, cách dùng: Thuốc dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Liều dùng thông thường ở người lớn: Tiêm tĩnh mạch chậm 1 ống/ ngày trong tuần đầu điều trị, duy trì liều trên trong vòng 3 - 4 tuần.

Trường hợp bệnh nặng có thể tăng liều tới 2 ống/ ngày.

Chống chỉ định:

Không dùng thuốc cho những bệnh nhân bị nhiễm acid lactat, ngộ độc methanol.

Thận trọng:

Khi dùng thuốc liều cao phải theo dõi nồng độ urê huyết và urê niệu.

Thận trọng với phụ nữ có thai và cho con bú.

Thời kỳ mang thai:

Chưa có các nghiên cứu về độ an toàn khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai.

Chỉ sử dụng thuốc này cho phụ nữ có thai khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị và nguy cơ có thể xảy ra.

Thời kỳ cho con bú:

Chưa có các nghiên cứu về độ an toàn khi sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú.

Chỉ sử dụng thuốc này cho phụ nữ đang cho con bú khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị và nguy cơ có thể xảy ra.

Người vận hành tàu xe, máy móc:

Thuốc có thể gây tác dụng không mong muốn là buồn nôn, do đó hạn chế sử dụng thuốc khi vận hành tàu xe, máy móc.

Tác dụng không mong muốn:

Cảm giác rất bỏng ở thanh quản hoặc buồn nôn có thể xảy ra.

**“ Thông báo cho bác sĩ những
tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”**

Tương tác thuốc: chưa có thông tin.

Tương kỵ: chưa có thông tin.

Quá liều và xử trí:

Không dùng thuốc quá liều quy định.

Khi quá liều xảy ra, không có biện pháp giải độc đặc hiệu. Sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ, gây lợi tiểu bằng truyền dịch.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: NSX.

“Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ”

Để xa tầm tay trẻ em.

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc”

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 777 Đường Mê Linh, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc

ĐT: 02113 861233 Fax: 02113 862774 .

Địa chỉ nhà máy: Thôn Mậu Thông, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc