

“Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc”

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

Thành phần công thức của thuốc: Cho một ống 2 ml chứa:

Thành phần dược chất: Drotaverin hydroclorid40 mg

Thành phần tá dược: Natri metabisulfit, ethanol 96%,

nước để pha thuốc tiêm vđ.....2,0 ml

Dạng bào chế:

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm

Hình thức: Dung dịch màu vàng ánh xanh, đóng trong ống thủy tinh, hàn kín, không rạn nứt, không đen đầu.

pH = 3,0 ÷ 5,0

Chỉ định:

Co thắt dạ dày ruột, hội chứng ruột bị kích thích.

Cơn đau quặn mật và các co thắt đường mật: Sỏi ống và túi mật, viêm túi mật, viêm đường mật.

Cơn đau quặn thận và co thắt niệu: Sỏi thận, sỏi niệu quản, viêm bể thận, viêm bàng quang.

Co thắt tử cung: Đau bụng kinh, dọa xảy thai.

Liều dùng - cách dùng:

Liều dùng:

Người lớn: 1 - 2 ống/lần, 1 - 3 lần/ngày (tổng liều từ 40 mg đến 240 mg mỗi ngày), tiêm dưới da hoặc tiêm bắp.

Trong trường hợp đau quặn cấp tính: Tiêm tĩnh mạch chậm 1 - 2 ống.

Cách dùng:

Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da.

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.

Chống chỉ định:

Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Suy nặng chức năng tim, thận, gan, block nhĩ thất độ II - III.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Chẩn đoán kỹ lưỡng trước khi dùng thuốc để tránh các trường hợp không mong muốn xảy ra như sốc thuốc.

Dự phòng các biện pháp xử lý trong trường hợp bệnh nhân có biểu hiện sốc.

Sau khi sử dụng, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và theo dõi thường xuyên.

Trong thuốc tiêm có chứa natri metabisulfit. Chất này có thể gây phản ứng dị ứng bao gồm các triệu chứng quá mẫn như co thắt phế quản và sốc phản vệ, đặc biệt những người mắc bệnh hen phế quản. Do đó, cần thận trọng khi dùng thuốc trên những bệnh nhân này.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:

Nghiên cứu trên động vật cho thấy chưa có bất kỳ hiện tượng sinh quái thai nào. Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Không dùng thuốc này cho người đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng thuốc bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi dùng thuốc nếu xảy ra các tác dụng không mong muốn thì không nên lái xe, vận hành máy móc hay làm các công việc cần sự tỉnh táo.

Tương tác thuốc: Drotaverin làm giảm tác dụng chống parkinson của Levodopa.

Tương kỵ thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR):

Hiếm gặp, có thể thấy buồn nôn, chóng mặt. Huyết áp tụt nếu tiêm tĩnh mạch nhanh.

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ

những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc”

Quá liều và cách xử trí:

Chưa có báo cáo về các triệu chứng quá liều.

Tuy nhiên, nếu sử dụng quá liều thì nên điều trị hỗ trợ các triệu chứng kịp thời. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Đặc tính dược lực học:

Mã ATC: A03AD02

Drotaverin là thuốc chống co thắt hướng cơ tác dụng trực tiếp lên cơ trơn. Tác động này không liên quan đến hệ thần kinh tự chủ (không thuộc nhóm kháng choline). Drotaverin làm giảm co thắt cơ trơn đặc biệt ở nơi có co thắt.

Đặc tính dược động học:

Sau khi tiêm 2 - 4 phút thuốc bắt đầu có tác dụng, tác dụng tối đa sau 30 phút. Chuyển hóa tại gan bằng hiện tượng glucurono kết hợp. Gắn kết rất ít với protein huyết tương. Thời gian bán hủy là 18 - 22 giờ.

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vi x 5 ống x 2 ml. Hộp 5 vi x 10 ống x 2 ml

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH PHÚC

Số 777 Đường Mê Linh - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 02113 861233

Fax: 02113 862774

Địa chỉ nhà máy:

Thôn Mậu Thông - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc