



Rx Thuốc bán theo đơn

Thuốc dùng cho bệnh viện

DUNG DỊCH THUỐC TIÊM

VITAMIN B1

THIAMIN HYDROCLORID

100mg/2ml - TB

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO BỆNH NHÂN

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em

Báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

1. Thành phần, hàm lượng: Cho 1 ống 2ml:

Thiamin hydroclorid.....100 mg

Tá dược: Dinatri edetat, acid hydroclorid 0,1N, nước cất pha tiêm vừa đủ 2 ml

2. Mô tả sản phẩm: Ống thuốc tiêm 2 ml, bên trong chứa dung dịch trong suốt, không màu, không có tiểu phân quan sát được bằng mắt thường.

3. Quy cách đóng gói: Ống 2 ml. Hộp 20 ống, hộp 50 ống, hộp 100 ống, kèm hướng dẫn sử dụng.

4. Thuốc dùng cho bệnh gì? Điều trị hội chứng thiếu vitamin B1.

5. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

- Thuốc dùng cho người lớn: Tiêm bắp dùng 1 - 2 ống/ngày.

6. Khi nào không nên dùng thuốc này?

Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

7. Tác dụng không mong muốn:

Vitamin B1 rất hiếm khi gây ra tác dụng không mong muốn và thường theo kiểu dị ứng: ban da, ngứa, mề đay, khó thở, ra nhiều mồ hôi...

Các tác dụng không mong muốn hiếm gặp (xảy ra ở ít hơn 1 trong 1000 người):

+ **Toàn thân:** Ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn.

+ **Tuần hoàn:** Tăng huyết áp cấp.

+ **Da:** Ban da, ngứa, mề đay

+ **Hô hấp:** Khó thở.

+ **Phản ứng khác:** Kích thích tại chỗ tiêm

8. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang dùng thuốc này?

Thuốc này có thể tăng tác dụng của thuốc chẹn thần kinh cơ.

9. Cần làm gì một lần quên không dùng thuốc?

Nếu quên dùng thuốc một lần, bỏ qua và tiếp tục dùng thuốc theo đúng liều lượng chỉ dẫn. Không được gấp đôi liều dùng sau khi quên thuốc một lần.

10. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có báo cáo về việc dùng thuốc quá liều.

12. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?

Việc dùng thuốc này quá liều thường không gây hại tuy nhiên có thể hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu lo lắng hoặc thấy nổi mẩn đỏ sau khi dùng thuốc.

13. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này?

13.1 Với phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thời kì mang thai: không có nguy cơ nào được biết.

- Thời kì cho con bú: mẹ dùng thiamin vẫn tiếp tục cho con bú được.

13.2 Với người lái xe và vận hành máy móc: chưa ghi nhận được ảnh hưởng bất lợi lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác

14. Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ?

Cần tham vấn bác sĩ khi đang dùng thuốc khác, hoặc khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

15. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. Các đặc tính dược lực học, dược động học:

1.1. Dược lực học:

Nhóm dược lý và mã ATC: Vitamin B1 thuộc nhóm khoáng chất và vitamin.

Mã ATC: A11DA01.

Khi vào cơ thể Vitamin B1 sẽ được chuyển hóa thành thiamin pyrophosphat là một coenzym có hoạt tính sinh học. Coenzym này chuyển hóa carbohydrat làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha - cetoacid như pyruvat và alpha - cetooglutarat và trong việc sử dụng pentose trong chu trình hexose monophosphat. Thiếu hụt thiamin sẽ gây ra beriberi (bệnh tê phù). Thiếu hụt nhẹ biểu hiện trên hệ thần kinh (beriberi khô) như viêm dây thần kinh ngoại biên, rối loạn cảm giác các chi, có thể tăng hoặc mất cảm giác. Trạng lực cơ giảm dần và có thể gây ra chứng bại chi hoặc liệt một chi nào đó. Thiếu hụt trầm trọng gây rối loạn nhân cách, trầm cảm, thiếu sáng kiến và trí nhớ kém như trong bệnh não Wernicke. Các triệu chứng tim mạch do thiếu hụt thiamin bao gồm khó thở khi gắng sức, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh và các rối loạn khác trên tim.

1.2. Dược động học:

Hấp thu: Thuốc hấp thu tốt qua tiêm bắp

Phân bố: Thuốc phân bố chủ yếu ở mô và sữa

Thải trừ: Thuốc bị thải trừ qua nước tiểu.

2. Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định.

2.1. Chỉ định:

Điều trị hội chứng thiếu vitamin B1.

2.2. Liều dùng, cách dùng:

- Thuốc dùng cho người lớn: Tiêm bắp dùng 1 - 2 ống/ngày.

2.3. Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

3. Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

- Với phụ nữ có thai và cho con bú: không có nguy cơ nào được biết

- Với người lái xe và vận hành máy móc: chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác

4. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Thiamin có thể tăng tác dụng của thuốc chẹn thần kinh cơ

5. Tác dụng không mong muốn:

- Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm và thường theo kiểu dị ứng: ban da, ngứa, mề đay, khó thở, ra nhiều mồ hôi...

- Hiếm gặp, ADR < 1/1000:

+ **Toàn thân:** Ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn.

+ **Tuần hoàn:** Tăng huyết áp cấp.

+ **Da:** Ban da, ngứa, mề đay

+ **Hô hấp:** Khó thở.

+ **Phản ứng khác:** Kích thích tại chỗ tiêm

6. Quá liều và cách xử trí:

Chưa có báo cáo về việc dùng thuốc quá liều. Không dùng quá liều chỉ định

7. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo: Không có.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3 853848 - Fax: 0220.3 853848

Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn