

ZENTANIL

(Acetyl leucin 1 g/ 10 ml)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.

Tên thuốc: Zentanil

Thành phần: Mỗi lọ nhựa 10 ml chứa:

Hoạt chất: Acetyl leucin 1 g

Tá dược: Monoethanolamin, nước cất pha tiêm.

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm.

Đường dùng: Tiêm tĩnh mạch.

Quy cách đóng gói

Hộp 10 lọ x 10 ml.

Đặc tính dược lực học

Thuốc trị chóng mặt.

Chưa rõ cơ chế tác dụng.

Đặc tính dược động học

Sau khi tiêm 1g thuốc qua đường tĩnh mạch, động học gồm 2 phần với một giai đoạn phân phối rất nhanh (thời gian bán hủy trung bình 0,11 giờ) và một kỳ đào thải nhanh (thời gian bán hủy trung bình 1,08 giờ).

Chỉ định

Điều trị triệu chứng cơn chóng mặt.

Thuốc chỉ dùng khi có sự kê đơn của bác sĩ

Liều lượng và cách dùng

Người lớn:

1000 mg mỗi ngày (có thể tăng lên 2000 mg mỗi ngày nếu cần thiết). Tiêm tĩnh mạch trực tiếp.

Thời gian điều trị thay đổi tùy theo tiến triển lâm sàng.

Chống chỉ định

Người có tiền sử dị ứng với acetyl leucin hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

Quá mẫn hoặc không dung nạp với gluten.

Các cơn hạ huyết áp có thể xảy ra khi tiêm quá nhanh.

Tác dụng không mong muốn

Phản ứng da (ban đỏ, nổi mề đay) rất hiếm khi quan sát thấy.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp phải các tác dụng phụ của thuốc.

Tương tác thuốc

Để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ bất kỳ thuốc điều trị nào hiện đang sử dụng.

Thận trọng và cảnh báo

Sử dụng thuốc theo sự kê đơn của bác sĩ. Thuốc được sử dụng qua đường tiêm tĩnh mạch (Tiêm bắp có thể gây ra những phản ứng tại chỗ).

Thời kỳ mang thai và cho con bú

Nên tránh sử dụng thuốc này khi đang mang thai hoặc cho con bú.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Chưa có dữ liệu nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, thận trọng được khuyến liên quan đến bệnh được điều trị (cơn chóng mặt).

Quá liều và xử trí

Nếu dùng thuốc nhiều hơn liều phải dùng, cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Bảo quản

Bảo quản trong bao bì kín, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TẮM TAY TRẺ EM

Nhà sản xuất

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.