

Hướng dẫn sử dụng thuốc

ĐẠI TRÀNG HOÀN P/H

Hộp 10 gói x 4g hoàn cứng

Viêm đại tràng mạn tính là một bệnh đường tiêu hóa thường gặp. Bệnh khởi phát từ những đợt viêm nhiễm cấp tính đường tiêu hóa nhưng không được điều trị triệt để (bệnh vừa hết triệu chứng đã thôi dùng thuốc).

Biểu hiện chính của viêm đại tràng là tình trạng rối loạn tiêu hóa (hay đau bụng, đầy hơi, ăn uống không ngon miệng, đi ngoài phân không thành khuôn, có lẫn chất nhầy của niêm mạc ruột, liên tục có cảm giác mót rặn muốn đi ngoài). Bệnh thường biểu hiện rõ nhất khi ăn những thức ăn lạ, chất tanh, uống rượu bia hoặc sau khi uống sữa.

Viêm đại tràng mạn tính kéo dài nhiều năm gây suy nhược cơ thể và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư đại tràng hiện nay.

Đại tràng hoàn P/H được bào chế từ thảo dược, có tác dụng điều hòa can tỳ, ôn trung, giúp tỳ vị mạnh lên, can khí thư thái, đều đặn.

Thành phần: (Cho 1 gói x 4g)

Bột Bạch truật (<i>Pulveres rhizomae atractylodis macrocephalae</i>)	0,65g
Bột Hoàng liên (<i>Pulveres rhizomae coptidis</i>)	0,54g
Bột Hoài sơn (<i>Pulveres tuberis dioscoreae persimilis</i>)	0,42g
Bột Hoàng đằng (<i>Pulveres caulidis et Radix fibraureae</i>)	0,40g
Bột Mộc hương (<i>Pulveres radicis saussureae lappae</i>)	0,35g
Bột Bạch linh (<i>Pulveres poriae</i>)	0,35g
Bột Sa nhân (<i>Pulveres fructi amomi</i>)	0,35g
Bột Bạch thược (<i>Pulveres radicis paeoniae lactiflorae</i>)	0,35g
Bột Trần bì (<i>Pulveres pericarpium citri reticulatae</i>)	0,25g
Cao đặc Cam thảo (<i>Extractum radicis glycyrrhizae</i>)	0,04g
(tương đương với 0,4g dược liệu)	
Cao đặc Đảng sâm (<i>Extractum radicis codonopsis pilosulae</i>)	0,22g
(tương đương với 733mg dược liệu)	
Mật ong (<i>Mel</i>)	về 4g

Dạng bào chế: Hoàn cứng.

Quy định đóng gói: Hộp 10 gói x 4g hoàn cứng

Chỉ định: Điều trị viêm đại tràng cấp và mãn tính, với các biểu hiện: rối loạn tiêu hóa, miệng đắng không muốn ăn, đau bụng đầy hơi, chậm tiêu hóa, hay đi ngoài, phân rối loạn (lỏng nát), cảm giác đi ngoài không hết, hay mót rặn.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 gói, uống sau bữa ăn.

- Dợt điều trị 4 - 6 tuần.

Tác dụng phụ: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao, phụ nữ có thai.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú: Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú để đảm bảo an toàn cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

Trong thời gian sử dụng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn sống, lạnh, ôi, thiu.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo với bác sĩ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG



PHÚC HƯNG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Trụ sở: 96 - 98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy GMP WHO: CCN Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
Tel: 024.33826222 * Fax: 024.33978024
Website: www.dongduocphuchung.com.vn



Điện thoại tư vấn
1800 545435