

Số: 115 /BVĐKVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc kháng sinh BASMICIN 400

Để có thêm lựa chọn thuốc kháng sinh cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc BASMICIN 400. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. THÀNH PHẦN THUỐC

- Thành phần:** Mỗi lọ 200 ml chứa 400 mg Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin lactat).
- Nhóm dược lý:** Ciprofloxacin là thuốc kháng sinh nhóm fluoroquinolon.
- Cơ chế tác dụng:** Thuốc ức chế enzyme DNA gyrase và topoisomerase IV, ngăn chặn sự sao chép của nhiễm sắc thể khiến vi khuẩn không sinh sản được nhanh chóng.
- Dạng bào chế:** Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch, thuốc đóng chai thủy tinh trung tính không màu, dung tích 200ml, đậy kín bằng nút cao su, bọc ngoài bằng nhôm.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định	Liều dùng	Thời gian điều trị
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu	200 - 400 mg x 2 lần/ngày	7 - 14 ngày
Nhiễm khuẩn đường hô hấp	400 mg x 2 lần/ngày	7 - 14 ngày
Nhiễm khuẩn ở da, mô mềm	400 mg x 2 - 3 lần/ngày	7 - 14 ngày
Nhiễm khuẩn xương	400 mg x 2 - 3 lần/ngày	Tối đa đến 3 tháng
Nhiễm khuẩn nặng (Nhiễm khuẩn bệnh viện, nhiễm khuẩn huyết, điều trị nhiễm khuẩn ở người bị suy giảm miễn dịch)	400 mg x 2 - 3 lần/ngày	10 - 14 ngày
Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn	400 mg x 2 lần/ngày	10 ngày

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người có tiền sử quá mẫn với ciprofloxacin, các thuốc nhóm quinolon hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng ciprofloxacin đồng thời với tizanidin.

4. TƯƠNG TÁC THUỐC

- **Thuốc chống viêm không steroid (NSAID):** Sử dụng đồng thời sẽ làm tăng tác dụng phụ của ciprofloxacin.
- **Theophyllin:** Ciprofloxacin làm tăng nồng độ theophyllin trong huyết thanh, cần kiểm tra nồng độ theophyllin và giảm liều nếu cần thiết.
- **Warfarin:** Khi dùng phối hợp có thể gây hạ prothrombin, cần kiểm tra thường xuyên prothrombin huyết và điều chỉnh liều thuốc chống đông máu.
- **Cyclosporin:** Có thể gây tăng nhất thời creatinin huyết thanh, cần kiểm tra creatinin huyết mỗi tuần 2 lần.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chi đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKL. NGUYỄN VĂN ĐỐI