

Số: 40/BVVP MED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 08 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc giải độc BFS-DEPARA 2000mg/10ml

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc BFS-DEPARA 2000mg/10ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần của thuốc

- ❖ Thuốc có thành phần hoạt chất là acetylcystein 2000mg, làm giảm độc tính trên gan của n-acetyl-p-benzo-quinonimin (là chất chuyển hóa trung gian của paracetamol).
- ❖ Cơ chế tác dụng:
 - Giai đoạn đầu: Acetylcystein đóng vai trò như một tiền chất để tổng hợp glutathion giúp duy trì nồng độ glutathion đủ để bất hoạt NAPQI;
 - Giai đoạn sau: làm giảm các nhóm thiol bị oxy hóa trong các enzym chuyển hóa.
- ❖ Dạng bào chế: dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền, dung dịch trong suốt, không chứa tiểu phân nhìn thấy bằng mắt thường.

2. Chỉ định của thuốc

- ❖ **Chỉ định:** thuốc giải độc trong quá liều paracetamol.

❖ **Liều dùng và cách dùng:**

Tổng liều trên người lớn và trẻ em là 300mg/kg chia thành 3 liều, truyền tĩnh mạch trong 21 giờ

- Liều 1: 150mg/kg truyền trong 1 giờ;
- Liều 2: 50mg/kg bắt đầu sau khi kết thúc liều 1 và truyền trong 4 giờ;
- Liều 3: 100mg/kg bắt đầu sau khi kết thúc liều 2 và truyền trong 16 giờ.

Sử dụng dung dịch glucose 5% hoặc natri clorid 0.9% để pha loãng trước khi tiêm truyền tĩnh mạch, thể tích dịch dùng để pha loãng được khuyến cáo theo cân nặng như sau:

Đối tượng và cân nặng	Thể tích dung dịch Glucose 5%/NaCl 0.9% dùng để pha loãng DEPARA đậm đặc		
	Liều 1: 150mg/kg	Liều 2: 50mg/kg	Liều 3: 100mg/kg
Người lớn và TE > 40kg	200ml	500ml	1000ml
TE 20-40 kg	100ml	250ml	500ml
TE < 20kg và trẻ sơ sinh	3ml/kg	7ml/kg	14ml/kg

3. Chống chỉ định của thuốc

Chống chỉ định ở những bệnh nhân quá mẫn cảm với acetylcystein hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ HDSD đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**