

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc điều trị tăng huyết áp COVERAM 5mg/5mg

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc COVERAM 5mg/5mg. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây:

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- **Thành phần:** thuốc ở dạng phối hợp bao gồm các hoạt chất perindopril arginin 5mg là thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin và amlodipin 5mg là thuốc ức chế dòng ion canxi thuộc nhóm dihydropyridin. Thuốc phối hợp 2 thành phần hạ huyết áp với các cơ chế bổ sung cho nhau giúp kiểm soát huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp.
- **Cơ chế tác dụng:**
 - ✧ Amlodipin ức chế dòng xuyên màng ion calci đi vào cơ tim và cơ trơn mạch máu làm giãn trực tiếp cơ trơn mạch máu dẫn đến hạ huyết áp.
 - ✧ Perindopril ức chế enzym chuyển angiotensin I thành angiotensin II nên giãn mạch, giảm tiết andosteron nên tăng thải muối nước, mặt khác còn ức chế sự thoái hóa bradykinin làm kéo dài tác dụng giãn mạch và hạ huyết áp.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

- ❖ **Chỉ định:** điều trị tăng huyết áp và/hoặc bệnh động mạch vành ổn định ở bệnh nhân đã dùng perindopril và amlodipin dưới dạng các viên riêng lẻ cùng liều.
- ❖ **Liều dùng:** 1 viên/lần/ngày vào buổi sáng, trước bữa ăn.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Mẫn cảm với hoạt chất hoặc thuốc ức chế enzym chuyển khác;
- Tiền sử phù mạch liên quan đến điều trị bằng thuốc ức chế enzym chuyển dạng angiotensin trước đó, phù mạch mang tính chất di truyền hoặc vô căn;
- Giai đoạn 2 và 3 của thời kỳ mang thai;
- Hạ huyết áp nặng;
- Sốc, bao gồm cả sốc tim;

- Tắc nghẽn đường ra tâm thất trái;
- Suy tim huyết động không ổn định sau cơn nhồi máu cơ tim cấp;
- Điều trị đồng thời với các thuốc chứa aliskiren ở bệnh nhân tiểu đường hoặc suy thận;
- Sử dụng đồng thời với sacubitril/valsartan;
- Hẹp động mạch thận hai bên hoặc hẹp động mạch đáng kể dẫn đến còn chức năng thận một bên.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THUỐC



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**