

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc giải độc và điều trị ung thư Calci Folinat 10ml

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Calci Folinat 10ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây:

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- **Thành phần:** thuốc có hoạt chất là acid folinic 100mg/10ml, là dẫn xuất của 5-formyl của acid tetrahydrofolic (dạng có hoạt tính của acid folic).
- **Cơ chế tác dụng:**
 - ❖ Acid folinic tham gia như một đồng yếu tố của thymidylat synthetase, enzym chủ chốt trong tổng hợp DNA;
 - ❖ Acid folinic phong bế sự biến đổi acid folic thành tetrahydrofolat bằng cách gắn với enzym dihydrofolat reductase.

2. Chỉ định và liều dùng

❖ **Chỉ định:**

- Phòng và điều trị ngộ độc do các chất đối kháng với acid folic (dùng liều cao methotrexat);
- Dự phòng và điều trị độc tính của các thuốc như pyrimethamin, trimethoprim, sulfasalazin;
- Dùng phối hợp với fluorouracil trong điều trị ung thư đại - trực tràng.

❖ **Cách dùng:**

- Nên dùng càng sớm càng tốt khi quá liều chất kháng acid folic để giảm độc tính trên máu, nếu quá 4 giờ có thể việc giải độc không còn hiệu quả;
- Acid folic được dùng đường uống, tiêm bắp, tiêm hoặc truyền tĩnh mạch, **không dùng tiêm nội tủy**;
- Tiêm tĩnh mạch được tiến hành trong 5-10 phút vì thuốc chứa calci, khi truyền tĩnh mạch thuốc được pha loãng trong dung dịch natri clorid 0.9% đến nồng độ cuối cùng trong khoảng từ 1.5mg/ml đến 0.2mg/ml acid folinic, với dung dịch tiêm truyền glucose 5% đến nồng độ cuối cùng 1.5mg/ml;
- Nếu bệnh nhân có rối loạn tiêu hóa và cần liều > 25mg thì nên dùng đường tiêm thay vì đường uống, sự hấp thu acid folic có thể đạt trạng thái bão hòa, do đó liều dùng đường uống được khuyến cáo không vượt quá 25mg.

Chỉ định	Liều dùng
Giải độc methotrexat liều cao	Truyền tĩnh mạch calci folinat với một liều tương đương 75mg acid folinic trong vòng 12 giờ, tiếp theo đó tiêm bắp 12mg cứ 6 giờ 1 lần, cho 4 liều.
Giảm thải trừ hoặc quá liều do vô ý	15mg acid folinic liều đầu tiên được dùng 12-24 giờ sau khi bắt đầu truyền methotrexat, cùng liều như vậy được dùng cứ 6 giờ một lần trong 24 giờ.
Ung thư đại trực tràng tiến triển	- Acid folinic liều 200mg/m² tiêm tĩnh mạch chậm trong ít nhất 3 phút, sau đó là 5-fluorouracil liều 370mg/m² tiêm tĩnh mạch - Acid folinic liều 20mg/m² tiêm tĩnh mạch tiếp theo là 5-fluorouracil liều 425mg/m² tiêm tĩnh mạch x 5 ngày, liệu trình thứ 2 bắt đầu sau 4 tuần.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc;
- Thiếu máu ác tính hoặc thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ thứ phát do thiếu vitamin B12 vì có thể che khuất triệu chứng huyết học trong khi các biến chứng thần kinh vẫn tiến triển.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**