

Số: *116* /BVĐKVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc kháng sinh CEPEMID 1,5g

Để có thêm lựa chọn thuốc kháng sinh cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc CEPEMID 1,5g. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. THÀNH PHẦN VÀ DẠNG BÀO CHẾ

- **Thành phần:** Mỗi lọ chứa Imipenem (monohydrat) 0,75g và Cilastatin (natri) 0,75g.
- **Nhóm dược lý:** Kháng sinh nhóm Carbapenem phối hợp chất ức chế enzyme dehydropeptidase-I.
- **Cơ chế tác dụng:** Imipenem tiêu diệt vi khuẩn bằng cách ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn do liên kết với protein gắn penicillin. Kết hợp với cilastatin giúp ngăn phân hủy imipenem tại thận => tăng nồng độ và kéo dài thời gian tác dụng của thuốc.
- **Dạng bào chế:** Thuốc bột pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch.

2. CHỈ ĐỊNH CỦA THUỐC

- Nhiễm trùng ổ bụng;
- Viêm phổi nặng kể cả nhiễm trùng bệnh viện và viêm phổi máy thở;
- Nhiễm trùng trong chuyển dạ và sau sinh;
- Nhiễm trùng đường tiết niệu phức tạp;
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm phức tạp;
- Nhiễm trùng huyết.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc;
- Quá mẫn với các kháng sinh carbapenem khác;
- Sốc phản vệ hoặc phản ứng da nặng với các betalactam khác như penicillin, cephalosporin.

3. QUY TRÌNH PHA THUỐC

- **Pha loãng:** Hòa tan 1 lọ Cepemid 1,5g vào dung môi tương thích (NaCl 0,9%, Dextrose 5% hoặc 10%, Manitol 5% hoặc 10%). Lắc kỹ cho đến khi dung dịch trong suốt hoàn toàn. Tiêm bắp hoặc truyền tĩnh mạch trong thời gian 30-60 phút.
- **Xử trí tại chỗ:** Nếu bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn/nôn trong khi truyền, cần giảm tốc độ truyền.
- **Độ ổn định:** Dung dịch sau pha ổn định 4 giờ ở 25°C và 24 giờ ở 4°C.

5. TƯƠNG TÁC THUỐC

- Acid Valproic: Gây giảm nồng độ Acid Valproic xuống dưới ngưỡng điều trị, tăng nguy cơ co giật. Khuyến cáo không phối hợp.
- Ganciclovir: Tăng nguy cơ co giật toàn thân.

- Probenecid: Làm tăng nồng độ và kéo dài thời gian bán thải của thuốc.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c):
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo):
- Các khoa lâm sàng:
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**