

Số: 627/BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc điều trị ung thư IRINOTECAN BIDIPHAR 100mg/5ml

Để có thêm lựa chọn thuốc điều trị ung thư cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc IRINOTECAN BIDIPHAR 100mg/5ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây:

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có thành phần hoạt chất là irinotecan hydroclorid trihydrat 100mg, là một dẫn xuất bán tổng hợp của camptothecin, chất ức chế topoisomerase I gây độc tế bào.
- Cơ chế tác dụng: irinotecan được chuyển hóa bởi carboxylesterase trong hầu hết các mô thành SN-38, sự ức chế DNA topoisomerase I bởi irinotecan hoặc SN-38 gây ra tổn thương DNA đơn sợi gây chặn chạc ba sao mã DNA nhờ đó có khả năng gây độc tế bào.
- Dạng bào chế: dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch, trong suốt, màu vàng nhạt đến vàng.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

Chỉ định	Liều dùng
Điều trị ung thư ruột kết - trực tràng tiến triển	- Trong điều trị đơn độc: irinotecan 350 mg/m ² truyền tĩnh mạch trong thời gian 30-90 phút mỗi 3 tuần
Irinotecan kết hợp với cetuximab điều trị ung thư ruột kết - trực tràng di căn với gen KRAS wild-type, có biểu hiện của thụ thể yếu tố tăng sinh biểu bì, chưa được điều trị ung thư di căn trước đó hoặc sau khi thất bại với liệu pháp thuốc gây độc tế bào chưa irinotecan	- Trong điều trị phối hợp: irinotecan 100mg/5ml phối hợp với 5FU/FA trong liệu trình dùng thuốc 2 tuần 1 lần + Irinotecan 100mg/5ml là 180 mg/m ² dùng 2 tuần/lần đường tĩnh mạch trong thời gian 30-90 phút, sau đó truyền acid folinic và 5-fluorouracil
Irinotecan kết hợp với 5-fluorouracil, acid folinic và bevacizumab được chỉ định đầu tay cho ung thư biểu mô ruột kết hoặc trực tràng di căn	+ Liều dùng của cetuximab, bevacizumab, capecitabin tham khảo thêm tờ HDSD của sản phẩm.
Irinotecan kết hợp với capecitabin, có hoặc không bevacizumab điều trị cho ung thư biểu mô ruột kết - trực tràng di căn	

Cách dùng: Rút lượng dung dịch Irinotecan 100mg/55ml cần dùng ra từ lọ bằng ống tiêm đã hiệu chuẩn và tiêm vào hoặc chai truyền 250ml chứa dung dịch NaCl 0.9% hoặc dung dịch glucose 5%, sau đó trộn đều dung dịch tiêm truyền bằng cách xoay vòng bằng tay.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Bệnh viêm ruột mãn tính và/hoặc tắc ruột;
- Quá mẫn với hoạt chất hoặc một trong các tá dược của thuốc;
- Phụ nữ cho con bú;
- Bilirubin > 3 lần giới hạn trên phạm vi của bình thường;
- Suy tủy xương nặng;
- Tình trạng hoạt động WHO > 2;
- Vắc xin sống bị giảm độc lực.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THUỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI