

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc điều trị tăng huyết áp NATRIXAM 1.5mg/5mg

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc NATRIXAM 1.5mg/5mg. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây:

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có thành phần hoạt chất là indapamid 1.5mg là dẫn chất sulfonamid có nhân indol, ức chế tái hấp thu natri tại giai đoạn pha loãng của vỏ thận kết hợp với amlodipin 5mg một thuốc chẹn kênh calci thuộc nhóm dihydropyridin giúp làm tăng hiệu quả hạ huyết áp.
- Cơ chế tác dụng: indapamid làm tăng thải trừ ion natri, clo do đó làm tăng bài niệu và có tác dụng hạ huyết áp, amlodipin ức chế dòng xuyên màng ion calci đi vào cơ tim và cơ trơn mạch máu làm giãn trực tiếp cơ trơn mạch máu dẫn đến hạ huyết áp.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

- ❖ Chỉ định: điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân đã dùng indapamid và amlodipin riêng rẽ có cùng hàm lượng.
- ❖ Liều dùng: 1 viên/lần/ngày vào buổi sáng, uống nguyên viên với nước và không nhai thuốc.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, với các thuốc sulfonamid khác, với các dẫn chất dihydropyridin hoặc với bất cứ tá dược nào;
- Suy thận nặng ($ClCr < 30$ ml/phút)
- Suy gan nặng hoặc bệnh não gan do gan gây ra;
- Nồng độ kali trong máu thấp;
- Phụ nữ đang cho con bú;
- Hạ huyết áp nghiêm trọng;

- Sốc;
- Tắc nghẽn đường ra của tâm thất trái;
- Suy tim có huyết động không ổn định sau nhồi máu cơ tim cấp.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THUỐC



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**