

Số: 624/BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống ung thư Navelbine 20mg

Để có thêm lựa chọn thuốc điều trị chống ung thư cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Navelbine 20mg. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây:

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

❖ **Thành phần:**

Thuốc có thành phần hoạt chất vinorelbine 20mg, là thuốc chống phân bào bán tổng hợp thuộc họ vinca alkaloid, ở cấp độ sinh học phân tử nó tác động lên trạng thái cân bằng động của tubulin trong bộ vi ống của tế bào.

❖ **Cơ chế tác dụng:**

- Ức chế sự trùng hợp tubulin và liên kết ưu tiên với các vi ống đang phân bào, ảnh hưởng đến các vi ống sợi trục tế bào thần kinh chỉ ở nồng độ cao;

- Ức chế phân bào ở giai đoạn MetaPhase của quá trình M gây chết tế bào ở kỳ trung gian hoặc ở lần phân bào tiếp theo.

❖ **Dạng bào chế:** viên nang mềm màu nâu nhạt, hộp chứa 1 vỉ x 1 viên.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

Chỉ định	Liều dùng	
Ung thư phổi không tế bào nhỏ Ung thư vú di căn	Phác đồ đơn chất	- 3 tuần đầu: 60mg/m ² / lần/tuần - Từ tuần 4 trở đi: 80mg/m ² / lần/tuần (nếu số lượng bạch cầu hạt trung tính < 500/mm ³ hoặc từ 500-1000/mm ³ hơn 1 lần thì nên hoãn dùng thuốc cho đến khi số lượng bạch cầu hạt trung tính trở về bình thường hoặc giảm liều xuống 60mg/m ² /tuần trong 3 tuần tiếp theo)

	Phác đồ kết hợp	Liều uống 80mg/m ² tương đương với 30mg/m ² tiêm truyền tĩnh mạch Liều uống 60mg/m ² tương đương 25 mg/m ² tiêm truyền tĩnh mạch Đối với phác đồ kết hợp, liều dùng và cách dùng sẽ theo lệ hoạch điều trị Viên Navelbine khuyến cáo uống vào cuối bữa ăn, không được nhai hay ngậm.
--	-----------------	---

3. Chống chỉ định của thuốc

- Nhạy cảm với vinorelbine hay các vinca alkaloid khác hay bất kỳ thành phần nào của thuốc,
- Bệnh lý ảnh hưởng đáng kể đến sự hấp thu của thuốc,
- Phẫu thuật cắt dạ dày hay ruột non trước đó,
- Số lượng bạch cầu hạt trung tính < 1.500/mm³ hay nhiễm trùng nặng hiện tại hay trong vòng 2 tuần gần đây,
- Số lượng tiểu cầu < 100.000/mm³,
- Bệnh nhân đang điều trị bằng liệu pháp oxygen kéo dài,
- Cho con bú,
- Khi dùng kết hợp với tiêm vắc xin ngừa bệnh sốt vàng.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THUỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI