

Số: 65 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc giảm đau gây nghiện nhóm opioid Osaphine 10mg/ml

Để có thêm lựa chọn thuốc giảm đau cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Osaphine 10mg/ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng

- Thành phần: thuốc có thành phần hoạt chất là morphin sulfat, là một thuốc giảm đau gây nghiện thuộc nhóm opioid.
- Cơ chế tác dụng: Morphin giảm đau bằng cách hoạt hóa thụ thể μ $\rightarrow$ ức chế phóng thích chất dẫn truyền đau và làm neuron khó dẫn truyền xung.

2. Chỉ định của thuốc

Giảm đau trong trường hợp đau nhiều hoặc đau không đáp ứng với các thuốc giảm đau khác: đau sau chấn thương, đau sau phẫu thuật, đau ở thời kì cuối của bệnh, đau do ung thư, cơn đau gan, đau thận, đau trong sản khoa.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Dị ứng với morphin hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc;
- Suy hô hấp, bệnh nhân ngهن đường hô hấp, trong cơn hen phế quản hoặc suy tim thứ phát, bệnh phổi mãn tính;
- Bệnh nhân hôn mê;
- Bệnh nhân viêm loét đại tràng, bệnh nhân có nguy cơ liệt ruột;
- Triệu chứng đau bụng cấp không rõ nguyên nhân;
- Suy gan nặng hoặc cấp tính, cơn đau sỏi mật;
- Chấn thương não hoặc tăng áp lực nội sọ;
- Trạng thái co giật;
- Co thắt đường tiết niệu, suy thận trung bình đến nặng
- Nhiễm độc rượu cấp hoặc mê sảng rượu cấp;
- Trẻ sơ sinh đẻ non;
- Đang dùng các chất ức chế IMAO.

4. Tương tác thuốc

- Không sử dụng đồng thời với thuốc ức chế monoaminoxidase: có thể gây trụy tim mạch, tăng huyết áp, tăng thân nhiệt dẫn đến hôn mê và tử vong. Chỉ dùng khi đã ngừng thuốc ức chế monoaminoxidase ít nhất 15 ngày;

- Rượu làm tăng tác dụng an thần của morphin;
- Các dẫn chất khác của morphin, các thuốc chống trầm cảm cấu trúc 3 vòng (amitriptyline, clomipramine), kháng histamin H1 thế hệ 1, barbiturate, benzodiazepine, thuốc liệt thần, clonidine cùng dẫn chất: làm tăng tác dụng ức chế thần kinh trung ương của morphin.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**