

Số: 638/BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI

Thuốc điều trị tăng huyết áp TRIPLIXAM 5mg/1.25mg/5mg

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc TRIPLIXAM 5mg/1.25mg/5mg. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây:

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc ở dạng phối hợp bao gồm các hoạt chất perindopril arginin là thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin, indapamid là thuốc lợi tiểu nhóm chlorosulphamoyl và amlodipin là thuốc ức chế dòng ion canxi thuộc nhóm dihydropyridin. Thuốc phối hợp 3 thành phần hạ huyết áp với các cơ chế bổ sung cho nhau giúp kiểm soát huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp.
- Cơ chế tác dụng:
 - ✧ Indapamid làm tăng thải trừ ion natri, clo do đó làm tăng bài niệu và có tác dụng hạ huyết áp,
 - ✧ Amlodipin ức chế dòng xuyên màng ion calci đi vào cơ tim và cơ trơn mạch máu làm giãn trực tiếp cơ trơn mạch máu dẫn đến hạ huyết áp.
 - ✧ Perindopril ức chế enzym chuyển angiotensin I thành angiotensin II nên giãn mạch, giảm tiết andosteron nên tăng thải muối nước, mặt khác còn ức chế sự thoái hóa bradykinin làm kéo dài tác dụng giãn mạch và hạ huyết áp.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

- ❖ Chỉ định: thay thế trong điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân đã được kiểm soát huyết áp khi kết hợp perindopril/indapamid và amlodipin riêng rẽ có cùng hàm lượng.
- ❖ Liều dùng: 1 viên/lần/ngày vào buổi sáng, trước bữa ăn.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, với các thuốc sulfonamid khác, với các dẫn chất dihydropyridin, thuốc ức chế enzym chuyển nào và bất cứ thành phần nào của thuốc;
- Bệnh nhân lọc thận, suy thận nặng ($ClCr < 30$ ml/phút);
- Bệnh nhân bị bệnh suy tim mất bù mà không được điều trị;

- Tiền sử phù mạch liên quan đến điều trị bằng thuốc ức chế enzym chuyển dạng angiotensin trước đó, phù mạch mang tính chất di truyền hoặc vô căn;
- Giai đoạn 2 và 3 của thời kỳ mang thai;
- Đang cho con bú;
- Suy gan nặng, bệnh não gan do gan gây ra;
- Hạ kali huyết;
- Hạ huyết áp nặng;
- Sốc;
- Tắc nghẽn động mạch tâm thất trái;
- Suy tim huyết động không ổn định sau cơn nhồi máu cơ tim cấp;
- Điều trị đồng thời TRIPLIXAM với các thuốc chứa aliskiren ở bệnh nhân tiểu đường hoặc suy thận
- Sử dụng đồng thời với sacubitril/valsartan;
- Hẹp động mạch thận hai bên hoặc hẹp động mạch đáng kể dẫn đến còn chức năng thận một bên.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THUỐC



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**