

Số: 689 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc ONDANSETRON KABI 2 mg/ml

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc ONDANSETRON KABI 2 mg/ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: Ondansetron (dưới dạng *Ondansetron hydroclorid dihydrat*).
- Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2 ml (chứa 4 mg *Ondansetron*) hoặc Hộp 5 ống x 4 ml (chứa 8 mg *Ondansetron*).
- Cơ chế tác dụng: *Ondansetron* là chất đối kháng chọn lọc cao với thụ thể serotonin 5-HT₃. Thuốc ức chế phản xạ nôn bằng cách ngăn chặn sự kích thích thụ thể này ở cả dây thần kinh ngoại biên (vị trí tận cùng dây thần kinh phế vị) và hệ thống thần kinh trung ương (vùng kích nhận hóa thụ thể).
- Dạng bào chế: dung dịch tiêm, dung dịch trong suốt và không màu.
- Lưu ý: Mỗi liều thuốc chứa 53,5 mg (2,3 mmol) *Natri*, cần đặc biệt thận trọng cho bệnh nhân đang ăn kiêng muối hoặc suy tim.

2. Chỉ định và liều dùng

Chỉ định	Liều dùng khuyến cáo
CINV và RINV ở người lớn	- Liều chuẩn: 8 mg tiêm tĩnh mạch chậm ngay trước khi điều trị. - Liều cao (> 8 mg đến tối đa 16 mg): Phải pha loãng trong 50-100 ml NaCl 0.9% và truyền trong ít nhất 15 phút. Không được dùng liều đơn quá 16 mg.
CINV ở trẻ em (≥ 6 tháng tuổi)	Ngày 1 (Giai đoạn cấp): <i>Theo BSA:</i> 5 mg/m ² (tính mạch) ngay trước hóa trị. Liều tĩnh mạch đơn không quá 8 mg. <i>Theo cân nặng:</i> 0,15 mg/kg (tính mạch) ngay trước hóa trị. Có thể lặp lại 2 liều tĩnh mạch cách mỗi 4 giờ. Ngày 2 - 6 (Duy trì): Chuyển sang dạng uống (nếu có) sau mỗi 12 giờ.
Dự phòng/Điều trị PONV (Người lớn)	- Liều đơn 4 mg tiêm tĩnh mạch chậm (ít nhất 30 giây) tại thời điểm khởi mê hoặc sau phẫu thuật.

Dự phòng/Điều trị PONV (Trẻ ≥ 1 tháng tuổi)	- Liều đơn 0,1 mg/kg (tối đa 4 mg) tiêm tĩnh mạch chậm trước, trong hoặc sau khi khởi mê.
Đối tượng đặc biệt	- Người > 75 tuổi: Liều đầu không quá 8 mg truyền trong 15 phút. - Suy gan: Không quá 8 mg/ngày (đường uống hoặc tĩnh mạch).

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc;
- Sử dụng đồng thời với *Apomorphine* (nguy cơ hạ huyết áp cực độ và mất ý thức)

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ CHỦ TỊCH



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**

Chỉ định	Dự phòng/Điều trị PONV (Người lớn)
Liều dùng khuyến cáo	Liều đơn khởi mê hoặc sau phần thuốc
Liều dùng khuyến cáo	Liều đơn khởi mê hoặc sau phần thuốc
Liều dùng khuyến cáo	Liều đơn khởi mê hoặc sau phần thuốc
Liều dùng khuyến cáo	Liều đơn khởi mê hoặc sau phần thuốc
Liều dùng khuyến cáo	Liều đơn khởi mê hoặc sau phần thuốc
Liều dùng khuyến cáo	Liều đơn khởi mê hoặc sau phần thuốc
Liều dùng khuyến cáo	Liều đơn khởi mê hoặc sau phần thuốc
Liều dùng khuyến cáo	Liều đơn khởi mê hoặc sau phần thuốc
Liều dùng khuyến cáo	Liều đơn khởi mê hoặc sau phần thuốc