

Số: 172 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc PENZIMA

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc PENZIMA. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc:

- Thành phần: Mỗi 5 ml hỗn dịch uống chứa Fexofenadin hydroclorid 30 mg. Thuốc kháng histamin thế hệ hai, đối kháng đặc hiệu và chọn lọc trên thụ thể H₁ ngoại vi.
- Cơ chế tác dụng: * Fexofenadin là một chất chuyển hóa có hoạt tính của terfenadin. Thuốc cạnh tranh với histamin tại các thụ thể H₁ ở đường tiêu hóa, mạch máu và đường hô hấp. Thuốc gắn chặt vào thụ thể H₁, tạo thành phức hợp bền vững và tách ra chậm, giúp mang lại tác dụng kháng histamin nhanh và kéo dài.
- Dạng bào chế: Hỗn dịch uống (màu đỏ, mùi dâu).

2. Chỉ định và liều dùng:

- Viêm mũi dị ứng / Mày đay:
 - Trẻ từ 2 - 11 tuổi: 30 mg (5 ml) x 2 lần/ngày.
- Mày đay vô căn mãn tính:
 - Trẻ từ 6 tháng - dưới 2 tuổi: 15 mg (2,5 ml) x 2 lần/ngày.
- Trẻ bị suy giảm chức năng thận:
 - Trẻ 2-11 tuổi: 30 mg x 1 lần/ngày.
 - Trẻ 6 tháng - dưới 2 tuổi: 15 mg x 1 lần/ngày.
- Lưu ý chung: Lắc đều ống hoặc chai thuốc trước mỗi lần sử dụng. Thuốc dùng đường uống, không uống với nước hoa quả.

3. Chống chỉ định:

- Quá mẫn với fexofenadin, terfenadin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.

4. Điều kiện bảo quản:

- Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Hạn dùng sau khi mở nắp chai là 1 tháng.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI

