

Số: 497/BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2025

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống ung thư Bestdocel 80mg/4ml

Để có thêm lựa chọn thuốc điều trị ung thư cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Bestdocel. Tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

Bestdocel chỉ định trong trường hợp:

• **Ung thư vú:**

- Docetaxel kết hợp với doxorubicin và cyclophosphamid được chỉ định và điều trị phối hợp cho bệnh nhân bị:
 - + Ung thư vú có tổn thương hạch, có thể mổ được.
 - + Ung thư vú không có tổn thương hạch, có thể mổ được.
- Đối với bệnh nhân ung thư vú có thể mổ được, không có tổn thương hạch, điều trị phối hợp nên được khu trú ở những bệnh nhân thích hợp được hoá trị theo các tiêu chuẩn quốc tế được thiết lập về điều trị ung thư vú giai đoạn đầu.
- Docetaxel kết hợp với doxorubicin được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tiến xa tại chỗ hoặc di căn – những bệnh nhân này chưa được điều trị trước đó bằng liệu pháp gây độc tế bào đối với ung thư dạ dày.
- Liệu pháp đơn liệu với docetaxel được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tiến xa tại chỗ hoặc di căn sau khi thất bại với liệu pháp gây độc tế bào. Liệu pháp hoá trị trước đó nên có một tác nhân nhóm anthracyclin hoặc một tác nhân akyl hoá.
- Docetaxel kết hợp với trastuzumab được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân ung thư vú di căn – bệnh nhân có khối u biểu hiện quá mức HER2 và bệnh nhân trước đây chưa được hoá trị liệu đối với bệnh di căn này.
- Docetaxel kết hợp với capecitabin được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tiến xa tại chỗ hoặc di căn sau khi thất bại với liệu pháp hoá trị gây độc tế bào. Liệu pháp trước đó nên có một tác nhân nhóm anthracyclin.

• **Ung thư phổi không tế bào nhỏ:**

- Docetaxel được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến xa tại chỗ hoặc di căn sau khi thất bại với liệu pháp hoá trị trước đó.
- Docetaxel kết hợp với cisplatin được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến xa tại chỗ hoặc di căn, không thể phẫu thuật được; ở những bệnh nhân chưa được dùng liệu pháp hoá trị liệu trước đó đối với bệnh nhân ung thư này.

• **Ung thư tuyến tiền liệt:**

- Docetaxel kết hợp với prednison hoặc prednisolon được chỉ định về điều trị cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng hormon.
- **Ung thư dạ dày:**
- Docetaxel kết hợp với cisplatin và 5-fluorouracil được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân ung thư dạ dày di căn, bao gồm cả ung thư biểu mô tuyến vùng nối giữa dạ dày thực quản – những bệnh nhân này chưa được dùng liệu pháp hoá trị liệu trước đó đối với bệnh nhân ung thư này.
- **Ung thư vùng đầu và cổ:**
- Docetaxel kết hợp với cisplatin và 5-fluorouracil được chỉ định về điều trị dẫn đầu cho bệnh nhân bị ung thư tế bào vảy vùng đầu và cổ tiến xa tại chỗ.

Chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Bệnh nhân lúc khởi trị có số lượng bạch cầu trung tính < 1.500 tế bào/mm³.
- Bệnh nhân suy gan nặng.
- Chống chỉ định của các thuốc khác phối hợp với docetaxel cũng được áp dụng.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (báo cáo);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu: VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKL. NGUYỄN VĂN ĐỐI**