

Số: 499 /BVVP MED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống ung thư Canpaxel 250

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Canpaxel 250. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có hoạt chất là paclitaxel 250mg/41.67ml, là một thuốc chống ung thư thuộc nhóm taxan.
- Cơ chế tác dụng: Tác động lên hệ thống vi ống: ngăn chặn quá trình phân bào của tế bào ở giai đoạn cuối pha G2 và pha M trong chu kỳ tế bào bằng cách thúc đẩy quá trình hình thành hệ thống vi ống, tăng quá trình trùng hợp các dime tubulin đồng thời ức chế quá trình giải trùng hợp, kết quả hình thành các vi ống bền vững và không có chức năng → ức chế sự tổ chức lại bình thường của mạng vi ống trong quá trình phân bào của tế bào.
- Dạng bào chế: dung dịch tiêm, trong suốt.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

Chỉ định		Liều dùng
Ung thư buồng trứng	Lựa chọn hàng đầu phối hợp với cisplatin trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển hoặc bướu tồn lưu sau phẫu thuật mổ ổ bụng đầu tiên	Paclitaxel 175mg/m ² truyền TM trong 3h, tiếp theo là cisplatin 75mg/m ² lặp lại chu kỳ mỗi 3 tuần
	Lựa chọn hàng hai trong điều trị ung thư buồng trứng đã di căn sau khi thất bại với điều trị cơ bản bằng liệu pháp có cisplatin	Paclitaxel 175mg/m ² truyền TM trong 3h, lặp lại chu kỳ sau 3 tuần
Ung thư vú	Điều trị hỗ trợ carcinoma vú có hạch theo sau liệu pháp AC	Paclitaxel 175mg/m ² truyền TM trong 3h, lặp lại chu kỳ sau mỗi 3 tuần x 4 chu kỳ, tiếp theo là liệu pháp AC
	Điều trị khởi đầu ung thư vú lan rộng tại chỗ hoặc phối hợp với anthracylin (doxorubicin)	Sau khi tiêm doxorubicin 50mg/m ² khoảng 24h, tiêm truyền TM paclitaxel 220mg/m ² trong 3h, lặp lại chu kỳ mỗi 3 tuần

	Phối hợp với trastuzumab	Paclitaxel 175mg/m ² truyền TM trong 3h, lặp lại chu kỳ sau mỗi 3 tuần. tiêm truyền paclitaxel có thể bắt đầu vào ngày tiếp theo liều đầu tiên của trastuzumab hoặc ngay sau khi dùng trastuzumab nếu được dung nạp tốt
	Thuốc lựa chọn hàng hai: điều trị ung thư vú di căn trên những bệnh nhân đã thất bại hoặc không được chỉ định điều trị bằng liệu pháp chuẩn có anthracylin	Paclitaxel 175mg/m ² truyền TM trong 3h, lặp lại chu kỳ sau mỗi 3 tuần
	Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển	Paclitaxel 175mg/m ² truyền TM trong 3h, tiếp theo là cisplatin 80mg/m ² , lặp lại chu kỳ mỗi 3 tuần
	Sacrom Kaposi liên quan AIDS	Paclitaxel 100mg/m ² truyền TM trong 3h mỗi 2 tuần, liều tiếp theo phụ thuộc vào dung nạp của mỗi bệnh nhân

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Không dùng cho người bệnh quá mẫn với paclitaxel hay bất kỳ thành phần nào của thuốc, đặc biệt quá mẫn với dầu Cremophor ELP;
- Không dùng cho bệnh nhân có số lượng bạch cầu trung tính $< 1.500/\text{mm}^3$ hoặc có biểu hiện rõ bệnh lý thần kinh vận động.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCII. NGUYỄN VĂN ĐỐI