

Số: 408/BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống ung thư Epirubicin Bidiphar 50

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Epirubicin Bidiphar 50. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có hoạt chất là epirubicin hydroclorid 50mg, thuốc chống ung thư nhóm anthracycline gây độc tế bào.
- Cơ chế tác dụng:
 - Gắn xen kẽ vào giữa hai chuỗi base của DNA làm biến dạng cấu trúc xoắn kép → ức chế quá trình nhân đôi và phiên mã;
 - Ức chế enzyme topoisomerase II → đứt gãy mạch kép DNA;
 - Tạo ra các gốc tự do thông qua phản ứng oxy hóa khử.
- Dạng bào chế: dung dịch tiêm.

2. Chỉ định và liều dùng

Chỉ định	Liều dùng
Đơn trị liệu	60-90mg/m ² tiêm một lần, lặp lại sau 3 tuần, có thể chia liều này cho 2-3 ngày nếu cần
Điều trị ung thư giai đoạn cuối	12.5-25mg/m ² , tuần 1 lần
Điều trị ung thư vú sau phẫu thuật có hạch nách	100-120mg/m ² được tiêm vào ngày 1 của chu kỳ hoặc chia làm 2 liều đều nhau tiêm vào ngày 1 và ngày 8 của mỗi chu kỳ, liều này được lặp lại cách nhau 3-4 tuần
Điều trị ung thư bàng quang	Truyền nhỏ giọt vào bàng quang, mỗi tuần 50mg trong 50ml dung dịch NaCl 0.9% hoặc nước cất để được dung dịch có nồng độ 0.1% dùng trong 8 tuần

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với epirubicin, với các anthracylin, các anthracenedion hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc;
- Người bệnh có số lượng bạch cầu trung tính dưới $1500/\text{mm}^3$;
- Người bị bệnh cơ tim nặng, suy gan, người mới bị nhồi máu cơ tim;
- Người từng điều trị bằng anthracycline với liều tích tụ tối đa.

4. Tương tác thuốc

- Epirubicin tương tác với các thuốc chống ung thư khác: làm tăng tác dụng dược lý cũng như độc tính của nhau, nếu dùng kết hợp thì phải giảm liều epirubicin;
- Epirubicin và thuốc có độc tính trên tim: các thuốc có tác dụng lên tim có khả năng gây suy tim ứ máu;
- Epirubicin và chiếu xạ: có thể làm tăng độc tính và phản ứng viêm ở chỗ chiếu tia;
- Cimetidine làm tăng nồng độ epirubicin;
- Epirubicin và các thuốc tác dụng lên gan: epirubicin bị chuyển hóa mạnh ở gan nên chức năng gan có thể bị thay đổi khi dùng đồng thời với các thuốc có tác động lên gan, ảnh hưởng lên chuyển hóa, dược động, tác dụng và độc tính của thuốc đó;
- Epirubicin làm giảm hấp thu phenytoin;
- Epirubicin ức chế chuyển hóa của fluorouracil.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**