

Số: 496/BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống ung thư Lyoxatin 50mg/10ml

Để có thêm lựa chọn thuốc điều trị ung thư cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng Lyoxatin 50mg/10ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: Oxaliplatin (50 mg/10 ml)
- Cơ chế tác dụng:
 - Oxaliplatin là thuốc chống ung thư thuộc nhóm hợp chất platin mới, trong đó nguyên tử platin phức hợp với 1,2-diaminocyclohexan (DACH) và một nhóm oxalat. Thuốc hoạt động bằng cách tạo ra các liên kết chéo bên trong và giữa các sợi DNA, từ đó ức chế sự sao chép và phiên mã của DNA, dẫn đến tiêu diệt tế bào ung thư.
 - Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền, dung dịch trong suốt, không màu

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

- Trước khi truyền Lyoxatin, bệnh nhân thường được chỉ định các thuốc chống nôn (như kháng thụ thể 5-HT3) kết hợp hoặc không với dexamethason

Chỉ định	Phác đồ phối hợp / Đơn trị	Liều dùng
Ung thư đại trực tràng giai đoạn III (điều trị bổ trợ).	Phối hợp với Fluorouracil (5-FU) và Leucovorin (LV) - ví dụ phác đồ FOLFOX4	85 mg/m ² truyền tĩnh mạch trong 2 - 6 giờ, lặp lại mỗi 2 tuần trong vòng 6 tháng (12 chu kỳ)
Ung thư đại trực tràng di căn	Phối hợp với 5-FU/LV hoặc dùng đơn trị liệu	85 mg/m ² mỗi 2 tuần hoặc 130 mg/m ² mỗi 3 tuần
Các ung thư khác (Dạ dày, thực quản, tụy, mật...)	Phối hợp với các thuốc chống ung thư khác	85 mg/m ² đến 130 mg/m ² truyền tĩnh mạch mỗi 2 hoặc 3 tuần tùy phác đồ cụ thể

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với Oxaliplatin hoặc các dẫn chất của platin và bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai và đang cho con bú.
- Suy thận nặng (Độ thanh thải Creatinine ClCr < 30 ml/phút).

4. Tương tác, tương kỵ

- Tương tác
 - Thuốc chống đông đường uống (như *Warfarin*): Cần giám sát chặt chẽ chỉ số INR khi phối hợp vì có thể tăng nguy cơ chảy máu.
 - Thuốc gây độc thận: Có thể làm giảm độ thanh thải của Oxaliplatin.
 - Vaccine sống và *Natalizumab*: Tăng nguy cơ biến chứng nhiễm trùng nghiêm trọng
- Tương kỵ
 - Tuyệt đối **KHÔNG** dùng dung dịch *Natri Clorid* (NaCl 0,9%) hoặc dung dịch chứa *Clorid* để pha loãng.
 - Không dùng dụng cụ có bộ phận bằng **nhôm** do có thể gây phân hủy thuốc
 - Oxaliplatin không tương hợp với các dung dịch và thuốc có tính kiềm (ví dụ fluorouracil)
 - Chỉ được dùng *Glucose 5%* (*Dextrose 5%*)

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKI. NGUYỄN VĂN ĐỐI