

SỐ: 189/BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống ung thư, ức chế miễn dịch Endoxan 500mg

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Endoxan 500mg. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có hoạt chất là cyclophosphamide 500mg, là một tác nhân alkyl hóa chống ung thư thuộc nhóm oxazaphosphorin.
- Cơ chế tác dụng: alkyl hóa DNA, ngăn cản DNA sao chép và RNA phiên mã, cuối cùng dẫn đến phá vỡ chức năng acid nucleic.

2. Chỉ định của thuốc

Dùng kết hợp với các chất chống u tân sinh khác trong liệu trình hóa trị liệu cho các loại ung thư sau:

- Điều trị thuyên giảm và củng cố trong bạch cầu cấp dòng lympho;
- U lympho Hodgkin và không Hodgkin;
- Bệnh bạch cầu mạn tính dòng lympho sau khi thất bại với liệu pháp điều trị chuẩn;
- Điều trị thuyên giảm u tương bào;
- Điều trị hỗ trợ ung thư vú sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u hay đoạn nhũ;
- Điều trị giảm nhẹ trong ung thư vú tiến triển;
- Ung thư buồng trứng tiến triển;
- Ung thư phổi tế bào nhỏ;
- Ewing's sarcoma
- U nguyên bào thần kinh;
- Sarcom cơ vân ở trẻ em;
- Sarcom xương

Các chỉ định khác:

- Liệu cao: chuẩn bị cho ghép tủy hoặc cơ quan tự thân hoặc khác gen cùng loại;
- Liệu thấp: viêm đa khớp dạng thấp tiến triển, bệnh u hạt Wegener, bệnh thận tự miễn kháng corticosteroid, lupus ban đỏ lan tỏa cấp tính nặng.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với cyclophosphamide, những chất chuyển hóa của nó hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc;
- Tổn thương nghiêm trọng chức năng của tủy xương;
- Viêm bàng quang;

- Tác nghẽn đường tiểu;
- Có biểu hiện nhiễm trùng.

4. Tương tác thuốc

- Cyclophosphamid có thể làm giảm nồng độ digoxin trong huyết thanh;
- Allopurinol có thể làm tăng suy tủy và dẫn đến tăng đáng kể các sản phẩm chuyển hóa gây độc tế bào của cyclophosphamide;
- Chloramphenicol làm kéo dài thời gian bán thải của cyclophosphamid dẫn đến tăng độc tính;
- Cimetidin ức chế chuyển hóa của các thuốc ở gan và có thể làm tăng hoặc giảm sự hoạt hóa cyclophosphamide;
- Với doxorubicin, cyclophosphamid có thể làm tăng độc tính ở tim của các anthracycline;
- Phenobarbital và phenytoin cảm ứng các enzyme ở gan và làm tăng nhanh việc tạo các sản phẩm chuyển hóa của cyclophosphamide;
- Lợi tiểu thiazid: có thể làm giảm bạch cầu kéo dài.

5. Bảo quản thuốc

Bảo quản dung dịch đã pha trong tủ lạnh 2-8°C, dung dịch sau khi pha nên sử dụng trong vòng 24 giờ.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKI. NGUYỄN VĂN ĐỐI**