

Số: 565 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc giãn cơ trơn HADUDROTA

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc HADUDROTA. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có hoạt chất là drotaverin hydroclorid 40mg, là một dẫn chất của isoquinoline có tác dụng làm giảm co thắt trực tiếp trên cơ trơn.
- Cơ chế tác dụng: thuốc ức chế men phosphodiesterase và làm tăng nồng độ cAMP, dẫn đến giãn cơ trơn thông qua việc bất hoạt enzym kinase của chuỗi myosin.
- Dạng bào chế: dung dịch thuốc tiêm, trong, màu vàng.

2. Chỉ định và liều dùng

- **Chỉ định:**
 - Co thắt cơ trơn trong các bệnh về đường mật: sỏi túi mật, sỏi đường mật, viêm túi mật, viêm đường mật;
 - Co thắt cơ trơn trong các bệnh về tiết niệu: sỏi thận, sỏi niệu quản, viêm bể thận, viêm bàng quang;
 - Dùng điều trị hỗ trợ trong: co thắt cơ trơn đường tiêu hóa như loét dạ dày và tá tràng, viêm dạ dày, co thắt tâm vị và môn vị, viêm ruột, viêm đại tràng, đau bụng kinh.
- **Liều dùng:**
 - Người lớn: 1-2 ống/lần, 1-3 lần/ngày (tổng liều từ 40-240mg) tiêm bắp mỗi ngày;
 - Trong trường hợp đau quặn thận cấp tính: tiêm tĩnh mạch 1-2 ống.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc;
- Suy thận hoặc suy gan nặng;
- Suy tim nặng (hội chứng cung lượng thấp).

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**