

Số: 268 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc kháng sinh Ciproven 10 mg/ml

Để có thêm lựa chọn thuốc kháng sinh cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc kháng sinh Ciproven 10 mg/ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc:

- Thành phần: Mỗi 1 ml dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền chứa Ciprofloxacin 10 mg (dưới dạng ciprofloxacin lactat).
- Cơ chế tác dụng: Ciprofloxacin là kháng sinh nhóm fluoroquinolon, có tác dụng ức chế enzym DNA-gyrase và topoisomerase IV của vi khuẩn từ đó làm gián đoạn quá trình sao chép DNA vi khuẩn.
- Phổ tác dụng: Chủ yếu trên vi khuẩn Gram âm, bao gồm *Pseudomonas aeruginosa*; tác dụng hạn chế trên vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn kỵ khí.
- Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch, trong suốt không màu hoặc màu vàng nhạt.

2. Thuốc được chỉ định trong các trường hợp:

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới do vi khuẩn gram âm;
- Viêm tai giữa mủ mạn tính;
- Viêm bể thận cấp tính;
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng;
- Viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn;
- Nhiễm khuẩn đường sinh dục;
- Nhiễm khuẩn đường tiêu hoá;
- Nhiễm khuẩn ổ bụng;
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm do vi khuẩn gram âm;
- Nhiễm khuẩn xương và khớp;
- Bệnh than qua đường hô hấp;
- Đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính;
- Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn.

3. Các chống chỉ định của thuốc:

- Quá mẫn với ciprofloxacin/quinolon;
- Chống chỉ định dùng đồng thời ciprofloxacin và tizanidin.

4. Cách pha và cách dùng

- Pha loãng dung dịch: pha loãng dung dịch đậm đặc Ciproven 10mg/ml thành dung dịch tiêm truyền Ciprofloxacin 1-2mg/ml trước khi tiêm truyền tĩnh mạch (dung dịch để pha loãng bao gồm NaCl 0.9%, Ringer, Glucose 5% hoặc 10%, Fructose 5% hoặc 10%)
- Dùng theo đường truyền tĩnh mạch:

- Trẻ em: thời gian truyền 60 phút
- Người lớn: thời gian truyền là 60 phút với liều 400mg và 30 phút với liều 200mg.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI