

Số: 26 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc kháng sinh OCEBI-SO

Để có thêm lựa chọn thuốc kháng sinh cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc OCEBI-SO. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc:

- Thành phần: Mỗi viên nén phân tán chứa Sulfamethoxazol 400 mg và Trimethoprim 80 mg (tỷ lệ 5:1)
- Cơ chế tác dụng: Sulfamethoxazol là một Sulfonamid, ức chế cạnh tranh sự tổng hợp acid folic của vi khuẩn, Trimethoprim là một dẫn chất của pyrimidin, ức chế đặc hiệu enzyme dihydrofolate reductase của vi khuẩn. Phối hợp Trimethoprim và Sulfamethoxazol như vậy ức chế hai giai đoạn liên tiếp của sự chuyển hóa acid folic, do đó ức chế hiệu quả việc tổng hợp purin, thymin và cuối cùng là DNA của vi khuẩn.
- Dạng bào chế: Viên nén phân tán (hòa tan nhanh trong nước).

2. Thuốc được chỉ định trong các trường hợp:

Chỉ định	Liều dùng	
	Người lớn	Trẻ em
Nhiễm khuẩn tiết niệu	1 viên/ lần x 2 lần/ngày trong 10 ngày	40mg+8mg/kg/ngày chia 2 lần x 10 ngày
Nhiễm khuẩn tiết niệu dưới không biến chứng		
Nhiễm khuẩn tiết niệu mạn tính, tái phát ở nữ trưởng thành	1-2 viên trong 1-2 tuần	
Nhiễm khuẩn đường hô hấp	2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày trong 10 ngày	40mg+8mg/kg/ngày chia 2 lần x 5 ngày
Đợt cấp viêm phế quản mạn		
Viêm tai giữa cấp ở trẻ em		
Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa	1 viên/lần x 2 lần/ngày trong 5 ngày	40mg+8mg/kg/ngày chia 2 lần x 5 ngày
Ly trực khuẩn		
Viêm phổi do <i>Pneumocystis carinii</i>	100mg + 20mg/kg/ngày chia 4 lần x 14-21 ngày	

3. Chống chỉ định:

- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Suy thận nặng mà không giám sát được nồng độ thuốc trong huyết tương.
- Người bệnh được xác định thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ do thiếu acid folic.
- Trẻ nhỏ dưới 2 tháng tuổi.
- Bệnh nhân có tổn thương gan rõ rệt.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

4. Tương tác thuốc:

- Dùng đồng thời với thuốc lợi tiểu, đặc biệt Thiazid, làm tăng nguy cơ giảm tiểu cầu ở người già.
- Sulfonamid có thể ức chế gắn kết protein và bài tiết quản thận của Methotrexate và vì vậy làm giảm tác dụng của Methotrexate.
- Thuốc dùng đồng thời với Pyrimethamin 25 mg/tuần làm tăng nguy cơ thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ.
- Thuốc ức chế chuyển hóa Phenytoin ở gan, có khả năng làm tăng quá mức tác dụng của Phenytoin.
- Thuốc có thể kéo dài thời gian prothrombin ở người bệnh đang dùng thuốc kháng đông Warfarin.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI