

Số: 271 /BVVP MED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc mỡ tra mắt Acyclovir 3%

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc mỡ tra mắt Acyclovir 3%. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần chính: Aciclovir.
 - Tuýp 3g: 0,09g Aciclovir.
 - Tuýp 5g: 0,15g Aciclovir.
- Cơ chế tác dụng: Aciclovir triphosphat ức chế tổng hợp DNA của virus và sự nhân lên của virus mà không ảnh hưởng đến các quá trình bình thường của tế bào vật chủ.
- Phổ tác dụng: Tác dụng mạnh nhất trên virus Herpes simplex tuýp 1 (HSV-1), tiếp đến là Herpes simplex tuýp 2 (HSV-2) và virus Varicella (VZV).
- Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt.

2. Thuốc được chỉ định

- Điều trị viêm giác mạc do virus *Herpes simplex*.

3. Liều Dùng

- Liều dùng: * Tra 5 lần mỗi ngày. Nên tiếp tục ít nhất 3 ngày sau khi đã dùng liều điều trị (khi các triệu chứng đã hết).
- Đối tượng: Người lớn, trẻ em và người cao tuổi dùng liều như nhau.

4. Chống chỉ định

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

5. Tương tác thuốc

- Zidovudin: Dùng đồng thời có thể gây trạng thái ngủ lịm và lơ mơ.
- Probenecid: Ức chế đào thải, làm tăng thời gian bán thải và nồng độ aciclovir trong huyết tương.
- Amphotericin B và Ketoconazol: Làm tăng hiệu lực chống virus của aciclovir.

6. Bảo quản và hạn dùng:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Lưu ý quan trọng: Không dùng thuốc quá 30 ngày kể từ khi mở nắp tuýp.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI

