

Số: 62p /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI

Thuốc điều trị các bệnh về xương Zoledronic acid 4mg/5ml

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Zoledronic acid. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây:

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có hoạt chất là acid zoledronic 4mg, thuộc nhóm biphosphanat có tác dụng trên xương, một chất ức chế sự tiêu xương do hủy cốt bào.
- Dạng bào chế: dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền, trong suốt, không màu.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

Chỉ định	Liều dùng
Phòng ngừa các biến cố liên quan đến xương ở bệnh nhân bị u ác tính tiến triển liên quan đến xương	Người lớn và người cao tuổi: 4mg mỗi 3-4 tuần, bệnh nhân nên được uống bổ sung 500mg calci và 400IU vitamin D hàng ngày.
Điều trị bệnh nhân tăng calci huyết do khối u (TIH)	Liều khuyến cáo (nồng độ calci huyết thanh đã được hiệu chỉnh với albumin > 12.0 mg/dl hoặc 3.0 mmol/l) là một liều đơn 4mg acid zoledronic.

Cách dùng: Dung dịch nên được pha loãng trong 100ml dung môi (NaCl 0.9% hoặc glucose 5%) và nên tiêm truyền tĩnh mạch trong thời gian không dưới 20 phút và nên được sử dụng như một liều đơn đường tĩnh mạch với đường truyền riêng, bệnh nhân phải được bổ sung đầy đủ nước trước và sau khi dùng acid zoledronic. Không nên trộn lẫn dung dịch acid zoledronic với calci hoặc các dung dịch tiêm truyền có chứa cation khác như Ringer Lactat.

3. Các chống chỉ định của thuốc

Quá mẫn với bất kì thành phần nào của thuốc hoặc các thuốc biphosphonat khác.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THUỐC



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSC.KI. NGUYỄN VĂN ĐỐI**

Chỉ định	Liều dùng
Điều trị bệnh nhân tăng calci huyết do khối u (TTH)	albumin > 12.0 mg/dl hoặc 3.0 mmol/l là một liều đơn tăng acid zolodronic.
Phòng ngừa các biến cố liên quan đến xương ở bệnh nhân bị u ác tính tiến triển liên quan đến xương	vitamin D hàng ngày. nồng độ trung 500mg calci và 400IU vitamin D hàng ngày. mỗi 3-4 tuần, bệnh nhân nên được Người lớn và người cao tuổi tăng