

LACBIOSYN®

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

1. Thành phần công thức thuốc: cho 1 gói

- Thành phần hoạt chất:
Lactobacillus acidophilus 10⁸ CFU
- Thành phần tá dược:
Tá dược vừa đủ 1 gói
(Tá dược: Maltodextrin, Mannitol, Aerosil 200, Bột mùi dâu)

2. Dạng bào chế:

2.1. Dạng bào chế: Thuốc bột uống

2.2. Mô tả dạng bào chế:

Bột màu trắng đến hơi vàng, bột khô tơi, không bị ẩm, vị hơi ngọt, mùi thơm.

3. Chỉ định:

- Điều trị phụ trợ trong tiêu chảy cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải.
- Bổ sung *Lactobacillus acidophilus* bị mất cho hệ vi khuẩn đường ruột do dùng kháng sinh.

4. Liều dùng và cách dùng:

4.1. Liều dùng

- Người lớn: Uống 1 gói/lần x 3 lần/ngày.

- Trẻ em: Uống 1 - 2 gói/ngày.

4.2. Cách dùng

Thuốc thường được uống với sữa, nước quả hoặc nước đun sôi để nguội.

5. Chống chỉ định:

- Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho người sốt cao trừ khi có chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa.
- Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Nếu sau 2 ngày điều trị mà vẫn bị tiêu chảy, cần khám lại. Cần giám sát theo dõi khi dùng chế phẩm chứa *Lactobacillus acidophilus* cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 3 tuổi.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

7.1. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:

Cho đến nay, chưa thấy thuốc gây dị ứng hoặc độc cho thai. Tuy nhiên số liệu còn ít. Tốt nhất là không dùng khi mang thai.

7.2. Thời kỳ cho con bú:

Không có chống chỉ định với phụ nữ cho con bú.

8. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:

Thuốc không gây ảnh hưởng gì khi lái xe và vận hành máy móc.

9. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

9.1. Tương tác của thuốc:

Chưa tìm thấy thông tin về tương tác của thuốc.

9.2. Tương kỵ của thuốc:

Chưa tìm thấy thông tin về tương kỵ của thuốc.

10. Tác dụng không mong muốn:

Khi bắt đầu dùng thuốc có hiện tượng sinh hơi trong ruột, nhưng hiện tượng này giảm dần trong quá trình điều trị, đôi khi táo bón.

11. Quá liều và cách xử trí:

11.1. Quá liều:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

11.2. Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều:

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

12. Thông tin về dược lý, lâm sàng

12.1. Đặc tính dược lực học:

Nhóm dược lý: Vi khuẩn sinh acid lactic

Mã ATC: A07FA01

Dược lý và cơ chế tác dụng:

- *Lactobacillus acidophilus* là một trực khuẩn vẫn thường cư trú ở đường tiêu hóa, có khả năng sinh ra acid lactic, do đó tạo ra một môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn và nấm gây bệnh kể cả các vi khuẩn gây thối rữa. *Lactobacillus acidophilus* đã được dùng trong nhiều năm để điều trị ỉa chảy chưa có biến chứng, đặc biệt do vi khuẩn chỉ ở ruột bị biến đổi do dùng kháng sinh.

- Chế phẩm *Lactobacillus acidophilus* được điều chế từ môi trường nuôi cấy đậm đặc, làm khô và có khả năng sống và phát triển khi uống.

- Các hoạt chất là những sản phẩm chuyển hóa của *Lactobacillus acidophilus* bắt hoạt do nhiệt độ.

- *In vitro* và nghiên cứu ở động vật cho thấy có 4 loại cơ chế tác dụng là: Tác dụng kim khuẩn trực tiếp do các chất hóa học do *Lactobacillus* tạo ra (acid lactic, một số chất kháng sinh còn chưa rõ công thức); Kích thích miễn dịch không đặc hiệu ở niêm mạc (tăng tổng hợp IgA); Kích thích tăng trưởng vi khuẩn chỉ sinh acid để bảo vệ, chủ yếu là do có nhiều vitamin nhóm B; bám dính của *Lactobacillus* bắt hoạt vào các tế bào ruột người trong môi trường nuôi cấy tế bào. Nhưng cho đến nay chưa có đủ dữ liệu mang tính chất khoa học để chứng minh tính hiệu quả của *Lactobacillus acidophilus* trong điều trị ỉa chảy. Sữa chua (Yoghurt) là 1 nguồn phổ biến cung cấp vi sinh tạo acid lactic. Nhiều nước đã coi các chế phẩm này là một thực phẩm, hoặc thực phẩm bổ sung và không còn nói đến ích lợi trong điều trị ỉa chảy. Các chế phẩm có *Lactobacillus acidophilus* không có trong phác đồ điều trị ỉa chảy cấp ở trẻ em của Tổ chức Y tế thế giới và của Bộ Y tế.

- Nghiên cứu có giới hạn cho thấy *Lactobacillus acidophilus* có thể kết hợp làm giảm bệnh viêm ruột, mụn nước có sốt, viêm loét miệng, trứng cá tuổi thiếu niên, nhưng kết quả chưa rõ ràng, Lợi khuẩn (probiotic) đã được dùng cho trẻ để non nhẹ cân (dưới 34 tuần thai và cân nặng < 1,5 kg) trong 6 tuần, đã làm giảm tần suất và mức độ nặng viêm ruột hoại tử, nhưng cần nghiên cứu thêm trước khi dùng thường quy.

12.2. Đặc tính dược động học:

Thuốc không hấp thu qua đường uống, tác dụng tại chỗ, chủ yếu ở đại tràng, thuốc thải trừ qua phân.

13. Quy cách đóng gói:

- Hộp 10 gói, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 20 gói, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 30 gói, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 100 gói, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

14. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

14.1 Điều kiện bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

14.2 Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

14.3 Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

15. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TTYT BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

ĐT: 0256.3846500 - 3846040 Fax: 0256.3846846