

Số: 273 /BVVP MED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc AM – BROXOL

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc AM – BROXOL. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc:

- Thành phần: Ambroxol hydrochloride 30mg
- Cơ chế tác dụng: Ambroxol là chất chuyển hóa của bromhexin, có tác dụng tiêu nhầy. Làm giảm độ quánh của đờm, tăng vận chuyển chất nhầy nhờ kích thích hoạt động của lông chuyển.
- Dạng bào chế: Viên nén nhỏ màu trắng, hình tròn, úp cạnh, hai mặt trơn.

2. Chỉ định và liều dùng:

- Chỉ định: điều trị rối loạn tiết dịch nhầy phế quản ở người lớn, đặc biệt trong bệnh cấp và trong đợt điều trị cấp của viêm phế quản mạn tính.
- Liều dùng: uống 1-2 viên, 2 lần/ngày.

3. Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Loét dạ dày tá tràng tiến triển.

4. Tương tác thuốc:

- dùng ambroxol với kháng sinh (amoxicillin, cefuroxin, erythromycin, doxycycline) làm tang nồng độ kháng sinh trong nhu mô phổi.
- không phối hợp ambroxol với một thuốc chống ho (vd : codein) hoặc một thuốc làm khô đờm (vd: atropin).

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKI. NGUYỄN VĂN ĐỐI

