

Số: 170 /BVVP MED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc Baci-subti

Để có thêm lựa chọn Men vi sinh cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Baci-subti. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc:

- Mỗi viên nang chứa:
 - Bacillus subtilis R0179: $>10^8$ CFU.
 - Fructose Oligosaccharide (FOS): 100 mg.
- Cơ chế tác dụng: * Bacillus subtilis tồn tại ở trạng thái bào tử, chịu được môi trường acid dạ dày. Khi vào ruột, bào tử nảy mầm và phát triển thành thể hoạt động, giúp thiết lập lại cân bằng hệ vi sinh.
 - Cạnh tranh sinh tồn và ức chế các vi khuẩn gây bệnh đường ruột.
 - Tiết các kháng sinh ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh (Gram âm, Gram dương và nấm gây bệnh).
 - Tổng hợp các enzym thủy phân (protease, amylase...) và các vitamin, acid amin có lợi cho cơ thể.
- Dạng bào chế: Viên nang cứng.

2. Thuốc được chỉ định trong các trường hợp:

- Hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc dùng thuốc kháng sinh kéo dài (đi ngoài phân sống, đầy bụng, khó tiêu).
- Trẻ em đi ngoài phân sống.
- Viêm ruột cấp và mãn tính, tiêu chảy, táo bón.

3. Liều lượng và cách dùng:

- Liều dùng: uống trước ăn 30 phút
 - Người lớn và trẻ em: 1 - 2 viên/ngày.
 - Trường hợp đầy bụng, khó tiêu, táo bón, tiêu chảy, loạn khuẩn do thức ăn hoặc rượu bia: 3 - 4 viên/ngày, cách 3 - 4 giờ dùng 1 viên.

4. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI

