

Số: 673 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc cường giao cảm Hadunalin 1mg/ml

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Hadunalin 1mg/ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- **Thành phần:** thuốc có hoạt chất là adrenalin 1mg/ml, là một catecholamin tự nhiên do tủy thượng thận tiết ra.
- **Cơ chế tác dụng:** là một chất kích thích trực tiếp cả hai thụ thể alpha và beta-adrenergic từ đó hoạt hóa hệ thần kinh giao cảm
 - ✧ α 1-adrenergic: hoạt hóa phospholipase C (PLC), tăng tạo IP_3 và DAG, tăng Ca^{2+} nội bào, co cơ trơn mạch máu.
 - ✧ α 2-adrenergic: ức chế adenyl cyclase, giảm nồng độ cAMP.
 - ✧ β 1-adrenergic: hoạt hóa adenyl cyclase, tăng cAMP, hoạt hóa protein kinase A (PKA), tăng dòng Ca^{2+} đi vào tế bào cơ tim.
 - ✧ β 2-adrenergic: tăng cAMP, hoạt hóa PKA, ức chế myosin light-chain kinase (MLCK), giãn cơ trơn.

2. Chỉ định và liều dùng

- **Chỉ định:**
 - ✧ Sốc phản vệ;
 - ✧ Phản ứng dị ứng cấp tính.
- **Liều dùng:**
 - ✧ Người lớn: liều thông thường 0.5mg, nếu cần có thể lặp lại liều này nhiều lần cách nhau 5 phút tùy theo huyết áp, mạch và chức năng hô hấp.
 - ✧ Trẻ em:

Tuổi	Liều dùng
Trên 12 tuổi	0.5mg, tiêm bắp 0.3mg, tiêm bắp nếu trẻ còn nhỏ hoặc trước tuổi dậy thì
6-12 tuổi	0.3mg, tiêm bắp (IM)

6 tháng - 6 tuổi	0.15mg, tiêm bắp (IM)
Dưới 6 tháng	0.01mg/kg, tiêm bắp (IM)

- Cách dùng:

Đường **tiêm bắp** thường được ưu tiên trong điều trị **ban đầu sốc phản vệ**, trong trường hợp **cấp cứu ngừng tuần hoàn** có thể **tiêm tĩnh mạch** Adrenalin nhưng bắt buộc phải được **pha loãng** thành **Adrenalin 0.1mg/ml** (dung dịch dùng để pha loãng là NaCl 0.9% hoặc Glucose 5%). Không dùng dung dịch thuốc tiêm Hadunalin (Adrenalin) **1mg/ml** chưa được pha loãng vào tĩnh mạch.

3. Các chống chỉ định của thuốc

Mẫn cảm adrenalin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc;

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HỒ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**

Liều dùng	Tuổi
0.2mg, tiêm bắp 0.3mg, tiêm bắp nếu trẻ còn nhỏ hoặc trước tuổi này	Trên 12 tuổi
0.3mg, tiêm bắp (IM)	6-12 tuổi