

Số: 396 /BVVP MED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc REAMBERIN 1,5%

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng Thuốc REAMBERIN 1,5%. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: Meglumin natri succinat – 6,000 g
- Cơ chế tác dụng: chống giảm oxy huyết, chống oxy hóa, hoạt hóa chu trình Krebs, tăng tổng hợp ATP
- Dạng bào chế: Dung dịch trong suốt, không màu.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

Chỉ định		Liều dùng	Đường dùng
Người lớn	Chống giảm oxy huyết và giải độc trong các trường hợp ngộ độc cấp	400–800 ml/ngày	Truyền tĩnh mạch, nhỏ giọt với tốc độ không quá 90 giọt/phút (không quá 1–4.5ml/phút)
Trẻ em trên 1 tuổi		6–10 ml/kg/ngày (tối đa 400 ml)	Truyền nhỏ giọt tĩnh mạch, với tốc độ truyền khoảng 3-4ml/phút

3. Chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
- Chấn thương phù não.
- Rối loạn chức năng thận.
- Không sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKI. NGUYỄN VĂN ĐỐI