

Số: 238 /BVVP MED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống nôn Metovomit

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc chống nôn Metovomit. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có hoạt chất là metoclopramid 1mg, là một chất ức chế thụ thể dopamin.
- Cơ chế tác dụng: tính chất chống nôn là do tác dụng kháng dopamin trực tiếp lên vùng phát động hóa thụ thể, trung tâm nôn và do tác dụng đối kháng lên thụ thể serotonin – 5HT3.
- Dạng bào chế: dung dịch uống trong suốt, không màu đến hơi vàng.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

Chỉ định		Liều dùng	Thời gian điều trị
Người lớn	Dự phòng nôn và buồn nôn xuất hiện muộn do hóa trị	Liều khuyến cáo tối đa 10ml/lần x 3 lần/ngày hoặc 0.5mg/kg/ngày chia 3 lần	Tối đa 5 ngày (trừ chỉ định trào ngược dạ dày thực quản)
	Dự phòng nôn và buồn nôn do xạ trị		
	Điều trị triệu chứng nôn và buồn nôn, bao gồm cả nôn do đau nửa đầu cấp tính và trào ngược dạ dày thực quản không đáp ứng với liệu pháp thông thường		
Trẻ em từ 1-18 tuổi	Dự phòng nôn và buồn nôn xuất hiện muộn do hóa trị	0.1– 0.15mg/kg x 3 lần/ngày Tối đa 0.5mg/kg/ngày	Tối đa 5 ngày

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với metoclopramid hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc;
- Chảy máu tiêu hóa, tắc nghẽn cơ học hoặc thủng dạ dày ruột do thuốc làm tăng nhu động ruột và có thể khiến tình trạng bệnh nhân nặng nề hơn;
- U tủy thượng thận hoặc nghi ngờ u tủy thượng thận do nguy cơ gây các cơn tăng huyết áp kịch phát;
- Có tiền sử rối loạn vận động do thuốc metoclopramid hoặc rối loạn vận động do thuốc an thần;
- Động kinh (với mật độ và cường độ cơn động kinh tăng dần)
- Parkinson;
- Dùng phối hợp với levodopa hoặc các thuốc chủ vận mạch dopamine
- Có tiền sử methemoglobin huyết do metoclopramide hoặc thiếu men NADH cytochrome b5 reductase;
- Trẻ em dưới 1 tuổi do nguy cơ xảy ra rối loạn ngoại tháp tăng trên đối tượng này.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI