

Số: 436 /BVVP MED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống ung thư BOCARTIN 150 (Carboplatin 150mg/15ml)

Để có thêm lựa chọn thuốc điều trị ung thư cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc BOCARTIN 150. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: Mỗi lọ 15ml dung dịch chứa Carboplatin 150mg
- Cơ chế tác dụng: Là một hợp chất chì hữu cơ (platin), tạo thành các liên kết chéo trong và giữa các sợi DNA. Sự biến đổi cấu trúc DNA này ức chế quá trình tổng hợp và sao chép DNA, dẫn đến chết tế bào ung thư. Tác dụng này không phụ thuộc vào chu kỳ tế bào.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

- Ung thư buồng trứng (từ giai đoạn Ic đến IV), sau phẫu thuật, tái phát, di căn sau điều trị
- Ung thư phế quản phổi tế bào nhỏ.
- Ung thư đầu và cổ.
- U Wilms, u não, u nguyên bào thần kinh.
- Ung tinh hoàn, ung thư bàng quang, u nguyên bào vồng mạc tiền triển và tái phát ở trẻ em.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Mẫn cảm với carboplatin, cisplatin hoặc các hợp chất platin khác.
- Phụ nữ cho con bú
- Suy tủy nghiêm trọng
- Khó u chảy máu

4. Tương tác thuốc

- Aminoglycosid, kháng sinh gây độc tai/thận: Tăng độc tính thận và thính giác. Tránh phối hợp.
- Warfarin: Tăng INR. Theo dõi INR chặt chẽ khi dùng đồng thời.
- Phenytoin: Carboplatin làm giảm nồng độ phenytoin → nguy cơ co giật. Theo dõi nồng độ thuốc.
- Vaccine sống giảm độc lực: Chống chỉ định dùng đồng thời do nguy cơ nhiễm trùng nặng

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI

