

Số: 464/BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI

Thuốc chống ung thư OXALIPLATIN “EBEWE” 100mg/20ml

Để có thêm lựa chọn thuốc điều trị ung thư cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng OXALIPLATIN “EBEWE” 100mg/20ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: Mỗi lọ 20 ml dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền chứa 100mg Oxaliplatin
- Cơ chế tác dụng:
 - Oxaliplatin là một thuốc chống ung thư, thuộc nhóm mới của hợp chất platin. Những dẫn xuất tinh tủa thành qua quá trình chuyển dạng sinh học của Oxaliplatin sẽ tương tác với DNA để tạo ra những liên kết bất chéo khác chuỗi (inter-strand) và cùng, chuỗi (inter-strand), nhờ đó phá vỡ tổng hợp DNA, dẫn đến tác dụng độc tế bào và chống ung thư.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

- Oxaliplatin kết hợp với 5-fluorouracil (5-flu) và acid folinic (FA) được chỉ định :

Chỉ định	Liều dùng
Điều trị hỗ trợ ung thư đại tràng giai đoạn III (Duke C) sau khi đã phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u nguyên phát.	Liều khuyến cáo Oxaliplatin 85mg/m ² theo đường tĩnh mạch, được lặp lại 2 tuần trong 12 chu kỳ (6 tháng).
Điều trị ung thư đại – trực tràng di căn	Liều khuyến cáo Oxaliplatin 85mg/m ² theo đường tĩnh mạch, lặp lại mỗi 2 tuần.

- Đối với những quần thể đặc biệt (xem chi tiết trong tờ HDSD)

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Có tiền sử quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc.
- Cho con bú.
- Bị suy tủy trước khi bắt đầu chu kỳ điều trị đầu tiên, dựa trên bằng chứng lúc khởi trị số lượng bạch cầu trung tính $< 2 \times 10^9/l$ và/ hoặc số lượng tiểu cầu $< 100 \times 10^9/l$.

- Bị suy chức năng thần kinh cảm giác ngoại biên trước khi bắt đầu chu kỳ điều trị đầu tiên.
- Bị suy chức năng thận nặng (độ thanh thải creatinine thấp hơn 30ml/phút).

4. Tương tác, tương kỵ

- KHÔNG sử dụng vật liệu tiêm truyền có chứa nhôm.
- KHÔNG sử dụng thuốc khi chưa pha loãng.
- Chỉ sử dụng dung dịch *glucose 5%* để pha loãng thuốc. KHÔNG pha loãng để tiêm truyền bằng dung dịch *natri clorid* hoặc dung dịch có chứa *clorid*.
- KHÔNG trộn lẫn bất kỳ thuốc nào khác cùng túi dịch truyền hoặc truyền đồng thời trong cùng một đường truyền.
- KHÔNG trộn lẫn với các thuốc hoặc dung dịch có chứa tính kiềm, đặc biệt là *5-fluorouracil*, *acid folinic* chứa *trometamol* dưới dạng tá dược hoặc các muối *trometamol* của sản phẩm khác.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐQT VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSC KII. NGUYỄN VĂN ĐỐI

Liều dùng	Chỉ định
Liều khuyến cáo Oxaliplatin 85mg/m ² theo đường tĩnh mạch, được lặp lại 2 tuần trong 12 chu kỳ (6 tháng).	Điều trị bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn III (Duke C) sau khi đã phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u nguyên phát.
Liều khuyến cáo Oxaliplatin 85mg/m ² theo đường tĩnh mạch, lặp lại mỗi 2 tuần.	Điều trị ung thư đại – trực tràng di căn