

Số: 211 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc hỗn dịch nhỏ mắt Videtrol

Để có thêm lựa chọn thuốc nhỏ mắt cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc hỗn dịch nhỏ mắt Videtrol. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: Mỗi ml hỗn dịch chứa:
 - Dexamethason: 0,1% (kl/tt)
 - Neomycin sulfat: 3500 IU/ml
 - Polymyxin B sulfat: 6000 IU/ml
- Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt vô trùng, màu trắng đến trắng ngà, có thể lắng khi để yên nhưng dễ phân tán đồng nhất khi lắc.

2. Thuốc được chỉ định

- Điều trị ngắn hạn các trường hợp viêm mắt có đáp ứng với steroid khi xét thấy cần dùng đồng thời với thuốc kháng khuẩn, sau khi loại trừ nguyên nhân do nấm và virus.

3. Liều Dùng

- Trẻ em từ 2 tuổi trở lên và người lớn (kể cả người cao tuổi): Nhỏ 1 hoặc 2 giọt vào mỗi mắt bị bệnh, có thể nhỏ tới 6 lần/ngày hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.

4. Chống chỉ định

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Viêm giác mạc do Herpes simplex.
- Bệnh đậu bò, thủy đậu, bệnh kết mạc và giác mạc do virus.
- Bệnh mắt nhiễm Mycobacterium, nấm hoặc nhiễm ký sinh trùng ở mắt không được điều trị.

5. Bảo quản và hạn sử dụng


- Bảo quản ở nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C
- Hạn sử dụng sau khi mở nắp bao bì trực tiếp lần đầu: 30 ngày

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI