

Số: 377 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc xịt mũi BENITA

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc xịt mũi BENITA. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- **Thành phần:** thuốc có hoạt chất là budesonide 64ug/0.05ml, thuộc nhóm corticosteroid có tác dụng kháng viêm tại chỗ mạnh.
- **Cơ chế tác dụng:** ức chế sự phóng thích các chất trung gian gây viêm và ức chế đáp ứng miễn dịch qua trung gian cytokin.

2. Chỉ định và liều dùng

- **Chỉ định:**
 - Viêm mũi dị ứng quanh năm và viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi do rối loạn vận mạch;
 - Dự phòng tái phát polyp mũi sau phẫu thuật cắt polyp, điều trị triệu chứng polyp mũi.
- **Liều dùng:** Liều dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi là 256 microgam/ngày (tương đương 4 liều xịt cho 2 mũi) có thể sử dụng 1 lần duy nhất mỗi buổi sáng hoặc chia thành 2 lần mỗi ngày.

3. Các chống chỉ định của thuốc

Mẫn cảm với budesonide hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI

