

Số: 517/BVĐKHB-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc điều trị hạ lipid pms-Rosuvastatin 10mg

Để có thêm lựa chọn thuốc điều trị cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc pms-Rosuvastatin 10mg. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây:

1. Thành phần của thuốc

- Thành phần: thuốc có thành phần hoạt chất là rosuvastatin 10mg, thuộc nhóm statin;
- Cơ chế tác dụng:
 - HMG-CoA reductase tham gia vào quá trình tổng hợp cholesterol tại gan mà rosuvastatin là một chất ức chế chọn lọc và cạnh tranh trên men HMG-CoA reductase → làm giảm tạo mevalonate → giảm tổng hợp cholesterol nội sinh ở gan;
 - Rosuvastatin làm tăng số lượng LDL trên bề mặt tế bào gan → tăng hấp thu và dị hóa LDL, ức chế sự tổng hợp VLDL ở gan → giảm các thành phần VLDL, LDL.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc:

- **Chỉ định**
Tăng cholesterol máu:
 - Tăng cholesterol nguyên phát;
 - Rối loạn lipid hỗn hợp (loại IIb);
 - Tăng cholesterol gia đình kiểu đồng hợp tử;

Phòng ngừa các biến cố tim mạch:

- Giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim không tử vong;
- Giảm nguy cơ đột quỵ không tử vong;
- Giảm nguy cơ tái thông mạch máu động mạch vành.
- **Liều dùng**
 - Liều khởi đầu khuyến cáo là 10mg/lần/ngày,
 - Nếu cần có thể tăng liều lên 20mg sau 4 tuần,
 - Liều 40mg chỉ nên sử dụng cho các bệnh nhân tăng cholesterol máu nặng có nguy cơ cao về bệnh tim mạch mà không đạt được mục tiêu điều trị ở liều 20mg.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Ở bệnh nhân quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc;

- Bệnh nhân bị bệnh gan cấp hay việc gia tăng kéo dài không rõ nguyên nhân của nồng độ transaminases huyết thanh hơn 3 lần giới hạn trên mức bình thường;
- Phụ nữ có thai và đang cho con bú;
- Cholesterol và các sản phẩm khác của sinh tổng hợp cholesterol là thành phần thiết yếu cho sự phát triển của thai nhi, pms-Rosuvastatin nên dùng cho phụ nữ độ tuổi sinh đẻ chỉ khi bệnh nhân khó có khả năng thụ thai và đã được thông báo về các tác hại. Nếu bệnh nhân có thai trong khi sử dụng phải lập tức ngưng thuốc và thông báo về những tiềm năng gây tổn hại cho thai nhi.

pms-Rosuvastatin 40mg chống chỉ định trong các trường hợp:

- Bệnh nhân châu Á;
- Bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ bệnh cơ/tiêu cơ vân như: có tiền sử rối loạn cơ bắp di truyền, tiền sử độc tính cơ bắp với chất ức chế men HMG-CoA reductase, sử dụng đồng thời với fibrat hoặc niacin;
- Suy gan nặng;
- Suy thận nặng ($\text{CrCl} < 30 \text{ml/phút/1.73m}^2$);
- Suy giáp;
- Lạm dụng rượu;
- Những tình huống mà gia tăng nồng độ rosuvastatin có thể xảy ra.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI