

Коллоквиум по Математическому анализу-2, семестр 2

Виноградова Дарья, Залялов Александр, Миронов Алексей, Стрельцов Артём, Шамаилов Гершон

Содержание

- 1 Пространство кусочно-непрерывных функций на отрезке как пример евклидова пространства. Неравенство Коши-Буняковского на этом пространстве (б.д.). Ортогональные и ортонормированные системы в евклидовом пространстве. Главный пример: $C([-π; π])$ 4
- 2 Задача о наилучшем приближении элемента евклидова пространства элементом конечномерного пространства (б.д.). Ряд Фурье по произвольной ортонормированной системе. Ряд Фурье по тригонометрической системе. 5
- 3 Неравенство Бесселя (идея доказательства). Определения замкнутой и полной ортонормированных систем (ОНС). Тожество Парсеваля для замкнутой ОНС. 5
- 4 Бывают ли замкнутые ортонормированные системы, но не полные? 5
- 5 Дайте определение свертки двух функций $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Докажите, что операция свертки коммутативна. Дайте определение свертки двух 2π -периодических функций $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 5
- 6 Дайте определения ядра Дирихле и ядра Фейера. Какой смысл у свертки произвольной периодической функции с этими ядрами? (б.д.) 6
- 7 Сформулируйте (б.д.) теоремы о приближении 2π периодической функции тригонометрическими многочленами: о сходимости ядра Фурье в точке, и о приближении функции тригонометрическими многочленами в различных функциональных метриках. 6
- 8 Сформулируйте (б.д.) лемму Римана. Какова связь между порядком дифференцируемости 2π -периодической функции и асимптотикой ее коэффициентов Фурье? Ответ поясните. 6
- 9 Дайте определение преобразования Фурье для функции $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, приведите пример вычисления преобразования Фурье. Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$. Сформулируйте основную теорему об образе преобразования Фурье. 7
- 10 Что вы можете сказать о функции \hat{f} , если (1) f четная и вещественнозначная (2) f нечетная и вещественнозначная. 7
- 11 Дайте определение интеграла Фурье и обратного преобразования Фурье. Сформулируйте и докажите теорему о свертке. Чему равно преобразование Фурье от произведения двух функций? 7
- 12 Выведите формулу для производной $\hat{f}(y)$. Какова связь дифференцируемости функции $f(x)$ и асимптотики ее преобразования Фурье $\hat{f}(y)$ при $y \rightarrow \infty$ 8
- 13 Сформулируйте и докажите равенство Планшереля для преобразования Фурье. 9
- 14 Дайте определение гладкого k -мерного подмногообразия в \mathbb{R}^n и сопутствующее определение гладких координат. Приведите пример параметрической кривой, которая параметрически задана дифференцируемыми функциями, но не является гладким 1-мерным многообразием в какой-нибудь точке 9

- 15 Сформулируйте теорему о неявной функции. Допустим кривая $X \subseteq \mathbb{R}^2$ задана уравнением $f(x, y) = 0$, и известно, что $\text{grad}f(x_0, y_0) = (2; 0)$. Какую из координат x, y можно использовать в качестве локальной координаты на X в окрестности точки (x_0, y_0) ? 10
- 16 Сформулируйте общую теорему о неявном отображении. Допустим, кривая $X \subseteq \mathbb{R}^3$ задана уравнениями $f(x, y, z) = 0$, $g(x, y, z) = 0$, и известно, что $\text{grad}f(x_0, y_0, z_0) = (2; 0; 0)$, $\text{grad}g(x_0, y_0, z_0) = (0; 1; 3)$. Какие из координат x, y, z можно использовать в качестве локальных координат на X в окрестности точки (x_0, y_0, z_0) ? 11
- 17 Дайте определение касательного вектора к подмножеству $X \subseteq \mathbb{R}^n$ в точке $A \in X$. Как устроено множество всех касательных векторов к гладкому подмногообразию в фиксированной точке? 11
- 18 Допустим, что все точки множества $X \subset \mathbb{R}^n$ удовлетворяют уравнению $f(x) = 0$. Докажите, что в любой точке $x^{(0)} \in X$ любой касательный вектор к X перпендикулярен градиенту $\text{grad}f(x^{(0)})$. Опишите касательное пространство к k -мерному подмногообразию \mathbb{R}^n , заданному системой неявных уравнений (без доказательства). 12
- 19 Необходимое и достаточное условия локального экстремума для функции нескольких переменных (без доказательства). 12
- 20 Дайте определение точки условного минимума 13
- 21 Сформулируйте теорему о множителях Лагранжа. Объясните идею доказательства в случае, если подмножество $X \subset \mathbb{R}^n$ является гладким многообразием. 13
- 22 Сформулируйте достаточное условие в методе множителей Лагранжа. Объясните, как на практике проверять это условие (скажем, с помощью примера). 14
- 23 Сформулируйте теорему Каруша-Куна-Таккера. Объясните, в чём смысл условий дополняющей нежёсткости? 16
- 24 Дайте определение криволинейного интеграла 1-го рода и объясните, как такие интегралы вычисляются. 17
- 25 Дайте определение криволинейного интеграла 2-го рода и объясните, как такие интегралы вычисляются. 18
- 26 Объясните, почему криволинейный интеграл 1-го рода не зависит от ориентации кривой, а криволинейный интеграл 2-го рода – зависит. 19
- 27 Сформулируйте формулу Грина и докажите её для области $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ вида $\Omega = [a, b] \times [c, d]$ (прямоугольник). 19
- 28 Дайте определение элемента площади 2-мерной поверхности в \mathbb{R}^3 и поверхностного интеграла 1-го рода 20
- 29 Дайте определение элемента k -мерного объёма k -мерного многообразия в \mathbb{R}^n и интеграла 1-го рода по k -мерному многообразию 21
- 30 Объясните, что такое гассманово умножение, гассмановы переменные, гассмановы мономы 21
- 31 Объясните, что такое дифференциальная форма ранга k , и как вычисляется интеграл (2-го рода) от k -формы ω по k -мерному многообразию $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. Запишите вычислительную формулу для поверхностного интеграла 2-го рода 21
- 32 Что такое ориентация k -мерного многообразия? Как изменится интеграл 2-го рода от дифференциальной формы при смене ориентации многообразия (б. д.)? 22
- 33 Дайте определение согласованных ориентаций многообразия и его границы. Дайте определение дифференциала от k -формы. Запишите общую формулу Стокса. 23

34 Выведите из общей формулы Стокса частные случаи: формулу Ньютона-Лейбница, формулу Грина, формулу Гаусса-Остроградского.

23

Реклама

@applied_memes

@fcs_channels

1 Пространство кусочно-непрерывных функций на отрезке как пример евклидова пространства. Неравенство Коши-Буняковского на этом пространстве (б.д.). Ортогональные и ортонормированные системы в евклидовом пространстве. Главный пример: $C([-π; π])$

Напомним, что евклидово пространство - это векторное пространство над полем вещественных чисел со скалярным произведением.

Свойства скалярного произведения:

1. $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
2. $\langle \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2, v \rangle = \lambda_1 \langle u_1, v \rangle + \lambda_2 \langle u_2, v \rangle$
3. $\langle v, v \rangle \geq 0$
- 3'. $\langle v, v \rangle = 0 \Rightarrow v = 0$

Рассмотрим векторное пространство $V = \hat{C}([a; b])$ - множество кусочно-непрерывных функций на $[a; b]$ (имеющих конечное число точек разрыва первого рода), обладающих также следующим свойством:

$$f(c) = \frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow c-0} f(x) + \lim_{x \rightarrow c+0} f(x) \right)$$

Определим на \hat{C} скалярное произведение $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$ и проверим свойства, чтобы показать его корректность.

1-3 очевидны. 3' сначала рассмотрим для непрерывной на отрезке функции. От противного: пусть на отрезке существует какая-то точка c , в которой функция принимает ненулевое значение. Тогда $f^2(c) > 0$. В силу непрерывности есть такая окрестность $(c - \delta; c + \delta)$, в которой $f^2(x) \geq \epsilon > 0$.

$$\int_a^b f^2(x) dx \geq \int_{c-\delta}^{c+\delta} f^2(x) dx \geq 2\delta\epsilon > 0$$

Для \hat{C} отрезок разваливается на конечное число отрезков непрерывности, применим к ним предыдущее.

Теорема. (неравенство Коши-Буняковского) $\langle f, g \rangle^2 \leq \langle f, f \rangle \cdot \langle g, g \rangle$

Для нашего пространства оно имеет вид

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

Определение. Множество элементов $\psi_i \in V$ называется *ортогональной* системой, если для любой пары $\langle \psi_i, \psi_j \rangle = 0$. Если при этом $\|\psi_i\| = 1 \forall i$, то система *ортонормирована*.

В $C([-π; π])$ следующая система является ортонормированной:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 2x, \dots \right\}$$

Проверим норму на примере \cos :

$$\left\| \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kx \right\| = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(kx) dx} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \cos(2kx) + 1} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} = 1$$

Любая функция \cos ортогональна любой \sin в силу нечетности. Проверим ортогональность двух функций \cos :

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kx), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(lx) \right\rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) \cos(lx) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos((k+l)x) + \cos((k-l)x)) dx = 0$$

Остальное оставим в качестве упражнения для пытливого читателя.

2 Задача о наилучшем приближении элемента евклидова пространства элементом конечномерного пространства (б.д.). Ряд Фурье по произвольной ортонормированной системе. Ряд Фурье по тригонометрической системе.

Пусть имеется ортонормированная система $\{\psi_i\}$ в векторном пространстве V . Хотим найти наилучшее приближение элемента f этого пространства вида $\sum c_k \psi_k$ (т.е. $\|f - \sum c_k \psi_k\| \rightarrow \min$). Утверждается, что $c_k = \langle f, \psi_k \rangle$.

Определение. Ряд Фурье по произвольной ортонормированной системе $\{\psi_i\}$ - это сумма вида $\sum c_k \psi_k$

Определение. Ряд Фурье по тригонометрической системе - это сумма вида $\frac{f_0}{\sqrt{2\pi}} + \sum \frac{f_k}{\sqrt{\pi}} \cos(kx) + \frac{\hat{f}_k}{\sqrt{\pi}} \sin(kx)$, где $f_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$, $f_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$, $\hat{f}_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$

Обычно ряд Фурье записывают как $\frac{a_0}{2} + \sum a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$,

где $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$, $a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$, $b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$

3 Неравенство Бесселя (идея доказательства). Определения замкнутой и полной ортонормированных систем (ОНС). Тождество Парсеваля для замкнутой ОНС.

Теорема. (неравенство Бесселя) $\sum_{i=1}^{\infty} \langle f, \psi_i \rangle^2 \leq \|f\|^2$, где f - элемент векторного пространства V с ортонормированной системой $\{\psi_i\}$. Далее $f_i = \langle f, \psi_i \rangle$

Доказательство. $0 \leq \|f - \sum_{i=1}^n \langle f, \psi_i \rangle \psi_i\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{i=1}^n \langle f, \psi_i \rangle^2 = \|f\|^2 - \sum_{i=1}^n f_i^2$
 $\sum_{i=1}^n f_i^2$ ограничена сверху $\|f\|^2 \Rightarrow$ сходится. Переходим к пределу, получаем требуемое. \square

Определение. Ортонормированная система замкнута, если $\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \exists c_1, \dots, c_n \|f - \sum_{i=1}^n c_k \psi_k\| < \epsilon$

Определение. Ортонормированная система полная, если $[\forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow f \perp \psi_k] \Rightarrow f \equiv 0$

Теорема. (тождество Парсеваля) Для замкнутой ортонормированной системы $\sum_{i=1}^{\infty} f_i^2 = \|f\|^2$

Доказательство. Зафиксируем ϵ . Из определения замкнутости $\exists n \in \mathbb{N} \exists c_1, \dots, c_n \|f - \sum_{i=1}^n c_k \psi_k\| < \epsilon$.

Из неравенства Бесселя $\|f\|^2 - \sum_{i=1}^n f_i^2 \leq \|f - \sum_{i=1}^n c_k \psi_k\|^2 \leq \epsilon^2$.

Тогда для $m \geq n$ и подавно $\|f\|^2 - \sum_{i=1}^m f_i^2 \leq \|f - \sum_{i=1}^n c_k \psi_k\|^2 \leq \epsilon^2$

Значит, $\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \forall m \geq n \|f\|^2 - \sum_{i=1}^m f_i^2 \leq \epsilon^2$, и из этого и следует равенство в пределе. \square

4 Бывают ли замкнутые ортонормированные системы, но не полные?

Не бывает. Пусть $\forall i f \perp \psi_i$. Значит, $f_i = 0$. В силу замкнутости справедливо тождество Парсеваля. то есть $\|f\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} f_i^2 = 0$

5 Дайте определение свертки двух функций $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Докажите, что операция свертки коммутативна. Дайте определение свертки двух 2π -периодических функций $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение. Сверткой функций $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ называется $(f * g)(t) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) g(t - x) dx$

Теорема. $(f * g) \equiv (g * f)$

Доказательство. Положим $\tau = t - x$.

$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) g(t - x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(t - \tau) g(\tau) d\tau$ - область интегрирования не поменялась, а функция домножилась на модуль якобиана замены. В данном случае он равен 1. \square

Определение. Сверткой 2π -периодических функций $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется $(f * g)(t) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(t-x)dx$

6 Дайте определения ядра Дирихле и ядра Фейера. Какой смысл у свертки произвольной периодической функции с этими ядрами? (б.д.)

Определение. Ядром Дирихле называется $D_n(t) = \frac{\sin[(n+\frac{1}{2})t]}{2 \sin \frac{t}{2}}$

Обозначим $S_n(x, f) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$, где f - 2π -периодическая и интегрируемая на $[-\pi; \pi]$.

Тогда справедливо $S_n(x, f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)D_n(t)dt$ - то есть свертка с ядром Дирихле дает нам n -ю частичную сумму ряда Фурье.

Определение. Ядром Фейера называется $\Phi_n(t) = \frac{\sin^2(\frac{tn}{2})}{2 \sin^2 \frac{t}{2}}$

Обозначим $\sigma_n(x, f) = \frac{S_0(x, f) + \dots + S_{n-1}(x, f)}{n}$ - среднее арифметическое ряда Фурье.

Для f с теми же свойствами будет верно $\sigma_n(x, f) = \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)\Phi_n(t)dt$

7 Сформулируйте (б.д.) теоремы о приближении 2π периодической функции тригонометрическими многочленами: о сходимости ядра Фурье в точке, и о приближении функции тригонометрическими многочленами в различных функциональных метриках.

Теорема. Если 2π -периодическая функция имеет в точке производную слева и справа, то ряд Фурье в ней сходится к среднему арифметическому этих производных.

Заметим, что в условиях данной теоремы функция может быть разрывной.

Еще раз напомним, что $\sigma_n(x, f) = \frac{S_0(x, f) + \dots + S_{n-1}(x, f)}{n}$

Теорема. Пусть f - непрерывная 2π -периодическая функция. Тогда $\sigma_n \rightarrow f$ на $[-\pi, \pi]$ в смысле метрики d_∞

Теорема. Пусть f - кусочно-непрерывная. Тогда ее можно приблизить тригонометрическим многочленом в смысле метрики d_2 .

8 Сформулируйте (б.д.) лемму Римана. Какова связь между порядком дифференцируемости 2π -периодической функции и асимптотикой ее коэффициентов Фурье? Ответ поясните.

Лемма. (Риман). Пусть f абсолютно интегрируема на промежутке (a, b) . Тогда

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(\omega x) dx = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(\omega x) dx = 0$$

Теорема. Если f интегрируемая и 2π -периодическая, то ее коэффициенты a_n, b_n ряда Фурье стремятся к 0

Теорема. Пусть f - 2π -периодическая и имеет $s-1$ производную, а $f^{(s-1)}$ - кусочно-гладкая. Тогда ряд Фурье для $f^{(s)}$ получается s -кратным почленным дифференцированием ряда Фурье для f . При этом, $a_n, b_n = \bar{o}\left(\frac{1}{k^s}\right)$ при $k \rightarrow \infty$

Почему второе следствие верно? Интуитивно: чтобы выполнялась лемма Римана, требуется, чтобы коэффициенты стремились к 0. При дифференцировании $s-1$ раз у нас столько же раз «вылезет» k из косинуса и синуса, поэтому, чтобы все еще выполнялась сходимость к 0, нужно, чтобы $a_n, b_n = \bar{o}\left(\frac{1}{k^s}\right)$.

9 Дайте определение преобразования Фурье для функции $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, приведите пример вычисления преобразования Фурье. Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$. Сформулируйте основную теорему об образе преобразования Фурье.

Определение. Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Если выражение

$$\hat{f}(y) = F[f](y) = v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{ixy} dx$$

определено для всех $y \in \mathbb{R}$, то $\hat{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ называется преобразованием Фурье.

Например, пусть $f(x) = I_{[-1,1]}(x)$. Тогда

$$\hat{f}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} I_{[-1,1]}(x) e^{ixy} dx = \int_{-1}^1 e^{ixy} dx = \int_{-1}^1 \cos(xy) dx + i \int_{-1}^1 \sin(xy) dx = \frac{\sin(xy)}{y} \Big|_{-1}^1 = 2 \frac{\sin y}{y}$$

Определение. $L_1(\mathbb{R})$ – пространство функций, абсолютно интегрируемых на \mathbb{R} .

Теорема. (Основная теорема об образе Фурье) Если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то

1. Функция \hat{f} корректно определена.
2. Функция \hat{f} непрерывна.
3. $\lim_{y \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(y) = 0$

10 Что вы можете сказать о функции \hat{f} , если (1) f четная и вещественнозначная (2) f нечетная и вещественнозначная.

Лемма. 1. Если f – четная, то $F[f]$ – четная и вещественнозначная.

2. Если f – нечетная, то $F[f]$ – нечетная мнимозначная

Доказательство. Напрямую следует из того, что

$$F[f](y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ixy} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos(xy) dx + i \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin(xy) dx$$

Если f четная, то второй слагаемое зануляется, тогда Фурье-образ вещественнозначный и четный (не забываем, что четность смотрим по y , а не по x). Аналогично, если f нечетная, то зануляется первое, а Фурье-образ будет нечетный и мнимозначный. \square

11 Дайте определение интеграла Фурье и обратного преобразования Фурье. Сформулируйте и докажите теорему о свертке. Чему равно преобразование Фурье от произведения двух функций?

Определение. Интегралом Фурье от функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ в точке x называется выражение

$$\frac{1}{2\pi} v.p. \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(y) e^{-ixy} dy$$

Определение. Пусть f дифференцируемая функция, тогда преобразование

$$\hat{f}(y) \mapsto f(x) = \frac{1}{2\pi} v.p. \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(y) e^{-ixy} dy$$

называется обратным преобразованием Фурье.

Теорема. (О свертке) Если $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, то $F(f \star g) = F[f] \cdot f[g]$.

Доказательство.

$$F[f \star g](y) = \int_{-\infty}^{+\infty} (f - g)(x) e^{ixy} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(s) g(x-s) ds \right) e^{ixy} dx$$

Благодаря абсолютной интегрируемости, можем поменять порядки интегрирования, а следовательно, просто в виде кратного:

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(s) g(x-s) e^{ixy} dx ds = \left[\begin{array}{c} u = s \\ v = x - s \\ dx ds = du dv \end{array} \right] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{iuy} du \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} g(v) e^{ivy} dv = F[f] \cdot F[g].$$

Аналогично можно доказать для обратного преобразования. □

Теорема. $F[f \cdot g] = \frac{1}{2\pi} F[f] \star F[g]$

12 Выведите формулу для производной $\hat{f}(y)$. Какова связь дифференцируемости функции $f(x)$ и асимптотики ее преобразования Фурье $\hat{f}(y)$ при $y \rightarrow \infty$

Утверждение. Пусть $f(x)$ такова, что $f(x)(1+|x|)^k \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда $\hat{f} = F[f]$ дифференцируема k раз, причем производные \hat{f} можно вычислить дифференцированием под знаком интеграла.

Доказательство. Это следует из теорем прошлого семестра (что можно дифференцировать по параметру, в нашем случае по y , под знаком интеграла, если есть равномерная сходимость по x).

$$F[f](y) = v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{ixy} dx$$

$\forall m \leq k$ верно

$$\left| f(x) e^{ixy} (ix)^m \right| \leq |f(x)| (1+|x|)^m$$

В левой части стоит просто продифференцированное m раз подынтегральное выражение в преобразовании Фурье. Неравенство следует из ограниченности $|e^{ixy} \cdot i^m| \leq 1$. В правой части стоит функция, интегрируемая на \mathbb{R} (по условию).

При этом левая часть сходится равномерно по y . Значит, можем пользоваться теоремой из прошлого семестра:

$$\frac{d^m}{dy^m} \hat{f}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{ixy} (ix)^m dx$$

Отсюда же получаем формулу:

$$\frac{d^m}{dy^m} F[f](y) = F[(ix)^m f(x)]$$

□

Утверждение. Пусть f дифференцируема k раз во всех точках, причем $f^{(m)} \in L_1(\mathbb{R})$ при $m = 0, \dots, k$ и $f^{(m)}(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$ и $m = 0, \dots, k$, тогда $\hat{f}(y) = o\left(\frac{1}{|y|^k}\right)$ при $y \rightarrow \infty$

Доказательство. Запишем $F[f^{(k)}]$:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(k)}(x) e^{ixy} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixy} df^{(k-1)} = e^{ixy} f^{(k-1)}(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(k-1)}(x) \cdot (iy) e^{ixy} dx = \left[\begin{array}{l} \text{Далее аналогично.} \\ \text{Также пользуемся тем, что} \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f^{(m)} = 0 \quad \forall m = 0, \dots, k \end{array} \right] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{ixy} (-1)^m (iy)^m dx = (-iy)^k F[f](y) = (-iy)^k \hat{f}(y) \end{aligned}$$

Также мы знаем, что если функция абсолютно интегрируемая, то ее Фурье-образ стремится к 0 (см. билет 9). Тогда

$$f^{(k)} \in L_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \left| F[f^{(k)}](y) \right| = y^k F[f](y) \rightarrow 0 \Rightarrow \hat{f}(y) = \bar{o}\left(\frac{1}{|y^k|}\right)$$

P.S. И также, абсолютно аналогично с предыдущим пунктом выведем:

$$F\left[\frac{d^m}{dx^m} f(x)\right] = (-iy)^m F[f]$$

□

13 Сформулируйте и докажите равенство Планшереля для преобразования Фурье.

Теорема. (Равенство Планшереля) Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$ ($f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$) и, кроме того, $f'' \in L_1(\mathbb{R})$, а также $f(x), f'(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$. Тогда

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \overline{g(x)} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(y) \overline{\hat{g}(y)} dy$$

Доказательство. Функция дифференцируема, поэтому для нее работает формула обращения Фурье:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(y) e^{-ixy} dy$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \overline{g(x)} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(y) e^{ixy} dy \right) \overline{g(x)} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(y) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{g(x)} \cdot e^{ixy} dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(y) \overline{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) e^{ixy} dx \right)} dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(y) \overline{\hat{g}(y)} dy \end{aligned}$$

□

14 Дайте определение гладкого k -мерного подмногообразия в \mathbb{R}^n и сопутствующее определение гладких координат. Приведите пример параметрической кривой, которая параметрически задана дифференцируемыми функциями, но не является гладким 1-мерным многообразием в какой-нибудь точке

Определение. Подмножество $M \subseteq \mathbb{R}^n$ называется *гладким k -мерным (под)многообразием* в \mathbb{R}^n , если $\forall x \in M$ существует окрестность U , $x \in U$, такая что на $M \cap U$ можно задать гладкие координаты.

Определение. *Гладкие координаты* — отображение $\Phi: V \rightarrow M$, где $V \subseteq \mathbb{R}^k$, задаваемое уравнениями

$$\begin{cases} x_1 = \phi_1(t_1, \dots, t_k) \\ \vdots \\ x_n = \phi_n(t_1, \dots, t_k) \end{cases}$$

где (x_1, \dots, x_n) — координаты в \mathbb{R}^n , (t_1, \dots, t_k) — координаты в \mathbb{R}^k , при этом $(t_1, \dots, t_k) \in V$ тогда и только тогда, когда $(x_1, \dots, x_n) \in M$. При этом ϕ_1, \dots, ϕ_n дифференцируемы по каждой переменной и матрица частных производных невырождена.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial t_1} & \frac{\partial \phi_2}{\partial t_1} & \dots & \frac{\partial \phi_n}{\partial t_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial t_k} & \frac{\partial \phi_2}{\partial t_k} & \dots & \frac{\partial \phi_n}{\partial t_k} \end{pmatrix}$$

Ранг этой матрицы должен быть k в любой точке $t \in V$ (то есть все строки должны быть линейно независимы).

Пример:

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$$

Обе функции дифференцируемые, но в точке $t = 0$ обе производные обращаются в ноль. Поэтому кривая не гладкая.

15 Сформулируйте теорему о неявной функции. Допустим кривая $X \subseteq \mathbb{R}^2$ задана уравнением $f(x, y) = 0$, и известно, что $\text{grad} f(x_0, y_0) = (2; 0)$. Какую из координат x, y можно использовать в качестве локальной координаты на X в окрестности точки (x_0, y_0) ?

Теорема. Пусть есть функция $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, для которой выполнены условия:

1. F определена и непрерывна в окрестности (x_0, y_0)
2. $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ и F'_y непрерывна в (x_0, y_0)
3. $F(x_0, y_0) = 0$.

Тогда найдётся окрестность $U_{\delta, \epsilon}(x_0, y_0) = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \\ y \in (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \end{array} \right\}$ и непрерывная функция f такая, что в $U_{\delta, \epsilon}(x_0, y_0)$ $F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x)$ (то есть можно выразить y от x в данной окрестности при выполненных выше условиях).

Если кроме всех условий выше F дифференцируема в $U_{\delta, \epsilon}(x_0, y_0)$, то f дифференцируема в $U_\delta(x_0)$ и

$$f'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$$

Задача: проверяем условия теоремы, производная по x не равна нулю, а производная по y равна. Значит в качестве координаты можно взять y , а x — нельзя. Обратите внимание, координата — это не та переменная, по которой дифференцируем.

16 Сформулируйте общую теорему о неявном отображении. Допустим, кривая $X \subseteq \mathbb{R}^3$ задана уравнениями $f(x, y, z) = 0$, $g(x, y, z) = 0$, и известно, что $\text{grad} f(x_0, y_0, z_0) = (2; 0; 0)$, $\text{grad} g(x_0, y_0, z_0) = (0; 1; 3)$. Какие из координат x, y, z можно использовать в качестве локальных координат на X в окрестности точки (x_0, y_0, z_0) ?

Обозначения: $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_m)$, $(x, y) = (x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$.

Ещё обозначения: если функции g_1, \dots, g_s зависят от t_1, \dots, t_r , то

$$\frac{D(g_1, \dots, g_s)}{D(t_1, \dots, t_r)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial t_1} & \frac{\partial g_1}{\partial t_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial t_r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_s}{\partial t_1} & \frac{\partial g_s}{\partial t_2} & \dots & \frac{\partial g_s}{\partial t_r} \end{pmatrix}$$

(по строкам матрицы записаны градиенты (да, в 14 билете градиенты были записаны по столбцам, но так Айз давал на той лекции)).

Разрешим теперь m уравнений относительно m неизвестных.

Теорема. Пусть

1. $F_1(x, y), \dots, F_m(x, y)$ — непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $(x^{(0)}, y^{(0)})$ (здесь верхние индексы, чтобы не путать с координатами)
2. $F_j(x^{(0)}, y^{(0)}) = 0 \quad \forall j = 1, \dots, m$
3. $\det \frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(y_1, \dots, y_m)}|_{(x^{(0)}, y^{(0)})} \neq 0$

Тогда существует окрестность $U_\delta(x^{(0)}) \times U_\epsilon(y^{(0)})$ и набор дифференцируемых функций $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)$, таких что в этой окрестности

$$\{F_j(x, y) = 0\}_{j=1}^m \Leftrightarrow \{y_j = f_j(x)\}_{j=1}^m$$

при этом $f_j(x^{(0)}) = y_j^{(0)}$.

Более того,

$$\frac{D(f_1, \dots, f_m)}{D(x_1, \dots, x_n)} \Big|_{x^{(0)}} = - \left(\frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(y_1, \dots, y_m)} \right)^{-1} \Big|_{(x^{(0)}, y^{(0)})} \cdot \frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(x_1, \dots, x_n)} \Big|_{x^{(0)}}$$

Задача: Запишем матрицу

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Видим, что линейно независимы первый и второй столбец, и первый и третий. Значит координатой может быть z или y . Обратите внимание, если матрица производных по x и y невырождена, то подходит как координата z .

17 Дайте определение касательного вектора к подмножеству $X \subseteq \mathbb{R}^n$ в точке $A \in X$. Как устроено множество всех касательных векторов к гладкому подмногообразию в фиксированной точке?

Определение. Пусть $x^{(0)} \in X \subseteq \mathbb{R}^n$. Построим какую-нибудь кривую, которая целиком лежит в X и проходит через $x^{(0)}$. Пусть эта кривая задаётся параметрически $x_i = \psi_i(s)$, $s \in (-\epsilon, \epsilon)$, и $(\psi_1(s), \dots, \psi_n(s)) \in X \quad \forall s \in (-\epsilon, \epsilon)$, и $(\psi_1(0), \dots, \psi_n(0)) = x^{(0)}$. Тогда вектор $(\frac{d\psi_1}{ds}(0), \dots, \frac{d\psi_n}{ds}(0))$ называется *касательным* к X в точке $x^{(0)}$ (если такой вектор определён, конечно).

Замечание. Касательных векторов может быть бесконечно много, т. к. бесконечно много таких кривых.

Пусть X теперь — гладкое k -мерное многообразие и $x_i = \phi_i(t_1, \dots, t_k)$ — гладкие координаты в окрестности точки $x^{(0)} = \Phi(t^{(0)})$. Тогда множество касательных векторов в точке $x^{(0)}$ образует k -мерное векторное пространство (обозначается $T_{x^{(0)}}X$), линейно порождённое следующими векторами

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial t_1}(t^{(0)}), \dots, \frac{\partial \phi_n}{\partial t_1}(t^{(0)}) \\ \vdots \\ \frac{\partial \phi_1}{\partial t_k}(t^{(0)}), \dots, \frac{\partial \phi_n}{\partial t_k}(t^{(0)}) \end{pmatrix}$$

Замечание. Эти векторы задают аффинное пространство, чтобы получить геометрическое касательное пространство, нужно сдвинуть $T_{x^{(0)}}X$ в точку $x^{(0)}$.

18 Допустим, что все точки множества $X \subset \mathbb{R}^n$ удовлетворяют уравнению $f(x) = 0$. Докажите, что в любой точке $x^{(0)} \in X$ любой касательный вектор к X перпендикулярен градиенту $\text{grad} f(x^{(0)})$. Опишите касательное пространство к k -мерному подмногообразию \mathbb{R}^n , заданному системой неявных уравнений (без доказательства).

Имеем $\forall x \in X \ f(x) = 0$. Тогда для любой кривой $\{x_i = \phi_i(s)\} \subset X$ имеем $f(\phi_1(s), \dots, \phi_n(s)) = 0$. продифференцируем это по s , получаем

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \frac{f\phi_1}{ds} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \cdot \frac{f\phi_n}{ds} = 0$$

$$< \text{grad} f(x^{(0)}), \text{ касательный вектор к } X \text{ в точке } x^{(0)} > = 0$$

Из того, что скалярное произведение равно нулю, следует, что градиент f перпендикулярен касательному вектору к множеству X .

Касательное пространство — ортогональное дополнение к линейной комбинации градиентов неявных уравнений.

19 Необходимое и достаточное условия локального экстремума для функции нескольких переменных (без доказательства).

Определение. Точка $x^{(0)}$ функции f называется *стационарной*, когда $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^{(0)}) = 0 \quad \forall i \in [1; n]$.

Необходимое условие:

Теорема. Если $f(x^{(0)})$ - локальный экстремум, то $x^{(0)}$ — стационарная.

Определение. Матрицей Гессе называется симметричная квадратичная форма

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & & \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

Определение. Положительно определённой квадратичной формой называется такая, что все собственные значения положительны.

Определение. Отрицательно определённой квадратичной формой называется такая, что все собственные значения отрицательны.

Теорема. Теперь, пусть дана дважды дифференцируемая функция $f(x_1, \dots, x_n)$, пусть $x^{(0)}$ — стационарная точка. Тогда:

- Если матрица Гессе положительно определена, то $x^{(0)}$ — локальный минимум.
- Если матрица Гессе отрицательно определена, то $x^{(0)}$ — локальный максимум.
- Если матрица Гессе имеет и положительные и отрицательные собственные значения, но при этом не вырождена, то $x^{(0)}$ — не локальный экстремум.
- В остальных случаях $x^{(0)}$ может как являться локальным экстремумом, так и не являться.

20 Дайте определение точки условного минимума

Определение. Точка $x^{(0)}$ называется строгим условным минимумом функции f подмножества $X \subset \mathbb{R}^n$, если $\forall x \in X \quad f(x) > f(x^{(0)})$.

Определение. Точка $x^{(0)}$ называется условным локальным минимумом функции f подмножества $X \subset \mathbb{R}^n$, если существует окрестность $U(x^{(0)})$, такая что $\forall x \in U(x^{(0)}) \cap X \quad f(x) > f(x^{(0)})$.

Замечание. Далее будем считать, что такое множество задаётся набором уравнений вида $\phi(x) = 0$.

21 Сформулируйте теорему о множителях Лагранжа. Объясните идею доказательства в случае, если подмножество $X \subset \mathbb{R}^n$ является гладким многообразием.

Пусть у нас есть задача вида

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow \text{extr} \\ \phi_1(x) = 0 \\ \vdots \\ \phi_m(x) = 0 \\ x \in \mathbb{R}^n \\ m < n \end{cases}$$

Определение. Функцией Лагранжа называется

$$\begin{aligned} L(x, \lambda) &= f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) \\ x &\in \mathbb{R}^n \\ \lambda &\in \mathbb{R}^m \end{aligned}$$

λ называют множителями Лагранжа.

Теорема. Пусть $x^{(0)}$ — точка условного локального экстремума в задаче выше, и пусть в окрестности точки $x^{(0)}$ X — гладкое многообразие. Тогда существуют такие $\lambda^{(0)}$, что точка $(x^{(0)}, \lambda^{(0)}) = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}, \lambda_1^{(0)}, \dots, \lambda_m^{(0)}) \in \mathbb{R}^{m+n}$ является стационарной для $L(x, \lambda)$.

То есть

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_i}(x^{(0)}, \lambda^{(0)}) &= 0 \quad \forall i \in [1; n] \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_i}(x^{(0)}, \lambda^{(0)}) &= 0 \quad \forall i \in [1; m] \end{aligned}$$

Второе в силу линейности по λ эквивалентно $g_i(x^{(0)}) = 0$, что означает, что $x^{(0)} \in X$.
Посмотрим теперь на первое

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_j} &= \frac{\partial}{\partial x_j} (f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x)) = \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0 \\ \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} - \lambda_1 \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \end{pmatrix} - \dots - \lambda_m \begin{pmatrix} \frac{\partial g_m}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Это значит, что

$$\text{grad} f = \sum_{i=1}^m \lambda_i \text{grad} g_i$$

Так как, все наши переходы были равносильными, нам осталось доказать, что найдутся такие λ , то есть, что $\text{grad} f$ является линейной комбинацией $\text{grad} g_i$ в данной точке.

Поскольку X гладкая в точке $x^{(0)}$, будем предполагать, что X удовлетворяет условию теоремы о неявном отображении, то есть градиенты $\text{grad} g_i$ линейно независимы. Без ограничения общности будем считать $x^{(0)} \in X \subset \mathbb{R}^n$ — точка условного локального минимума. Тогда, если возьмём какую-нибудь кривую $\{x_i = \phi(t)\} \subseteq X$, такую, что $\phi_i(0) = x_i^{(0)}$, то на ней это также будет точка локального минимума, запишем касательный вектор

$$u = \left(\frac{d\phi_1}{dt}(0), \dots, \frac{d\phi_n}{dt}(0) \right) \in T_{x^{(0)}} X$$

Функция $\alpha(t) = f(\phi_1(t), \dots, \phi_n(t))$ имеет в $t = 0$ локальный минимум. По теореме Ферма $\frac{d\alpha}{dt}(0) = 0$. А это

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^{(0)}) \cdot \frac{d\phi_1}{dt}(0) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^{(0)}) \cdot \frac{d\phi_n}{dt}(0) = \langle \text{grad} f(x^{(0)}), u \rangle = 0$$

Таким образом, градиент целевой функции в точки экстремума перпендикулярен любому касательному вектору $u \in T_{x^{(0)}} X$, то есть $\text{grad} f(x^{(0)}) \perp T_{x^{(0)}} X$. А это значит, что этот градиент лежит в ортогональном дополнении

$$\text{grad} f(x^{(0)}) \in (T_{x^{(0)}} X)^\perp = \langle \text{grad} g_1(x^{(0)}), \dots, \text{grad} g_m(x^{(0)}) \rangle$$

А раз $\text{grad} f(x^{(0)})$ лежит в линейной оболочке $\text{grad} g_i(x^{(0)})$, то он является их линейной комбинацией.

22 Сформулируйте достаточное условие в методе множителей Лагранжа. Объясните, как на практике проверять это условие (скажем, с помощью примера).

Замечание. Пусть $Q = Q(y_1, \dots, y_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} y_i y_j$ — квадратичная форма на $\mathbb{R}^n = V$. Пусть $W \subset V$ — векторное подпространство. Тогда определена операция ограничения Q на подпространство W : $Q|_W$

Теорема. Достаточное условие локального условного экстремума.

Пусть $X = \{g_i(x) = 0 \mid i = 1, \dots, m\} \subset \mathbb{R}^n$ в точке $x^{(0)} \in X$ является гладким многообразием и $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — целевая функция (та, которую хотим оптимизировать на этом многообразии). Ограничим квадратичную форму $d^2 L$ на касательное пространство к X в точке $x^{(0)}$:

$$d^2 L(x^{(0)}, \lambda^{(0)})|_{T_{x^{(0)}} X}$$

Допустим, в точке $x^{(0)}$ выполнены условия Лагранжа:

$$\text{grad} f|_{x^{(0)}} = \sum_{i=1}^m \lambda_i^{(0)} \text{grad} g_i|_{x^{(0)}} \text{ и } g_i(x^{(0)}) = 0$$

Тогда:

- Если квадратичная форма положительно определена при этом ограничении, то $x^{(0)}$ – точка условного локального минимума для f ;
- Если квадратичная форма отрицательно определена при этом ограничении, то $x^{(0)}$ – точка условного локального максимума для f ;
- Если квадратичная форма знаконеопределённая при этом ограничении, то $x^{(0)}$ не является точкой условного локального экстремума для f ;
- Если квадратичная форма неотрицательно или неположительно определена при этом ограничении, то теорема ничего не говорит о точке $x^{(0)}$.

Пример 1. Оптимизируем $f = 3x + 4y$ на окружности $x^2 + y^2 - 1 = 0$. Запишем функцию Лагранжа:

$$L(x, y, \lambda) = 3x + 4y - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

Найдём стационарные точки:

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -2\lambda x + 3 = 0 \\ -2\lambda y + 4 = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{3}{2\lambda} \\ y = \frac{4}{2\lambda} \\ \left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{4}{2\lambda}\right)^2 - 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda_1 = \frac{5}{2} \\ x_1 = \frac{3}{5} \\ y_1 = \frac{4}{5} \end{cases} \text{ или } \begin{cases} \lambda_2 = -\frac{5}{2} \\ x_2 = -\frac{3}{5} \\ y_2 = -\frac{4}{5} \end{cases}$$

Исследуем точку (x_1, y_1) при помощи условия второго порядка:

$$d^2L = L''_{xx}dx^2 + 2L''_{xy}dxdy + L''_{yy}dy^2 + 2L''_{x\lambda}dxd\lambda + 2L''_{y\lambda}dyd\lambda + L''_{\lambda\lambda}d\lambda^2$$

Заметим, что $L''_{\lambda\lambda}d\lambda^2 = 0$, т.к. L линейна по λ (это верно всегда, а не только в этом примере). Теперь найдём полный дифференциал условия:

$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \Rightarrow d(x^2 + y^2 - 1) = d0 \Rightarrow 2xdx + 2ydy = 0$$

Также заметим, что $L''_{x\lambda} = -g'_x$, $L''_{y\lambda} = -g'_y$. Тогда:

$$L''_{x\lambda}dxd\lambda + L''_{y\lambda}dyd\lambda = d\lambda(g'_x dx + g'_y dy) = d\lambda dg = 0 \text{ (это верно всегда)}$$

Вычислим d^2L в точке $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{5}{2})$:

$$d^2L(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{5}{2}) = -5dx^2 - 5dy^2$$

Видим, что, без всякого ограничения, квадратичная форма d^2L в нужной точке отрицательно определена \Rightarrow при ограничении форма $d^2L|_{T_{(x_1, y_1)}X}$ тоже определена отрицательно $\Rightarrow (x_1, y_1)$ – точка локального максимума. Вторая точка исследуется аналогично.

Пример 2. Оптимизируем $f = 2x^2 - y^2$ при условии $e^y - \sin x - 1 = 0$. Запишем функцию Лагранжа:

$$L(x, y, \lambda) = 2x^2 - y^2 - \lambda(e^y - \sin x - 1)$$

Найдём стационарные точки (аналогично примеру 1):

$$\begin{cases} 4x + \lambda \cos x = 0 \\ -2y - \lambda e^y = 0 \\ e^y - \sin x - 1 = 0 \end{cases}$$

Исследуем решение $(x_0, y_0, \lambda_0) = (0, 0, 0)$ при помощи условия второго порядка:

$$d^2L = (4 - \lambda \sin x)dx^2 + (-2 - \lambda e^y)dy^2$$

Подставим точку $(0, 0, 0)$:

$$d^2L = 4dx^2 - 2dy^2 - \text{знаконеопределённая квадратичная форма}$$

Необходимо исследовать ограничение $d^2L|_{T_{x_0, y_0}X}$. Возьмём полный дифференциал от уравнения связи:

$$dg = d(e^y - \sin x - 1) = e^y dy - \cos x dx = 0$$

Подставим точку $(0, 0)$:

$$dg(0, 0) = dy - dx = 0 \Rightarrow dy = dx$$

Таким образом, «ограничить d^2L на $T_{x(0)}X$ означает «подставить в d^2L линейные соотношения на дифференциалы, полученные из уравнения $dg = 0$ ». Подставим в $4dx^2 - 2dy^2$ уравнение $dy = dx$:

$$d^2L|_{T_{(x_0, y_0)}X} = 2dx^2 > 0 \Rightarrow (0, 0) - \text{точка условного локального минимума.}$$


23 Сформулируйте теорему Каруша-Куна-Таккера. Объясните, в чём смысл условий дополняющей нежёсткости?

Мотивация. Помимо задач с ограничениями типа равенств, часто встречаются задачи с ограничениями типа неравенств. Например, вместо окружности $x^2 + y^2 = 1$ нужно исследовать круг $x^2 + y^2 \leq 1$. Такие задачи называются задачами нелинейного программирования. Пусть $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, тогда сформулируем задачу:

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow \text{extr} \\ g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m \text{ (} m \text{ может быть больше } n \text{)} \end{cases}$$

Пример.

$$\begin{cases} f(x, y) \rightarrow \text{extr} \\ g_1(x, y) = x^2 + y^2 - 1 \leq 0 \\ g_2(x, y) = -x - y \leq 0 \end{cases}$$



Пусть M — множество, которое задаётся ограничениями g_i . Разбор случаев (при помощи метода множителей Лагранжа):

1. Кандидатов в точки экстремума внутри M :

$$\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \\ g_1 < 0 \\ g_2 < 0 \end{cases}$$

2. Кандидаты на дуге окружности:

$$\begin{cases} f'_x - \lambda_1 (g_1)'_x = 0 \\ f'_y - \lambda_1 (g_1)'_y = 0 \\ g_1 = 0 \\ g_2 < 0 \end{cases}$$

3. Кандидаты на отрезке внутри круга:

$$\begin{cases} f'_x - \lambda_2(g_2)'_x = 0 \\ f'_y - \lambda_2(g_2)'_y = 0 \\ g_2 = 0 \\ g_1 < 0 \end{cases}$$

4. Кандидаты на пересечении окружности и прямой:

$$\begin{cases} f'_x - \lambda_1(g_1)'_x - \lambda_2(g_2)'_x = 0 \\ f'_y - \lambda_1(g_1)'_y - \lambda_2(g_2)'_y = 0 \\ g_1 = 0 \\ g_2 = 0 \end{cases}$$

Далее во всех полученных кандидатах вычисляем целевую функцию.

Теорема. Каруша-Куна-Таккера (простая версия для задачи с ограничениями типа неравенств).

Допустим, что $x^{(0)}$ – решение задачи $\begin{cases} f(x) \rightarrow \text{extr} \\ g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m \end{cases}$

Пусть $L(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x)$ – функция Лагранжа. Тогда в точке $x^{(0)}$ выполнено:

$$\begin{cases} L'_{x_j} = 0, j = 1, \dots, n \\ g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m \\ \lambda_i g_i(x) = 0, i = 1, \dots, m - \text{условия дополняющей нежёсткости} \end{cases}$$

Замечание. В чём смысл условий дополняющей нежёсткости?

Если $\lambda_i > 0$, то соответствующее ограничение $g_i(x) \leq 0$ в решении задачи выполняется как равенство $g_i(x) = 0$ (т.е. это ограничение «активно»).

Если же $g_i(x) < 0$, то соответствующий множитель Лагранжа λ_i должен быть равен нулю, и это ограничение не участвует в функции Лагранжа.

24 Дайте определение криволинейного интеграла 1-го рода и объясните, как такие интегралы вычисляются.

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ и $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывная функция, $\gamma \subset U$ – кривая и $\gamma = \{x_j = \varphi_j(t) | j = 1, \dots, n, t \in [a, b]\}$. Пусть (τ, c) – размеченное разбиение отрезка $[a, b]$, т.е. $\tau = (a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b)$, $c_i \in [t_{i-1}, t_i]$.

Определение. $|\tau| = \max_i (t_i - t_{i-1})$ – диаметр разбиения τ .

Замечание. Более общее определение: $|\tau| = \max_i (d_2(\varphi[t_i], \varphi[t_{i-1}]))$, где d_2 – евклидова метрика.

Определение. Определим интегральную сумму (1-го рода) по кривой γ :

$$S_{\tau, f, \gamma}^I = \sum_{i=1}^m f[\varphi(c_i)] \Delta l_i$$

$$\Delta l_i = d_2(\varphi(t_i), \varphi(t_{i-1})) = \sqrt{\sum_{j=1}^n (\varphi_j(t_i) - \varphi_j(t_{i-1}))^2}$$

Определение. Предел $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} S_{\tau, f, \gamma}^I = \int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_n) dl$ называется криволинейным интегралом 1-го рода от функции f по кривой γ .

Замечание. $\int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_n) dl$ не зависит от параметризации кривой γ .

Замечание. dl называется элементом длины кривой. По теореме Пифагора:

$$dl = \sqrt{(dx_1)^2 + \dots + (dx_n)^2} = [x_j = \varphi_j(t)] = \sqrt{(\varphi_1'(t)dt)^2 + \dots + (\varphi_n'(t)dt)^2} = \sqrt{\varphi_1'(t)^2 + \dots + \varphi_n'(t)^2} dt$$

Утверждение. Пусть γ задана параметрически: $x_j = \varphi_j(t), t \in [a, b]$ и $\varphi_j \in C^1([a, b])$. Тогда:

$$\int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_n) dl = \int_a^b f[\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)] \sqrt{\varphi_1'(t)^2 + \dots + \varphi_n'(t)^2} dt$$

Пример.

$$\int_{\gamma} 1 dl = \int_a^b \sqrt{\sum_i (\varphi_i')^2} dt - \text{длина кривой.}$$

25 Дайте определение криволинейного интеграла 2-го рода и объясните, как такие интегралы вычисляются.

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ и $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывная функция, $\gamma \subset U$ – кривая и $\gamma = \{x_j = \varphi_j(t) | j = 1, \dots, n, t \in [a, b]\}$. Пусть (τ, c) – размеченное разбиение отрезка $[a, b]$, т.е. $\tau = (a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b), c_i \in [t_{i-1}, t_i]$.

Мотивация. Хотим определить $\int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_n) dx_1$.

Определение. Определим интегральную сумму (2-го рода) по кривой γ :

$$S_{\tau, f, \gamma}^{II, x_1} = \sum_{i=1}^m f[\varphi(c_i)] \Delta x_1$$

$$\Delta x_1 = \varphi_1(t_i) - \varphi_1(t_{i-1})$$

Определение. Предел $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} S_{\tau, f, \gamma}^{II, x_1} = \int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_n) dx_1$ называется криволинейным интегралом 2-го рода от функции f по кривой γ по переменной x_1 .

Замечание. $\int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_n) dx_1$ «почти» (т.е. с точностью до знака) не зависит от параметризации кривой γ .

Замечание. $dx_1 = d\varphi_1(t) = \varphi_1'(t) dt$

Утверждение. Пусть γ задана параметрически: $x_j = \varphi_j(t), t \in [a, b]$ и $\varphi_j \in C^1([a, b])$. Тогда:

$$\int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 = \int_a^b f[\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)] \varphi_1'(t) dt$$

Аналогично определяются интегралы по любой другой координате.

Пример.

$$\int_{\gamma} 1 dx_1 = \int_a^b \varphi_1'(t) dt = \int_a^b d(\varphi_1(t)) = \varphi_1(b) - \varphi_1(a) - \text{полное изменение первой координаты при движении по кривой.}$$

Замечание. Более общо, можно брать интегралы от выражений вида $P_1(x_1, \dots, x_n) dx_1 + P_2(x_1, \dots, x_n) dx_2 + \dots + P_n(x_1, \dots, x_n) dx_n = \omega$:

$$\int_{\gamma} \omega := \int_{\gamma} P_1 dx_1 + \dots + \int_{\gamma} P_n dx_n = \int_a^b [P_1(\varphi(t)) P_1' + P_n(\varphi(t)) P_n'] dt$$

Определение. Выражения вида $P_1(x_1, \dots, x_n) dx_1 + P_2(x_1, \dots, x_n) dx_2 + \dots + P_n(x_1, \dots, x_n) dx_n$ называются дифференциальными 1-формами (или формами ранга 1).

Определение. Выражения вида $\int_{\gamma} \omega$ называются интегралами 2-го рода от 1-формы ω по кривой γ .

26 Объясните, почему криволинейный интеграл 1-го рода не зависит от ориентации кривой, а криволинейный интеграл 2-го рода – зависит.

Определение. Предел $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} S_{\tau, f, \gamma}^I = \int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_n) dl$ называется криволинейным интегралом 1-го рода от функции f по кривой γ .

Замечание. dl называется элементом длины кривой. По теореме Пифагора:

$$dl = \sqrt{(dx_1)^2 + \dots + (dx_n)^2} = [x_j = \varphi_j(t)] = \sqrt{(\varphi_1'(t)dt)^2 + \dots + (\varphi_n'(t)dt)^2} = \sqrt{\varphi_1'(t)^2 + \dots + \varphi_n'(t)^2} dt$$

Определение. Предел $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} S_{\tau, f, \gamma}^{II} = \int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_n) dx_1$ называется криволинейным интегралом 2-го рода от функции f по кривой γ по переменной x_1 .

Замечание. $dx_1 = d\varphi_1(t) = \varphi_1'(t)dt$

При изменении направления обхода интеграл 2-го рода меняет знак, а интеграл 1-го рода не меняет знак. Почему? Заметим следующее: в интегралах 2-го рода стоят выражения dx_1, \dots, dx_n , которые меняют знак при изменении направления обхода, а элемент длины $dl = \sqrt{(dx_1)^2 + \dots + (dx_n)^2}$ не зависит от знаков выражений dx_1, \dots, dx_n .

Замечание. Подробнее про смену знака dx_i (из билета 25).

Определим интегральную сумму (2-го рода) по кривой γ :

$$S_{\tau, f, \gamma}^{II, x_1} = \sum_{i=1}^m f[\varphi(c_i)] \Delta x_1$$

$$\Delta x_1 = \varphi_1(t_i) - \varphi_1(t_{i-1})$$

Видим, что Δx_i в определении интегральной суммы зависит от порядка обхода сегментов разбиения.

27 Сформулируйте формулу Грина и докажите её для области $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ вида $\Omega = [a, b] \times [c, d]$ (прямоугольник).

Теорема. Формула Грина.

Пусть $U \subset \mathbb{R}^2$ – связное подмножество, ограниченное кусочно-гладкой кривой $\partial U = \Gamma$ (граница множества U). Зафиксируем ориентацию на Γ , обход вдоль которой всегда оставляет область U слева. Пусть функции $P(x, y), Q(x, y)$ дифференцируемы в некоторой окрестности U . Тогда верно следующее:

1.

$$\int_{\Gamma} P(x, y) dx = \iint_U -\frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

2.

$$\int_{\Gamma} Q(x, y) dy = \iint_U \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy$$

3.

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy = \iint_U \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \text{формула Грина}$$

Доказательство. План:

1. Докажем формулу 1.
2. Формула 2 доказывается аналогично при помощи замены $x \leftrightarrow y$.
3. Формула 3 суть сумма формул 1 и 2.

Будем предполагать, что $U = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$, т.е. U – прямоугольник.

$\Gamma = \partial U = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3 \cup \Gamma_4$, где Γ_1, Γ_2 – горизонтальные отрезки ($y = c, y = d$), а Γ_3, Γ_4 – вертикальные отрезки.

Тогда:

$$\int_{\Gamma} P dx = \int_{\Gamma_1} P dx + \int_{\Gamma_2} P dx + \int_{\Gamma_3} P dx + \int_{\Gamma_4} P dx$$

Заметим, что $\int_{\Gamma_3} P dx + \int_{\Gamma_4} P dx = 0$, т.к. на вертикальных отрезках выполнено, что $x = \text{const} \Rightarrow dx = 0$.

Параметризуем: $\Gamma_1 = \begin{cases} x = t \\ y = c \end{cases} \quad t \in [a, b], \Gamma_2 = \begin{cases} x = t \\ y = d \end{cases} \quad t \in [b, a]$. Интегрируем по определению:

$$\int_a^b P(t, c) dt - \int_a^b P(t, d) dt = \int_a^b [P(t, c) - P(t, d)] dt = \star$$

Заметим, что подынтегральное выражение равно (по формуле Ньютона-Лейбница):

$$\int_d^c \frac{\partial P}{\partial y}(t, s) ds = - \int_c^d \frac{\partial P}{\partial y}(t, s) ds$$

Подставим:

$$\star = - \int_a^b \left[\int_c^d \frac{\partial P}{\partial y}(t, s) ds \right] dt = [\text{Переходим к кратному интегралу}] = - \iint_U \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

□

28 Дайте определение элемента площади 2-мерной поверхности в \mathbb{R}^3 и поверхностного интеграла 1-го рода

Пусть имеется двумерная поверхность $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ и у неё зафиксирована параметризация $\varphi : M \rightarrow \Omega, M \subseteq \mathbb{R}^2$. Будем обозначать координаты в \mathbb{R}^3 как (x, y, z) , а в \mathbb{R}^2 – как (u, v) . Неформально говоря, элементом площади в точке поверхности называется площадь бесконечно малого параллелограмма со сторонами, направленными параллельно касательным векторам в этой точке. Можно провести аналогию с одномерными интегралами, где мы приближаем функцию с помощью ломаной с маленькими звеньями, и сказать, что мы приближаем поверхность маленькими чешуйками в форме параллелограммов. Запишем теперь формулу для элемента площади в точке (u, v)

$$dS = S(P(\varphi'_u(u, v), \varphi'_v(u, v))) du dv;$$

Здесь φ'_u, φ'_v – трёхмерные векторы (так как φ имеет три координаты), именно они являются касательными в данной точке; P – параллелограмм, натянутый на векторы; S – площадь. Из линейной алгебры мы знаем, что площадь параллелограмма можно считать как корень из определителя матрицы Грама его сторон. Это даёт нам новую формулу для элемента площади.

$$dS = \sqrt{EG - F^2} du dv;$$

Здесь $E = \langle \varphi'_u, \varphi'_u \rangle = \|\varphi'_u\|^2, G = \langle \varphi'_v, \varphi'_v \rangle = \|\varphi'_v\|^2, F = \langle \varphi'_u, \varphi'_v \rangle$.

Теперь мы можем естественным образом определить поверхностный интеграл 1-го рода от функции $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ по Ω .

$$\iint_{\Omega} f(x, y, z) dS := \iint_M f(\varphi(u, v)) \sqrt{E(u, v)G(u, v) - F^2(u, v)} du dv;$$

Здесь мы опираемся на параметризацию при определении интеграла. Можно проверить, что при смене параметризации значение интеграла 1-го рода не изменится.

29 Дайте определение элемента k -мерного объёма k -мерного многообразия в \mathbb{R}^n и интеграла 1-го рода по k -мерному многообразию

Пусть имеется k -мерное многообразие $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ и у него зафиксирована параметризация $\varphi : M \rightarrow \Omega, M \subseteq \mathbb{R}^k$. Будем обозначать координаты в \mathbb{R}^n как $x = (x_1, \dots, x_n)$, а в \mathbb{R}^k — как $t = (t_1, \dots, t_k)$. Аналогично предыдущему билету, определим элемент k -мерного объёма в точке t .

$$dVol_k = S(P(\varphi'_{t_1}(t), \dots, \varphi'_{t_k}(t))) dt_1 \dots dt_k;$$

Запишем теперь формулу для интеграла 1-го рода от функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ по Ω .

$$\int_{\Omega} f(x) dVol_k := \int_M f(\varphi(t)) S(P(\varphi'_{t_1}(t), \dots, \varphi'_{t_k}(t))) dt_1 \dots dt_k;$$

Опять же, можно проверить, что интеграл 1-го рода не зависит от параметризации.

30 Объясните, что такое гассманово умножение, гассмановы переменные, гассмановы мономы

Пусть у нас имеется набор символов a_1, \dots, a_n — гассмановых переменных и мы умеем брать их линейные комбинации. То есть, например, у нас есть отдельные элементы $a_2 - a_1, 0, -5a_3$ и т. п. Теперь мы хотим ввести новую операцию — научиться умножать наши элементы друг на друга. Наше умножение будет обозначаться символом \wedge и называться гассмановым умножением. Умножение будет удовлетворять всем стандартным требованиям, кроме коммутативности, которую мы заменим на более странное свойство 4:

1. $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$;
2. $(x + y) \wedge z = x \wedge z + y \wedge z$;
3. $z \wedge (x + y) = z \wedge x + z \wedge y$;
4. $a_i \wedge a_j = -a_j \wedge a_i$;

Обратите внимание, пункты 1-3 относятся к любым элементам, а пункт 4 только к исходным a_1, \dots, a_n . Простые следствия из свойств: $0 \wedge x = 0, a_i \wedge a_i = 0$. Для примера посчитаем «квадрат» элемента $a_1 \wedge a_2 + a_3$.

$$\begin{aligned} (a_1 \wedge a_2 + a_3) \wedge (a_1 \wedge a_2 + a_3) &= a_1 \wedge a_2 \wedge (a_1 \wedge a_2 + a_3) + a_3 \wedge (a_1 \wedge a_2 + a_3) = 0 + a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 + a_3 \wedge a_1 \wedge a_2 + 0 = \\ &= a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 - a_1 \wedge a_3 \wedge a_2 = a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 + a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 = 2a_1 \wedge a_2 \wedge a_3; \end{aligned}$$

Определение. Гассмановым мономом степени k называется элемент вида $\alpha a_{i_1} \wedge \dots \wedge a_{i_k}$, где $i_1, \dots, i_k \in \{0, \dots, n\}$, α — некоторый коэффициент.

Заметим, что если среди i_1, \dots, i_k есть повторения, то моном равен нулю. Переменные в гассмановом мономе можно отсортировать, возможно, поменяв при этом знак. Точнее, при сортировке моном домножится на -1 в степени равной числу инверсий, то есть на знак перестановки.

31 Объясните, что такое дифференциальная форма ранга k , и как вычисляется интеграл (2-го рода) от k -формы ω по k -мерному многообразию $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. Запишите вычислительную формулу для поверхностного интеграла 2-го рода

Определение. Дифференциальной формой ранга k (или дифференциальной k -формой) на $M \subseteq \mathbb{R}^n$ называется выражение вида $\sum_{\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}} f_{i_1 \dots i_k}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$, где $f_{i_1 \dots i_k}$ — некоторые дифференцируемые¹ функции $f_{i_1 \dots i_k} : M \rightarrow \mathbb{R}$.

¹Часто ограничиваются гладкими функциями.

Если вам очень понравился предыдущий билет, можно сказать, что это сумма грассмановых мономов степени k от переменных dx_1, \dots, dx_n с дифференцируемыми функциями в качестве коэффициентов. Можно считать, что среди чисел i_1, \dots, i_k нет повторений, так как мономы с повторениями всё равно зануляются.

Пусть имеются k -мерное многообразие $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ с параметризацией $\varphi : M \rightarrow \Omega, M \subseteq \mathbb{R}^k$ и дифференциальная k -форма $\omega = \sum_{\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}} f_{i_1 \dots i_k}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ на Ω . Определим интеграл (2-го рода) ω по Ω .

$$\int_{\Omega} \omega := \int_M \sum_{\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}} f_{i_1 \dots i_k}(\varphi(t)) d\varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\varphi_{i_k};$$

Поясним, что творится в этой формуле. Во-первых, $\varphi_i : M \rightarrow \mathbb{R}$ — это функция, соответствующая i -й координате φ . Во-вторых, $d\varphi_i$ — это привычный дифференциал функции нескольких переменных, но теперь мы говорим, что это линейная комбинация грассмановых переменных dt_1, \dots, dt_k . Когда мы грассманово перемножим эти дифференциалы, у нас останется выражение вида $f(t) dt_1 \wedge \dots \wedge dt_k$. Это так, ведь в любом слагаемом результата будут перемножаться k переменных, одинаковые занулятся, останутся только слагаемые с различными, возможно, не в том порядке. Но мы можем привести порядок к правильному. После этих преобразований мы считаем интеграл как обычный кратный интеграл.

$$\int_M f dt_1 \wedge \dots \wedge dt_k = \int_M f dt_1 \dots dt_k;$$


Для случая $k = 2$ это всё можно записать в следующую формулу.

$$\iint_{\Omega} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \iint_M \begin{vmatrix} P & Q & R \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial v} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial v} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial v} \end{vmatrix} du dv;$$

Обратите внимание, при Q стоит $dz \wedge dx$, а не $dx \wedge dz$.

32 Что такое ориентация k -мерного многообразия? Как изменится интеграл 2-го рода от дифференциальной формы при смене ориентации многообразия (б. д.)?

Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — k -мерное связное² многообразие, и у него имеются две параметризации $\varphi : M \rightarrow \Omega, \psi : N \rightarrow \Omega; M, N \subseteq \mathbb{R}^k$. Предположим, что функция замены координат $c = \varphi^{-1} \circ \psi$ биективна и непрерывно дифференцируема.



Посмотрим на якобиан $J(c)$. Если бы где-то он был равен нулю, в окрестности этой точки c была бы необратима. Значит он не равен нулю нигде. Поскольку $J(c)$ непрерывен и Ω связно, из этого следует, что он имеет постоянный знак. Тогда если он положителен, будем говорить, что φ и ψ задают одну и ту же ориентацию, а если отрицателен — то разные. Таким образом мы определяем ориентацию как отношение эквивалентности с двумя классами на параметризациях многообразия.

Ориентация задаёт ориентацию на любом касательном пространстве $T_x \Omega$ как на векторном пространстве. Если мы назвали ориентацию некоторой параметризации положительной, то назовём положительным базис $T_x \Omega$, полученный из её производных.

При смене параметризации на имеющую противоположную ориентацию интеграл 2-го рода меняет знак.

²Напомним, многообразие называется гладким, если любые две его точки можно соединить проходяще по нему непрерывной кривой.

33 Дайте определение согласованных ориентаций многообразия и его границы. Дайте определение дифференциала от k -формы. Запишите общую формулу Стокса.

Будем обозначать границу многообразия Ω как $\partial\Omega$. Заметим, что если у k -мерного многообразия есть граница, то она имеет размерность $k - 1$.

Определение. Будем говорить, что ориентации Ω и $\partial\Omega$ согласованы, если для любой точки $x \in \partial\Omega$ для любого положительного базиса v_1, \dots, v_{k-1} в $T_x\partial\Omega$, базис $v_1, \dots, v_{k-1}, \vec{n}$ положителен в $T_x\Omega$, где \vec{n} — это вектор в $T_x\Omega$, перпендикулярный $T_x\partial\Omega$ и смотрящий наружу³ Ω .

Мы привыкли, что дифференциал суммы равен сумме дифференциалов. Поэтому для определения дифференциала от дифференциальной формы достаточно определить дифференциал от грассманова монома.

$$d(f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}) := df \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k};$$

Замечание. Дифференциал k -формы является $(k + 1)$ -формой.

Для примера посчитаем дифференциал от дифференциала некоторой функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

$$d(df) = d\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_j \wedge dx_i;$$

При этом слагаемые вида $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_i} dx_i \wedge dx_i$ сразу зануляются, а слагаемые вида $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_j \wedge dx_i$ сократятся с $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} dx_i \wedge dx_j$. Значит $d(df) = 0$.

Пусть теперь $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — k -мерное многообразие с согласованными ориентациями на самом многообразии и на границе, а ω — дифференциальная $(k - 1)$ -форма на Ω . Тогда верна (общая) формула Стокса:

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega;$$

34 Выведите из общей формулы Стокса частные случаи: формулу Ньютона-Лейбница, формулу Грина, формулу Гаусса-Остроградского.

Формула Ньютона-Лейбница, $n = k = 1$

Пусть наше многообразие это отрезок на прямой $[a; b]$. Его границей будет множество из двух точек $\{a, b\}$. Заметим, что точка — это нульмерное многообразие и по нему можно интегрировать 0-формы (то есть просто функции). При чём этот интеграл будет с точностью до знака (знак как всегда определяется ориентацией) равен значению функции в точке. Если на отрезке мы берём стандартную ориентацию «слева направо», то для границы это будет означать взятие b с плюсом и a с минусом. Итак, формула Стокса принимает следующий вид:

$$F(b) - F(a) = \int_a^b dF;$$

Перепишем в более привычную запись.

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a);$$

³Это можно формализовать, например, как отрицательное скалярное произведение с любым вектором, соединяющим x и точку из окрестности x из Ω . Но лектор это никак не формализовал.

Формула Грина, $n = k = 2$

Дифференциальная 1-форма в \mathbb{R}^2 имеет вид $Pdx + Qdy$. Посчитаем её дифференциал

$$\begin{aligned} d(Pdx + Qdy) &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \right) \wedge dy = \frac{\partial P}{\partial y} dy \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy = \\ &= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy; \end{aligned}$$

Формула Стокса принимает следующий вид:

$$\int_{\partial U} Pdx + Qdy = \iint_U \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy;$$

Здесь условие согласованности ориентации можно сформулировать как «при обходе ∂U по заданной параметризации U всегда находится слева».

Формула Гаусса-Остроградского, $n = k = 3$

Дифференциальная 2-форма в \mathbb{R}^3 имеет вид $Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$. Посчитаем её дифференциал.

$$\begin{aligned} d(Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy) &= \frac{\partial P}{\partial x} dx \wedge dy \wedge dz + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \wedge dz \wedge dx + \frac{\partial R}{\partial z} dz \wedge dx \wedge dy = \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz; \end{aligned}$$

Формула Стокса принимает следующий вид:

$$\iint_{\partial V} Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz;$$