

no gás 14,7%.

Resposta: 14,7%.

1. Um gás ideal é comprimido adiabaticamente de um volume inicial de 1,0 m³ para um volume final de 0,1 m³. Qual é a razão entre a pressão final e a pressão inicial?

- ☐ 10
- ☐ 100
- ☐ 1000
- ☐ 10000
- ☐ 100000

2. Um gás ideal é comprimido adiabaticamente de um volume inicial de 1,0 m³ para um volume final de 0,1 m³. Qual é a razão entre a temperatura final e a temperatura inicial?

- ☐ 10
- ☐ 100
- ☐ 1000
- ☐ 10000
- ☐ 100000

3. Um gás ideal é comprimido adiabaticamente de um volume inicial de 1,0 m³ para um volume final de 0,1 m³. Qual é a razão entre a pressão final e a pressão inicial?

- ☐ 10
- ☐ 100
- ☐ 1000
- ☐ 10000
- ☐ 100000

4. Um gás ideal é comprimido adiabaticamente de um volume inicial de 1,0 m³ para um volume final de 0,1 m³. Qual é a razão entre a temperatura final e a temperatura inicial?

- ☐ 10
- ☐ 100
- ☐ 1000
- ☐ 10000
- ☐ 100000

5. Um gás ideal é comprimido adiabaticamente de um volume inicial de 1,0 m³ para um volume final de 0,1 m³. Qual é a razão entre a pressão final e a pressão inicial?

- ☐ 10
- ☐ 100
- ☐ 1000
- ☐ 10000
- ☐ 100000

6. Um gás ideal é comprimido adiabaticamente de um volume inicial de 1,0 m³ para um volume final de 0,1 m³. Qual é a razão entre a temperatura final e a temperatura inicial?

- ☐ 10
- ☐ 100
- ☐ 1000
- ☐ 10000
- ☐ 100000

7. Um gás ideal é comprimido adiabaticamente de um volume inicial de 1,0 m³ para um volume final de 0,1 m³. Qual é a razão entre a pressão final e a pressão inicial?

- ☐ 10
- ☐ 100
- ☐ 1000
- ☐ 10000
- ☐ 100000

8. Um gás ideal é comprimido adiabaticamente de um volume inicial de 1,0 m³ para um volume final de 0,1 m³. Qual é a razão entre a temperatura final e a temperatura inicial?

- ☐ 10
- ☐ 100
- ☐ 1000
- ☐ 10000
- ☐ 100000