

KØBENHAVNS UNIVERSITETS ØKONOMISKE INSTITUT

1. ÅRSPRØVE 2012 S-1A rx ret

SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIK A

Fredag den 10. august 2012

RETTEVEJLEDNING

Opgave 1. Elasticiteter. Lad $I \subseteq \mathbf{R}$ være et åbent interval, og lad $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ være en differentiabel funktion.

- (1) Antag, at $f(x_0) \neq 0$ for et bestemt tal $x_0 \in I$. Forklar, hvad det vil sige, at funktionen f har elasticiteten $\text{El}f(x_0)$ i punktet x_0 .

Løsning. Lad Δx være en tilvækst i den variable x ud fra punktet x_0 , og lad Δf være en tilhørende funktionstilvækst. Man opstiller da størrelsen

$$S(\Delta x) = \frac{\frac{\Delta f}{f(x_0)}}{\frac{\Delta x}{x_0}}$$

og ser, om denne størrelse har en grænseværdi for Δx gående mod 0. Hvis dette er tilfældet, kaldes denne grænseværdi elasticiteten for funktionen f i punktet x_0 og betegnes med $\text{El}f(x_0)$, og man ser, at

$$\text{El}f(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} S(\Delta x) = x_0 \frac{f'(x_0)}{f(x_0)}.$$

- (2) Vis, at hvis f og g er to differentiable funktioner på intervallet I , hvor elasticiteterne $\text{El}f(x_0)$ og $\text{El}g(x_0)$ eksisterer, så findes elasticiteterne $\text{El}(fg)(x_0)$ og $\text{El}\left(\frac{f}{g}\right)(x_0)$, og man har, at

$$\text{El}(fg)(x_0) = \text{El}f(x_0) + \text{El}g(x_0), \text{ og at } \text{El}\left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \text{El}f(x_0) - \text{El}g(x_0).$$

Løsning. Idet vi har, at

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \text{ og } \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2},$$

får vi, at

$$x \frac{(fg)'(x)}{(fg)(x)} = x \frac{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}{f(x)g(x)} = x \frac{f'(x)}{f(x)} + x \frac{g'(x)}{g(x)},$$

hvoraf det fremgår, at

$$\text{El}(fg)(x_0) = \text{El}f(x_0) + \text{El}g(x_0).$$

Dernæst ser vi, at

$$x \frac{\left(\frac{f}{g}\right)'(x)}{\left(\frac{f}{g}\right)(x)} = x \frac{\frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}}{\frac{f(x)}{g(x)}} = x \frac{f'(x)}{f(x)} - x \frac{g'(x)}{g(x)},$$

hvoraf det fremgår, at

$$\text{El}\left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \text{El}f(x_0) - \text{El}g(x_0).$$

(3) Bestem elasticiteten af følgende funktioner i et vilkårligt punkt $x \in \mathbf{R}$:

$$f(x) = x^7 e^{2x} \quad \text{og} \quad g(x) = \frac{e^{3x}}{1+x^4}.$$

Løsning. Vi finder, at

$$\text{El}f(x) = x \frac{7x^6 e^{2x} + 2x^7 e^{2x}}{x^7 e^{2x}} = 7 + 2x,$$

og at

$$\text{El}g(x) = x \frac{\frac{3e^{3x}(1+x^4) - 4x^3 e^{3x}}{(1+x^4)^2}}{\frac{e^{3x}}{1+x^4}} = 3x - \frac{4x^4}{1+x^4}.$$

Opgave 2. Vi betragter funktionen $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, som er givet ved forskriften:

$$\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2 : f(x, y) = x^2 y - y + x.$$

(1) Bestem de partielle afledede

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \quad \text{og} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

for denne funktion i et vilkårligt punkt $(x, y) \in \mathbf{R}^2$.

Løsning. Vi finder, at

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy + 1 \quad \text{og} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 - 1.$$

- (2) Bestem de stationære punkter for funktionen f .

Løsning. Vi finder, at

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy + 1 = 0 \quad \text{og} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 - 1 = 0,$$

medfører, at $(x, y) = (1, -\frac{1}{2})$ og $(x, y) = (-1, \frac{1}{2})$.

- (3) Afgør for ethvert af de stationære punkter, om det er et maksimums-, et minimums- eller et sadelpunkt for funktionen f .

Løsning. Hessematricen $H(x, y)$ for denne funktion er

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 2y & 2x \\ 2x & 0 \end{pmatrix}.$$

Heraf fremgår det, at

$$H(1, -\frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{og at} \quad H(-1, \frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Begge disse matricer har determinanten -4 , så de stationære punkter er sadelpunkter for funktionen f .

- (4) Begrund, at funktionen f har både en største og en mindste værdi på mængden

$$K = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \wedge 0 \leq y \leq 1\},$$

og find disse værdier.

Løsning. Mængden K er kompakt, og funktionen f er kontinuert, så af ekstremværdisætningen får vi, at f antager både en største og en mindste værdi på mængden K .

Da funktionen f ikke har nogen ekstremumpunkter på \mathbf{R}^2 , vil den største og den mindste værdi for f på K blive antaget på randen af denne mængde. Vi opdeler randen i de fire stykker I, II, III og IV , og vi får så følgende udregninger:

I : $0 \leq x \leq 1, y = 0$, så $f(x, 0) = x$, som vokser. $f(0, 0) = 0$ og $f(1, 0) = 1$.

II : $x = 1, 0 \leq y \leq 1$, så $f(1, y) = 1$ på hele stykket II .

III : $0 \leq x \leq 1, y = 1$, så $f(x, 1) = x^2 + x - 1$, og $f'(x, 1) = 2x + 1$, som er positiv på stykket III . $f(1, 1) = 1$ og $f(0, 1) = -1$.

IV : $x = 0, 0 \leq y \leq 1$, så $f(0, y) = -y$, som aftager.

Vi ser nu, at størsteværdien er 1 og mindsteværdien er -1 .

Opgave 3. Betragt funktionen $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, som er givet ved forskriften

$$\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2 : f(x, y) = x^2 y^3 + 6xy^4.$$

(1) Vis, at funktionen f er homogen og angiv homogenitetsgraden.

Løsning. For $t > 0$ ser vi, at

$$f(tx, ty) = (tx)^2 (ty)^3 + 6(tx)(ty)^4 = t^5 (x^2 y^3 + 6xy^4) = t^5 f(x, y),$$

hvilket viser, at f er homogen af grad $k = 5$.

(2) Bestem de partielle afledede

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \quad \text{og} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

for denne funktion i et vilkårligt punkt $(x, y) \in \mathbf{R}^2$.

Løsning. Vi finder, at

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy^3 + 6y^4 \quad \text{og} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x^2 y^2 + 24xy^3.$$

(3) Godtgør, at

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)x + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)y = kf(x, y),$$

hvor k er homogenitetsgraden for funktionen f .

Løsning. Vi ser, at

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)x + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)y = 2x^2y^3 + 6xy^4 + 3x^2y^3 + 24xy^4 =$$

$$5x^2y^3 + 30xy^4 = 5(x^2y^3 + 6xy^4) = 5f(x, y).$$