

Cognition de la vision et sa modélisation

M2 CNA – 2023-2024

Louise Kauffmann

Cours créé par N. Guyader et A. Chauvin

CM3



2

Cognition de la vision et sa modélisation – CM3


Rappels CM 1 et 2

- Aboutir à une description d'une scène naturelle (reconnaissance d'objets) pour permettre de la catégoriser en s'inspirant du système visuel
 - On considère la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement
 - Considérer qu'une image numérique est un modèle de l'image rétinienne
- Le traitement de l'information visuelle débute dès la rétine: Les cellules de la rétine agissent comme des filtres spatiaux permettant la détection des contours à différentes échelles spatiales:
 - Voie M: informations grossières (BF) transmises rapidement
 - Voie P: informations fines (HF) transmises plus lentement

Cognition de la vision et sa modélisation – CM3

Le cortex visuel primaire V1

- Organisation laminaire (en couches)




Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

13

Cognition de la vision et sa modélisation – CM3

Le cortex visuel primaire V1

- Organisation laminaire (en couches)



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

14


Cognition de la vision et sa modélisation – CM3

Le cortex visuel primaire V1

- Champs récepteurs et colonnes d'orientation

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

16

Cognition de la vision et sa modélisation – CM3


Le cortex visuel primaire V1

- Champs récepteurs et colonnes d'orientation

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Hypothèse que la forme allongée des CR de ces cellules résulterait de la convergence d'informations provenant des cellules à CR centre-périphérie alignés



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

21


Le cortex visuel primaire V1

• Champs récepteurs et colonnes d'orientation

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Mise en évidence d'autres cellules sélectives à des barres orientées indépendamment de leur localisation dans le champ récepteur



→ Cellules « complexes »
Couches II, III, V

Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

22

Le cortex visuel primaire V1

• Champs récepteurs et colonnes d'orientation


Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Organisation en colonnes

- Une microélectrode insérée **perpendiculairement** aux différentes couches ne rencontre que des neurones **sélectifs à la même orientation**
- Une microélectrode insérée **tangemment** au sein d'une couche rencontre des neurones dont la **préférence d'orientation se modifie**

→ Colonnes d'orientations



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

Le cortex visuel primaire V1

• Sélectivité aux fréquences spatiales

Travaux de De Valois et al. (1982) chez le macaque

- Observation de neurones sélectifs à différentes bandes de fréquences spatiales → déterminé par la taille de leur CR (large CR = BF, petit CR = HF)
- Identification de cellules simples (sensibles à la localisation dans le champ récepteur) et complexes (i.e. non sensibles à la localisation dans le champ récepteur)



26

Le cortex visuel primaire V1


• Sélectivité aux fréquences spatiales

Travaux de De Valois et al. (1982) chez le macaque

- Observation de neurones sélectifs à différentes bandes de fréquences spatiales → déterminé par la taille de leur CR (large CR = BF, petit CR = HF)
- Identification de cellules simples (sensibles à la localisation dans le champ récepteur) et complexes (i.e. non sensibles à la localisation dans le champ récepteur)
- Lien entre les caractéristiques de sélectivité à l'orientation et celles aux fréquences spatiales → filtres 2D?

→ Neurones d'une colonne d'orientation donnée sélectifs à toutes les FS et vice versa

→ Colonnes regroupant toutes les orientations et toutes les FS = hypercolonne



30

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypercolonne.png>


Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

→ Une fonction « Gabor » est le meilleur modèle pour décrire ces deux dimensions (Jones & Palmer 1987)

→ obtenu par la multiplication entre une sinusoïde 2D et une fonction gaussienne 2D

→ Fonction Gabor = un signal sinusoïdal orienté dont l'amplitude diminue en fonction de l'éloignement du centre




An Evaluation of the Two-Dimensional Gabor Filter
Model of Simple Receptive Fields in Cat Striate Cortex
JEREMY P. JONES and LAUREN A. PALMER


Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?


$$G(X_\theta, Y_\theta, f, \theta, \sigma_x, \sigma_y) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{X_\theta^2}{\sigma_x^2} + \frac{Y_\theta^2}{\sigma_y^2}\right)\right) \times \exp(i2\pi f X_\theta)$$



Partie Réelle




Partie Imaginaire



Modélisation de la réponse de cellules simples à CR pair/impair

Le cortex visuel primaire V1 - Modèle




34

Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

$$G(X_\theta, Y_\theta, f, \theta, \sigma_x, \sigma_y) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{X_\theta^2}{\sigma_x^2} + \frac{Y_\theta^2}{\sigma_y^2}\right)\right) \times \exp(i2\pi f X_\theta)$$



Modélisation de la réponse de cellules complexes non sensibles à la phase (= module)

Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

→ Dans le domaine de Fourier, un filtre de Gabor correspond à une gaussienne appliquée au spectre d'amplitude

= filtre passe-bande orienté





Figure 1. The Gabor filter model.

An Evaluation of the Two-Dimensional Gabor Filter Model of Simple Receptive Fields in Cat Striate Cortex

FLORIAN P. JONES AND LARRY A. PALMER

Le cortex visuel primaire V1 - Modèle




→ Modélisation d'une hypercolonne corticale par un banc de filtres de Gabor


= Extraction en parallèle de contours orientés à différentes fréquences spatiales
= Échantillonnage du spectre d'amplitude dans le domaine fréquentiel

38


Exemple



Exemple




Exemple



41

Résumé

Source: https://www.wikidoc.com/wiki/Visual_system#Media:File:Visual_analysis.png


42

Traitements effectués de la rétine au cortex visuel primaire:
Exemple d'application

• Classification de scènes

Raisonnement: s'inspirer du système visuel humain qui est capable de catégoriser très rapidement des scènes sur la base d'informations globales qui comportent des régularités au sein de chaque catégories → régularités du spectre d'amplitude?

700 scènes classées dans les catégories « artificiel » ou « naturel »



Oliva, Torralba, Guitin-Dugué & Hérault (1999)


43

Traitements effectués de la rétine au cortex visuel primaire:
Exemple d'application

• Classification de scènes

Raisonnement: s'inspirer du système visuel humain qui est capable de catégoriser très rapidement des scènes sur la base d'informations globales qui comportent des régularités au sein de chaque catégories → régularités du spectre d'amplitude?

« discriminant spectral templates » (DST): montrent les composantes du SA qui permettent de classer les scènes




Oliva, Torralba, Guitin-Dugué & Hérault (1999)

Traitements effectués de la rétine au cortex visuel primaire:
Exemple d'application


• Prédiction de zones saillantes lors de l'exploration visuelle de scènes

Exemple des fixations observées:

Traitements effectués de la rétine au cortex visuel primaire:
Exemple d'application

• Construction d'une carte de saillance

- Image originale
- Modèle de rétine: output des cellules ganglionnaires
- Filtrage par un banc de filtres de Gabor (cellules simples V1)
- Calcul des cartes d'énergies (carré des images en sortie des filtres de Gabor – cellules complexes V1)
- Rehaussement des différences de contour locales et globales
- Moyennage des cartes d'orientations obtenues pour chaque bande de fréquences spatiales
- Carte de saillance: garde les zones d'énergie qui persistent dans chaque "scale maps".



Chauvin et al. (2002). Natural scene perception: visual attractors and image processing


Traitements effectués de la rétine au cortex visuel primaire: Exemple d'application

- Comparaison:



Fixations d'un groupe de participants

Chauvin et al. (2002). Natural scene perception: visual attractors and image processing




Carte de saillance issue d'un modèle


51

Au delà de V1: aires extra-striées


- En sortie de V1, l'information visuelle est transmise à l'aire visuelle V2
- La ségrégation des informations en provenance des couches M et P du CLG est préservée
→ projection sur des couches différentes de V2
- En sortie de V2: dissociation anatomique entre 2 voies dorsale et ventrale



Diagrammes un peu moins simplifiés




Felleman, D. J. and D. C. Van Essen (1991). "Distributed hierarchical processing in the primate cerebral cortex." Cerebral cortex. 1(1): 1-47.



Smith et al., Functional connectomics from resting-state fMRI Trends Cogn. Sci. (2013)


Au delà de V1: aires extra-striées

- En sortie de V1, l'information visuelle est transmise à l'aire visuelle V2
- La ségrégation des informations en provenance des couches M et P du CLG est préservée
→ projection sur des couches différentes de V2
- En sortie de V2: dissociation anatomique entre 2 voies dorsale et ventrale



→ Régions rétinotopiques et spécialisées dans l'extraction de caractéristiques élémentaires spécifiques...

Au delà de V1: aires extra-striées





Nécessité d'intégrer les caractéristiques physiques codées séparément en une configuration globale ou forme. Cette intégration suppose:

- De délimiter les contours, les bords de la forme.
- De remplir la forme via les propriétés de surface
- Regroupement des surfaces en objets tridimensionnels et liaisons entre ces objets

Extraction de caractéristiques élémentaires:


- Luminance
- Couleur
- Orientation
- Fréquences spatiales
- Binocularité
- Mouvement

Contours et surface déterminent l'objet




Contours et surface déterminent l'objet

Rôle fonctionnel: complétion de contours lors de masquage et ségrégation d'objets




Rôle de V2 dans l'extraction de contours

Enregistrement des cellules de V2 chez le macaque




von der Heydt et al., 1984, 1989

Au delà de V1: aires extra-striées



Extraction du mouvement

- Il existe dans V1 des cellules sélectives à la direction du mouvement
- Petit champ récepteur



- Ne permet pas de coder correctement un mouvement global


Source: Bear et al. Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed Pradel)

Extraction du mouvement

- Illustration:




Barber pole illusion



Extraction du mouvement


- Illustration:




Les 2 bars ont la même orientation mais des mouvements différents ...

Si on perçoit le mouvement de ces 2 bars à travers le rond on perçoit le même mouvement
→ Un champ récepteur de petite taille ne permet pas d'extraire correctement le mouvement

Extraction du mouvement






<https://www.youtube.com/watch?v=R0wUC8qg0Q>



L'intégration globale du mouvement peut aussi permettre d'extraire la forme
→ Des neurones de V3 sont sensibles à ce type de mouvement (Zeki, 1993)

Extraction du mouvement


Etude de la réponse des aires visuelles à un mouvement cohérent (vs aléatoire) – Braddick et al. (2001)



→ V3 et V5

→ V1/V2 répondent de la même façon à un mouvement cohérent ou aléatoire → la direction globale du mouvement est intégrée dès V3



Au delà de V1: aires extra-striées



Extraction du mouvement

Aire V5/MT

- Presque tous les neurones sont sensibles à la direction du mouvement
- Sensibilité à différents types de mouvements (latéral, radial, réel, apparent...), à leur vitesse, indices de profondeur sur la base du mouvement...



Illusion de mouvement à partir uniquement de 2 frames


<http://www.georgemather.com/>

Extraction du mouvement

Aire V5/MT


- Rôle causal dans la perception d'un mouvement fluide et continu?
 - Patient LM: Lésion bilatérale de V5
 - pas de problème de perception des parties, pas non plus de problème de perception des objets mais n'arrive pas à voir le mouvement = akinétopsie

« Lorsqu'elle se servait une tasse de café, celui-ci apparaissait comme quelque peu gelé au fond de la tasse et soudain débordait sur la table. Plus inquiétant, elle ne pouvait pas traverser une rue sans danger ; voir une voiture arriver à distance l'autorisait à traverser, sauf que l'instant d'après, la voiture était sur elle... »



Zihl, Von Cramon, & Mai, 1983;
Zihl, Von Cramon, Mai, & Schmid, 1991


Au delà de V1: aires extra-striées



Extraction du mouvement

Après V5, d'autres aires sont impliquées dans l'extraction de propriétés plus complexes du mouvement...

- Aire MST (medial superior temporal): Détection de mouvement en spirale



Extraction du mouvement


Après V5, d'autres aires sont impliquées dans l'extraction de propriétés plus complexes du mouvement...

- Aire MST (medial superior temporal): Détection de mouvement en spirale
- Aire STS (superior temporal sulcus): Détection de mouvements biologiques




GM


Au delà de V1: aires extra-striées



Au delà de V1: aires extra-striées




L'aire V4 sélective à la couleur?



L'aire V4 sélective à la couleur?

- Aire V4 contient des neurones sélectifs à la couleur
- ... mais aussi des neurones sélectifs à des formes complexes:

Exemple: étude de la réponse des cellules de V4 à des réseaux modulés de façon cartésienne (A), polaire (B) ou hyperbolique (C)




Gallant, J. L., C. E. Connor, S. Rakshit, J. W. Lewis and D. C. Van Essen (1996). "Neural responses to polar, hyperbolic, and Cartesian gratings in area V4 of the macaque monkey." *Journal of neurophysiology* 76(4): 2716-2739.

L'aire V4 sélective à la couleur?

- Aire V4 contient des neurones sélectifs à la couleur
- ... mais aussi des neurones sélectifs à des formes complexes:


Exemple: étude de la réponse des cellules de V4 à des réseaux modulés de façon cartésienne (A), polaire (B) ou hyperbolique (C)

→ Réponse prédominante à des modulations polaires et hyperbolique que cartésiennes



Gallant, J. L., C. E. Connor, S. Rakshit, J. W. Lewis and D. C. Van Essen (1996). "Neural responses to polar, hyperbolic, and Cartesian gratings in area V4 of the macaque monkey." *Journal of neurophysiology* 76(4): 2716-2739.


Au delà de V1: aires extra-striées



Voie du « Where » → Vision pour l'action


Etude de la réponse des neurones de l'aire IT

Travaux de Tanaka et al. chez le singe et le chat:




Etude de la réponse des neurones de l'aire IT

Travaux de Tanaka et al. chez le singe et le chat:



Etude de la réponse des neurones de l'aire IT

Travaux de Tanaka et al. chez le singe et le chat:




Complex objects are represented in macaque inferotemporal cortex by the combination of feature columns

doi:10.1016/j.neuron.2001.04.011

Mechanisms of visual object recognition studied in monkeys

KEIO TANAKA


Brain Research Bulletin 55: 21 (2000); Brain Res. 896: 100-108, 1999



Réduit la complexité des stimuli pour trouver le stimulus idéal (le super stimulus)

Etude de la réponse des neurones de l'aire IT

Travaux de Tanaka et al. chez le singe et le chat:




Complex objects are represented in macaque inferotemporal cortex by the combination of feature columns

doi:10.1016/j.neuron.2001.04.011

Mechanisms of visual object recognition studied in monkeys

KEIO TANAKA


Brain Research Bulletin 55: 21 (2000); Brain Res. 896: 100-108, 1999



- Une fois le stimulus idéal trouvé, les auteurs simplifient le stimulus jusqu'à ce que le neurone ne réponde plus.
- Ainsi, il est possible de déterminer un alphabet de formes auxquelles IT est sensible.

Etude de la réponse des neurones de l'aire IT

Travaux de Tanaka et al. chez le singe et le chat:



Complex objects are represented in macaque inferotemporal cortex by the combination of feature columns

doi:10.1016/j.neuron.2001.04.011

Mechanisms of visual object recognition studied in monkeys

KEIO TANAKA

Brain Research Bulletin 55: 21 (2000); Brain Res. 896: 100-108, 1999

→ Découvrent des neurones qui répondent maximale:


- à des formes relativement simples comme des "spots", des barres, des ellipses et des carrés
- les cellules primaires ("primary")
- à des combinaisons, p. ex., d'une forme et d'une couleur
- les cellules élaborées ("elaborate").

Les cellules répondants à des objets similaires semblent regroupées en colonies (Young, 1995).

→ spécialisation et organisation orientée objet ou partie de l'objet

Etude de la réponse des neurones de l'aire IT

- Neurones qui répondent sélectivement à certaines catégories d'objets, invariance de la réponse à la taille, la position, l'angle de vue, aux caractéristiques de surface...



Les réponses évoquent un continuum dans la représentation de l'espace des objets. Cette organisation permet d'avoir un continuum de réponse lors de transformations type rotation, translation dans l'espace 3D des objets


Tanaka, 2001

Chez l'homme?

- Travaux de Kanwisher & Epstein en IRMf (90's): Identification d'aires du cortex inférotemporal sélectives à différentes catégories de stimuli: scènes, visages, objets, animaux...



Exemple: identification des régions impliquées dans la perception de stimuli complexes en IRMf

Présentation de stimuli à catégoriser (visages, objets, scènes...) → Stimuli ne contenant pas d'information pouvant être reconnus



Chez l'homme?

- Travaux de Kanwisher & Epstein en IRMf (90's): Identification d'aires du cortex inférotemporal sélectives à différentes catégories de stimuli: scènes, visages, objets, animaux...




Fusiform face area (FFA)

Cognition de la vision et sa modélisation – CM3

Chez l'homme?


- Travaux de Kanwisher & Epstein en IRMf (90's): Identification d'aires du cortex inférior-temporal sélectives à différentes catégories de stimuli: scènes, visages, objets, animaux...



Cognition de la vision et sa modélisation – CM3

Chez l'homme?


- Travaux de Kanwisher & Epstein en IRMf (90's): Identification d'aires du cortex inférior-temporal sélectives à différentes catégories de stimuli: scènes, visages, objets, animaux...



Cognition de la vision et sa modélisation – CM3


Chez l'homme?

- Travaux de Kanwisher & Epstein en IRMf (90's): Identification d'aires du cortex inférior-temporal sélectives à différentes catégories de stimuli: scènes, visages, objets, animaux...
- Organisation en lien avec la représentation rétinotopique, la taille des stimuli?
 - Eg les régions sélectives à des catégories des petits stimuli (eg visages, objet) sont des régions qui répondent à des stimuli de petite taille, et à des représentations plutôt centrales
- Lien avec le niveau d'expertise pour ces différentes catégories?



Cognition de la vision et sa modélisation – CM3

Au delà de V1: aires extra-striées




Cognition de la vision et sa modélisation – CM3

Voies de « where » et du « what »

Arguments neuropsychologiques: double dissociation


Patients avec lésions de la voie ventrale:
déficits sélectifs à la reconnaissance visuelle (agnosies) sans déficit pour la perception du mouvement ou la reconnaissance d'actions

Patients avec lésions de la voie dorsale:
déficits sélectifs à la perception du mouvement, de l'espace ou la reconnaissance d'actions (akinetopsie, négligence spatiale...) sans déficit pour la reconnaissance visuelle



Cognition de la vision et sa modélisation – CM3

Organisation hiérarchique et modulaire du cortex visuel?




Localisation du champ récepteur dans le système visuel	Stimulus optimal
Cellule ganglionnaire à centre ON	Spot entouré d'un anneau sombre
Cellule simple de V1	Barres de lumière
Cortex visuel inférior-temporal	Visage
	Grand-mère


- La réponse des différentes aires le long des voies dorsales et ventrale suggère une organisation **hiérarchique** où chaque aire intègre une information de plus en plus complexe et devient de plus en plus sélective à des propriétés spécifiques et abstraites des stimuli visuels
- Augmentation de la taille des CR le long de la hiérarchie
- Jusqu'où peut-on aller en suivant ce principe?

Le neurone « Halle Berry »

- 8 patients épileptiques chez qui on a implanté des électrodes pour localiser les foyers épileptogènes: lobe temporal
- Présentation d'images (scènes, objets, visages...) pour localiser les populations de neurones qui répondent sélectivement à certains types de stimuli puis présentation de ces stimuli selon plusieurs versions



Organisation hiérarchique et modulaire des aires visuelles?



- Limite:
 - Au moins autant de connexions feedbacks que de connexions ascendantes + connexions horizontales
 - Nombreuses connexions qui « sautent » des niveaux
 - La réponse des aires visuelles n'est pas toujours expliquée par les propriétés des stimuli

→ Le traitement de l'information visuelle ne se fait pas uniquement de manière « bottom-up »

Le neurone « Halle Berry »

- Un neurone pour coder chaque concept de façon invariante? Peu probable pour plusieurs raisons...

- S'il existe un neurone "Halle Berry" et sachant qu'on estime le nombre neurone chez l'humain à ~86 millions, quelle est la probabilité de tomber dessus?
- Si par malheur ce neurone dysfonctionne?
- Degré d'invariance de la réponse du neurone? On ne peut pas s'assurer que le neurone n'aurait pas répondu à d'autres stimuli un peu différents étant donné le nombre limité de stimuli testés


=> Hypothèse de "sparse-coding": représentation d'un concept par l'activation conjointe d'un ensemble de neurones relativement petit => neurone enregistré est commun aux réseaux activés par les différentes représentations de Halle Berry.

- Avantage: réduit les coûts de traitements

Rôle des connexions « feedback »?


Modèle intégratif de Bullier (2001): rôle de V1 « as an active blackboard »

- Lorsque le stimulus est bruité ou ambigu, nécessité d'avoir accès à une représentation globale pour guider le traitement des éléments locaux
- Hypothèse de « rétroinjection » des traitements effectués par les aires de haut niveau vers les aires de plus bas niveaux



Rôle des connexions « feedback »?

Arguments expérimentaux




Rôle des connexions « feedback »?

Arguments expérimentaux

- Enregistrement de la réponse de neurones des aires V1, V2 et V3 chez le singe à un stimulus en mouvement
- Inactivation temporaire de V5 ("cooling")

→ Les influences "feedback" en provenance de V5 facilitent la réponse des aires de plus bas niveau à des stimuli en mouvement




Traitements effectués de la rétine au cortex visuel primaire: Limites

- Le traitement de l'information n'est pas uniquement ascendant (bottom-up)!


Exemple: enregistrement en IRMf de l'activité du cortex visuel primaire...

...Lors de la présentation vs absence d'un stimulus visuel



...Lors de l'imagerie mentale du stimulus

→ Activité du cortex visuel sans stimulation visuelle → influences descendantes (top-down)



Le Bihan et al. (1993). PNAS.