

## ЛЕКЦІЯ № 18

### Тема 7.2 «Профілактика професійних захворювань»

#### ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. Види професійних захворювань.
2. Профілактика професійних захворювань.

Список професійних захворювань, затверджений в Україні, включає до себе 7 груп захворювань. Вони розподіляються, переважно, за етіологічною ознакою: 1) захворювання, що виникають під впливом хімічних факторів; 2) захворювання, викликані впливом промислових аерозолів; 3) захворювання, викликані дією фізичних факторів; 4) захворювання, пов'язані з фізичним перевантаженням та перенапруженням окремих органів і систем; 5) захворювання, викликані дією біологічних факторів; 6) алергічні захворювання; 7) злоякісні новоутворення (професійний рак).

До списку внесені професійні захворювання, які виникають виключно внаслідок дії несприятливих виробничо-професійних факторів (пневмоконіози, вібраційна хвороба, бурсит та ін.).

**Пневмоконіоз** — хронічне захворювання легенів, яке виникає внаслідок тривалого вдихання та відкладання в легенях пилу і характеризується розвитком дифузного фіброзу. Сьогодні використовується більш уточнене трактування даної хвороби. Залежно від видів пилу, який вдихають працівники пневмоконіоз поділяється на силікоз та антракоз .

**Силікоз** — пневмоконіоз, зумовлений впливом пилу, який містить вільний діоксид кремнію. Це найбільш розповсюджена форма пневмоконіозу, перебіг якої особливо обтяжений. Захворювання набуло значного поширення з кінця XIX століття, головним чином у зв'язку з розвитком гірничої промисловості, де в процесі праці утворюється пил, який містить вільний діоксид кремнію. Зміни в легенях внаслідок дії пилу настають, як правило, після тривалого часу роботи. Розвиток захворювання залежить від кількості пилу, що потрапив в організм, вмісту в ньому вільного діоксиду кремнію, а також схильності організму до захворювання. Граничне допустима концентрація (ГДК) пилу, що містить більше 70% вільного діоксиду кремнію, становить 1 мг/м<sup>3</sup> , від 10 до 70% — 2 мг/м<sup>3</sup> , від 2 до 10% — 4 мг/м<sup>3</sup> .

**Антракоз легень** — один з видів пневмоконіозу; захворювання, яке виникає внаслідок відкладання в легенях вугільного пилу, що потрапляє з забрудненого повітря.



Профілактика пневмоконіозу передбачає проведення:

- комплексної механізації виробничих процесів;
- організації ефективної промислової вентиляції (знепилення в місцях перевантаження);
- гігієнічного нормування професійних шкідливостей;
- обліку і розслідування окремих випадків професійних захворювань;
- раціональна організація праці і відпочинку;
- попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють в умовах професійних шкідливостей;
- застосування

індивідуальних засобів захисту: респіраторів.

**Вібраційна хвороба** — професійне захворювання, викликане впливом вібрації. Вперше цю патологію описав Лоріга в 1911 р. як синдром «мертвих пальців», а в 1955 р. вона одержала назву «вібраційна хвороба». Основним фактором, що призводить до розвитку захворювання, є вібрація. З фізичної точки зору вібрація є механічним коливальним рухом, який повторюється через певні проміжки часу. Виділяють локальну вібрацію, яка діє переважно на руки працюючого під час роботи із віброінструментом, і загальну вібрацію, яка впливає на весь організм. Локальна вібрація має місце при використанні робітниками пневматичних і електричних інструментів (відбійні молотки, бурильні станки), віброшвидкість яких перевищує ГДР в 3-10 разів. Вплив загальної вібрації спостерігається в разі перебування робітника безпосередньо на установці від двигунів, машин, устаткування, що працюють. Вираженість і час розвитку захворювання визначаються зоною частот і кількістю коливальної енергії, що передається тілу людини або його обмеженій частині, а також факторами, що сприяють розвитку вібраційної хвороби: вимушеним положенням тіла, охолодженням, шумом.

**Профілактика. Технічні заходи** — зменшення вібрації у джерелі їх утворення, застосування різних амортизаційних засобів; гігієнічне нормування рівня вібрації; організація режиму праці при мінімальному контакті тих, хто працює, з вібруючим устаткуванням.

Робота шахтних механізмів і машин супроводжується інтенсивним шумом. Рівень шуму під час роботи гірничого устаткування і молотків складає 96-118 дБА при ГДР 80 дБА. Це призводить до розвитку у шахтарів нейросенсорної приглухуватості.

**У розвитку професійної приглухуватості виділяють чотири ступені втрати слуху.** Професійна приглухуватість протікає за типом кохлеарного невриту і характеризується повільним розвитком. Спочатку відмічається шум у вухах, який поступово стає інтенсивнішим і постійним. При дослідженні камертоном або при аудіометрії вже на ранніх стадіях відзначається зниження сприймання високих частот (4000—6000 Гц) і скорочення костної провідності. Поступово зниження слуху розповсюджується і на інші тони, знижується рівень сприймання шепітної мови. Звертає на себе увагу погана чутність шепіту, в той час як чутність на розмовну мову остається доброю. Остання порушується тільки в разі наявності дуже великого стажу роботи в умовах «впливу шумів (20 років і більше).

Введення в слухові проходи протишумових вкладишів типу «Беруші»; застосування навушників. Попередні та періодичні медичні огляди.

**Професійний бурсит** — хронічне запалення синовіальної сумки, яке розвивається в результаті систематичного тиснення, перенапруження і травматизації у гірників, представників тих професій, де має місце тривале упирання на лікоть або коліно із малопотужними і пологими пластами і обумовлені вимушеним положенням тіла під час

роботі у лаві. Розвиткові захворювання сприяють незручна поза, жорсткість ґрунту, недосконалість захисного одягу, тривале охолодження, вібрація.

Профілактика: застосування засобів індивідуального захисту (наколінники та налокотники), організація режиму праці, попередні та періодичні медичні огляди.

### **Питання для закріплення матеріалу:**

1. Чим викликані захворювання антракоз та силікоз?
2. Які заходи проводять для профілактики пневмоконіозів?
3. Перші ознаки вібраційного захворювання?
4. Чим викликаний бурсит у працівників?

Література: Голінько В.І. Основи охорони праці. с.114-117.

