

Tema 9. Proyecto 4

Viacheslav Shalisko

23 de julio de 2019

Modelo correlativo de distribución de una especie biológica

Cargar las bibliotecas requeridas

```
library(sp)
library(raster)
library(dismo)
```


Lectura de los archivos fuente

1) GeoTIFF con 19 capas de variables BIOCLIM (WorldClim 2)


```
# raster con variables BIOCLIM (WorldClim 2)
bio_vars <- stack("datos/biovars_OM_30sec.tif")
bio_vars
```

```
## class      : RasterStack
## dimensions : 484, 469, 226996, 19  (nrow, ncol, ncell, nlayers)
## resolution : 0.008333333, 0.008333333  (x, y)
## extent      : -105.9248, -102.0165, 18.21198, 22.24531  (xmin, xmax, ymin, ymax)
## crs         : +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0
## names       : biovars_OM_30sec.1, biovars_OM_30sec.2, biovars_OM_30sec.3, biovars_OM_30sec.
4, biovars_OM_30sec.5, biovars_OM_30sec.6, biovars_OM_30sec.7, biovars_OM_30sec.8, biovars_OM
_30sec.9, biovars_OM_30sec.10, biovars_OM_30sec.11, biovars_OM_30sec.12, biovars_OM_30sec.13,
biovars_OM_30sec.14, biovars_OM_30sec.15, ...
## min values :      7.804167,      8.383333,      54.437225,      94.80443
6,      15.700000,      -1.200000,      12.800001,      9.116667,
7.083333,      9.466666,      5.550000,      431.000000,      108.000000,
0.000000,      74.650505, ...
## max values :      27.89167,      21.29167,      83.96118,      353.8048
1,      39.40000,      19.60000,      30.30000,      30.23333,
28.76667,      30.76667,      25.50000,      1936.00000,      478.00000,
14.00000,      135.29018, ...
```

```
plot(bio_vars,c(1:9), col = grey(1:100/100), nc=3)
```



```
plot(bio_vars,c(10:18), col = grey(1:100/100), nc=3)
```



2) Tabla GBiF con registros de presencia

```
# tabla de registrois de ocurrencia  
ocurrencias <- read.delim("datos/0016216-190621201848488.csv")  
dim(ocurrencias)
```

```
## [1] 4146 45
```

```
str(ocurrencias)
```

```
## 'data.frame':    4146 obs. of  45 variables:
## $ gbifID          : num  2.28e+09 2.28e+09 2.27e+09 2.27e+09 2.27e+09 ...
## $ datasetKey      : Factor w/ 43 levels "33948acc-bfac-4107-92c8-6464de38782
2",...: 5 5 5 5 5 10 10 38 38 38 ...
## $ occurrenceID    : Factor w/ 4135 levels "", "15629d62-f56c-4a37-84a2-ea2d66
cba4c5",...: 59 52 63 62 53 3653 3652 6 15 10 ...
## $ kingdom         : Factor w/ 1 level "Plantae": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ phylum        : Factor w/ 1 level "Tracheophyta": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
...
## $ class           : Factor w/ 1 level "Magnoliopsida": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
...
## $ order           : Factor w/ 1 level "Fagales": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ family          : Factor w/ 1 level "Fagaceae": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ genus           : Factor w/ 1 level "Quercus": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ species         : Factor w/ 67 levels "", "Quercus acutifolia",...: 52 52 52
37 65 4 20 1 37 4 ...
## $ infraspecificEpithet : logi  NA NA NA NA NA NA ...
## $ taxonRank       : Factor w/ 2 levels "GENUS","SPECIES": 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2 ...
## $ scientificName   : Factor w/ 95 levels "Quercus acapulcensis Trel.",...: 73
73 73 53 92 5 33 46 52 5 ...
## $ countryCode     : Factor w/ 1 level "MX": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ locality        : Factor w/ 2362 levels "", "'Cerro La Petaca' a SW outlier
of the Sa de Manantlan; along trail to El durazno, 5-10 Km ESE of Casimiro Casti"| __truncate
d__,...: 1 1 1 1 1 2261 1278 1353 963 1543 ...
## $ publishingOrgKey : Factor w/ 16 levels "174c6da2-e002-42fe-9f56-2f9d670240f
4",...: 5 5 5 5 5 10 10 9 9 9 ...
## $ decimalLatitude : num  20.6 20.7 20.8 20.8 20.6 ...
## $ decimalLongitude : num  -103 -104 -103 -103 -104 ...
## $ coordinateUncertaintyInMeters: num  NA 15 NA 31 31 NA NA 15000 10000 5000 ...
## $ coordinatePrecision : logi  NA NA NA NA NA NA ...
## $ elevation        : num  NA NA NA NA NA ...
## $ elevationAccuracy : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ depth            : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ depthAccuracy    : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ eventDate        : Factor w/ 1333 levels "", "1838-10-17T00:00:00Z",...: 1326
1321 1331 1332 1322 1288 1301 10 226 812 ...
## $ day              : int   26 18 20 20 25 17 3 29 26 19 ...
## $ month            : int    4 3 5 5 3 6 11 10 7 2 ...
## $ year             : int   2019 2019 2019 2019 2019 2013 2013 1904 1965 1987
...
## $ taxonKey         : int   2879646 2879646 2879646 2879847 2879637 2878107 288
0560 2877951 2877219 2878107 ...
## $ speciesKey       : int   2879646 2879646 2879646 2879847 2879637 2878107 288
0560 NA 2879847 2878107 ...
## $ basisOfRecord    : Factor w/ 4 levels "HUMAN_OBSERVATION",...: 1 1 1 1 1 3 3
3 3 3 ...
## $ institutionCode  : Factor w/ 45 levels "ASU","CAS","CETI",...: 21 21 21 21 2
1 29 29 1 1 1 ...
## $ collectionCode   : Factor w/ 50 levels "Angiosperms",...: 39 39 39 39 39 33
33 41 41 41 ...
## $ catalogNumber    : Factor w/ 2940 levels "00169001","00169024",...: 833 736
931 914 764 224 223 2752 2755 2753 ...
## $ recordNumber     : Factor w/ 319 levels "", "1026", "10484",...: 1 1 1 1 1 302
25 19 21 20 ...
## $ identifiedBy     : Factor w/ 268 levels "", "A. Alvarez Alvarez",...: 1 1 1 1
1 186 186 1 109 1 ...
```

```
## $ dateIdentified      : Factor w/ 51 levels "", "1913-01-01T00:00:00Z", ...: 51 39
49 48 40 24 24 1 1 1 ...
## $ license             : Factor w/ 3 levels "CC_BY_4_0", "CC_BY_NC_4_0", ...: 2 2 2
2 2 1 1 1 1 1 ...
## $ rightsHolder        : Factor w/ 17 levels "", "Adilson Pinedo-Escatel", ...: 6 10
3 5 11 13 13 1 1 1 ...
## $ recordedBy          : Factor w/ 791 levels "", "A. Alvarez A.", ...: 162 392 106
113 425 396 39 84 485 675 ...
## $ typeStatus          : Factor w/ 6 levels "", "HOLOTYPE", ...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
...
## $ establishmentMeans  : logi NA NA NA NA NA NA ...
## $ lastInterpreted     : Factor w/ 3784 levels "2018-12-05T23:22:04.639Z", ...: 378
1 3780 3779 3778 3777 3767 3768 3479 3480 3478 ...
## $ mediaType           : Factor w/ 2 levels "", "STILLIMAGE": 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
...
## $ issue               : Factor w/ 54 levels "COORDINATE_REPROJECTED", ...: 19 20 2
0 20 20 19 19 19 19 19 ...
```


```
levels(ocurrencias$species)
```

```
## [1] "" "Quercus acutifolia"
## [3] "Quercus affinis" "Quercus aristata"
## [5] "Quercus candicans" "Quercus castanea"
## [7] "Quercus chihuahuensis" "Quercus convallata"
## [9] "Quercus cortesii" "Quercus crassifolia"
## [11] "Quercus crassipes" "Quercus cualensis"
## [13] "Quercus deserticola" "Quercus diversifolia"
## [15] "Quercus durifolia" "Quercus dysophylla"
## [17] "Quercus eduardi" "Quercus elliptica"
## [19] "Quercus fulva" "Quercus gentryi"
## [21] "Quercus germana" "Quercus glaucescens"
## [23] "Quercus glaucoides" "Quercus grahamii"
## [25] "Quercus gravesii" "Quercus grisea"
## [27] "Quercus hintonii" "Quercus iltisii"
## [29] "Quercus insignis" "Quercus jonesii"
## [31] "Quercus laeta" "Quercus lancifolia"
## [33] "Quercus laurifolia" "Quercus laurina"
## [35] "Quercus laxa" "Quercus liebmannii"
## [37] "Quercus magnoliifolia" "Quercus martinezii"
## [39] "Quercus mexicana" "Quercus microphylla"
## [41] "Quercus nixoniana" "Quercus oaxacana"
## [43] "Quercus obtusata" "Quercus ocoteifolia"
## [45] "Quercus oocarpa" "Quercus peduncularis"
## [47] "Quercus planipocula" "Quercus potosina"
## [49] "Quercus praeco" "Quercus praineana"
## [51] "Quercus rekonis" "Quercus resinosa"
## [53] "Quercus rugosa" "Quercus salicifolia"
## [55] "Quercus scytophylla" "Quercus sebifera"
## [57] "Quercus sideroxyla" "Quercus splendens"
## [59] "Quercus subspathulata" "Quercus tuberculata"
## [61] "Quercus tuitensis" "Quercus urbani"
## [63] "Quercus uxoris" "Quercus vicentensis"
## [65] "Quercus viminea" "Quercus virginiana"
## [67] "Quercus xalapensis"
```

Generar mascara de tierra firme

```
mask_reclass_table <- matrix(c(-Inf, Inf, 1), ncol=3, byrow=TRUE)
bio_vars_mask <- reclassify(subset(bio_vars,1),mask_reclass_table)

# representar todos registros
plot(bio_vars_mask, legend = FALSE, main = "Puntos de presencia")
points(ocurrencias$decimalLongitude, ocurrencias$decimalLatitude, cex = 0.5)
```



Generar 1000 puntos aleatorios para muestreo de la variabilidad ambiental en zona de tierra firme

```
set.seed(0)
puntos_aleatorios_fondo <- randomPoints(bio_vars_mask, 1000)
```

Seleccionar la especie de interés (solo columnas de nombre de especie y coordenadas)

```
ocurrencias_especie <- ocurrencias[ocurrencias$species == "Quercus candicans",c("species","de
cimalLongitude","decimalLatitude")]

dim(ocurrencias_especie)
```

```
## [1] 179 3
```

```
head(ocurrencias_especie)
```

```
##           species decimalLongitude decimalLatitude
## 21  Quercus candicans      -103.4005         20.36783
## 24  Quercus candicans      -103.6285         19.45942
## 106 Quercus candicans      -103.6166         19.72361
## 107 Quercus candicans      -103.6166         19.72361
## 114 Quercus candicans      -104.2367         19.55667
## 200 Quercus candicans      -103.8483         20.78667
```


Subdividir datos en dos juegos: entrenamiento y control

```
# separar datos
fold <- kfold(ocurrencias_especie, k = 4)

ocurrencias_especie_entrenamiento <- ocurrencias_especie[ fold != 4, ]
ocurrencias_especie_control <- ocurrencias_especie[ fold == 4, ]

plot(bio_vars_mask, legend = FALSE, main = "Puntos de presencia de la especie y muestreo")
points(puntos_aleatorios_fondo, col = "blue", cex = 0.5, pch = 3)
points(ocurrencias_especie_control[,2], ocurrencias_especie_control[,3],
      col = "red", cex = 0.8, pch = 19)
points(ocurrencias_especie_entrenamiento[,2], ocurrencias_especie_entrenamiento[,3],
      col = "black", cex = 0.8, pch = 19)
```

Puntos de presencia de la especie y muestreo



Inferir el modelo de entropía máxima

Para lograr que funciona la aplicacipón se requiere descargar y manualmente copiar al carpeta correspondiente el archivo **maxent.jar**, la carpeta es donde en su computadora se instalan los modulos de usuario, por ejemplo: Documents/R/win-library/3.6/dismo/java/


```
modelo_maxent <- maxent(x = bio_vars,
                        p = ocurrencias_especie_entrenamiento[,2:3],
                        a = puntos_aleatorios_fondo)
```

```
## Loading required namespace: rJava
```

Revisar la contribución de variables


```
plot(modelo_maxent)
```

Variable contribution



Revisar las curvas de respuesta

```
response(modelo_maxent)
```

Predicción

```
prediccion <- predict(bio_vars, modelo_maxent, progress='window')
```


```
## Loading required namespace: tcltk
```

```
prediccion
```

```
## class      : RasterLayer
## dimensions : 484, 469, 226996 (nrow, ncol, ncell)
## resolution : 0.008333333, 0.008333333 (x, y)
## extent     : -105.9248, -102.0165, 18.21198, 22.24531 (xmin, xmax, ymin, ymax)
## crs        : +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0
## source     : memory
## names      : layer
## values     : 0.0002527371, 0.9999999 (min, max)
```

```
plot(prediccion, main = "Probabilidad de presencia estimada")
```

Probabilidad de presencia estimada




Evaluación

```
evaluacion <- evaluate(p = ocurrencias_especie_control[,2:3],
  a = puntos_aleatorios_fondo,
  x = bio_vars,
  model = modelo_maxent)
evaluacion
```

```
## class      : ModelEvaluation
## n presences : 45
## n absences  : 1000
## AUC         : 0.9209778
## cor         : 0.4939781
## max TPR+TNR at : 0.4331439
```

```
par(mfrow=c(1, 3))
plot(evaluacion, 'ROC')
density(evaluacion)
boxplot(evaluacion, col=c('lightblue','coral'), notch=TRUE)
```



```
umbrales <- threshold(evaluacion)
umbrales
```

```
##           kappa spec_sens no_omission prevalence equal_sens_spec
## thresholds 0.7569987 0.4331439 0.04177623 0.04327246      0.3151308
##           sensitivity
## thresholds 0.1183304
```

```
umbrales$spec_sens
```

```
## [1] 0.4331439
```

Reclasificación de acuerdo con el umbral de igualdad entre la especificidad y la sensibilidad


```

especie_reclass_table <- matrix(c(-Inf, umbrales$spec_sens, 0,
                                umbrales$spec_sens, Inf, 1),
                                ncol=3, byrow=TRUE)
prediccion_presencia <- reclassify(prediccion, especie_reclass_table)

plot(prediccion_presencia, main = "Probable presencia", legend = FALSE)
points(ocurrencias_especie[,2], ocurrencias_especie[,3],
       col = "black", cex = 0.8)

```

Probable presencia



Guardar los resultados en formato raster

```

writeRaster(prediccion, filename = "datos/probabilidad_32bits.tif",
            format="GTiff", datatype = "FLT4S", overwrite = TRUE)

writeRaster(prediccion_presencia, filename = "datos/presencia_16bits.tif",
            format="GTiff", datatype = "INT2S", overwrite = TRUE)

```