

PRÁCTICA 1: ANÁLISIS DESCRIPTIVO

NOMBRE: VERONICA TANCARA CASILLA
MODULO: ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS



1. Análisis descriptivo de 1 variable cualitativa


Descriptives

mental_health_history	
N	1100
Perdidos	0
Media	0.493
Mediana	0.00
Desviación estándar	0.500
Mínimo	0
Máximo	1
Shapiro-Wilk W	0.637
Shapiro-Wilk p	<.001

Plots

mental_health_history





2. Análisis descriptivo de 2 variables cualitativas

Contingency Tables

mental_health_history	living_conditions						Total
	0	1	2	3	4	5	
0	11	19	105	227	172	24	558
1	18	157	241	100	17	9	542
Total	29	176	346	327	189	33	1100


χ^2 Tests

	Value	df	p
χ^2	346	5	<.001
N	1100		

Nominal

	Value
Contingency coefficient	0.489

Plots




3. Análisis descriptivo de 2 variables cuantitativas

Correlation Matrix

		anxiety_level	stress_level
anxiety_level	r de Pearson	—	
	gl	—	
	valor p	—	
stress_level	r de Pearson	0.737***	—
	gl	1098	—
	valor p	<.001	—

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Plot



4. Análisis descriptivo de 1 variable cuantitativa


Descriptives




	anxiety_level
N	1100
Perdidos	0
Media	11.1
IC 95% de la media límite inferior	10.7
IC 95% de la media límite superior	11.4
Mediana	11.0
Moda	13.0
Desviación estándar	6.12
Varianza	37.4
Intervalo	21
Mínimo	0
Máximo	21
Asimetría	-0.0826
Error est. asimetría	0.0738
Curtosis	-1.09
Error est. curtosis	0.147
W de Shapiro-Wilk	0.958
Valor p de Shapiro-Wilk	<.001

Note. The CI of the mean assumes sample means follow a t-distribution with N - 1 degrees of freedom

Plots

anxiety_level






5. Transforme con la expresión " $y = \ln(1 + x)$ " 1 variable cuantitativa y realice un análisis descriptivo



Descriptives

In_self_esteem	
N	1100
Perdidos	0
Media	2.73
Mediana	3.00
Moda	3.26
Desviación estándar	0.773
Mínimo	0.00
Máximo	3.43
Asimetría	-1.67
Error est. asimetría	0.0738
Curtosis	2.55
Error est. curtosis	0.147
W de Shapiro-Wilk	0.801
Valor p de Shapiro-Wilk	<.001

Plots

In_self_esteem






6. Análisis descriptivo de 1 variable cualitativa y 1 variable cuantitativa

Descriptives		
	mental_health_history	anxiety_level
N	0	558
	1	542
Perdidos	0	0
	1	0
Media	0	7.24
	1	15.0
Mediana	0	7.00
	1	16.0
Desviación estándar	0	4.89
	1	4.56
Mínimo	0	0
	1	1
Máximo	0	21
	1	21

Plots

anxiety_level



7. Análisis inferencial de 1 variable cualitativa binaria y 1 variable cuantitativa

Independent Samples T-Test

		Statistic	df	p
anxiety_level	T de Student	-27.2	1098	<.001

Note. $H_a: \mu_0 \neq \mu_1$

8. Análisis inferencial de 2 variables cuantitativas

Correlation Matrix

		anxiety_level	depression
anxiety_level	r de Pearson	—	
	gl	—	
	valor p	—	
depression	r de Pearson	0.694***	—
	gl	1098	—
	valor p	<.001	—

Note. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

9. Análisis inferencial de 1 variable cuantitativa

One Sample T-Test

		Statistic	df	p
anxiety_level	T de Student	-21.3	1099	<.001

Note. $H_a: \mu \neq 15$

10. Análisis inferencial de 1 variable cualitativa no binaria y 1 variable cuantitativa

One-Way ANOVA (Welch's)


	F	df1	df2	p
stress_level	268	5	154	<.001

Group Descriptives

	living_conditions	N	Mean	SD	SE
stress_level	0	29	0.897	0.860	0.1596
	1	176	1.778	0.587	0.0443
	2	346	1.477	0.550	0.0296
	3	327	0.560	0.561	0.0310
	4	189	0.143	0.479	0.0348
	5	33	1.091	0.843	0.1467

Plots

stress_level



Descriptives

Descriptives

N
Missing
Mean
Median
Standard deviation
Minimum
Maximum

References

[1] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

[2] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).