1.کدام از داروهای زیر در میگرن قابل استفاده است؟

الف) پروپرانولول ب) آلکالوئید ارگوت (ارگوتامین سی) ج) سوماتریپتان د) سالبوتامول

2. کدام یک از داروهای زیر جزو مخدر ها است؟

الف) پتیدین ب) مورفین ج) فنتانیل د) سوماتریپتان

3. عوارض خارج هرمی از عوارض کدام دارو است؟

الف) اندانسترون ب) هیوسین ج) فاموتیدین د) متوکلوپرامید

4. کدام یک ضد تهوع است؟

الف) اندانسترون ب) امپرازول ج) فاموتیدین د) دایمتیکون

5. در بیمار با بیماری قلبی که دچار درد است کدام مسکن توصیه می شود؟

الف) ناپروکسن ب) کتورولاک ج) ایبوپروفن د) کفنامیک اسید

6. کدام یک در خانم باردار که تب دارد ارجع است؟

الف) استامینوفن ب) دیکلوفناک ج) ایبوپروفن د) ناپروکسن

7. کدام یک از داروهای زیر برای آفت دهان مناسب است؟

الف) دیفن هیدرامین ب) سیتریزین ج) لوراتادین د) فکسوفنادین

8. کدام یک علامت اختصاری پماد چشمی است؟

الف) nasal drop ب) ophthalmic drop ج) ophthalmic oin د) supp

9. کدام یک برای برفک دهان استفاده می شود؟

الف) قطره نیستاتین ب) بتامتازون ج) فاموتیدین د) اکسپکتورانت

10. دپومترول (Depo Medrol) نام تجاری کدام دارو است؟

الف) متیل پردنیزلون ب) فلوتیکازون ج) بکلومتازون د) امپرازول

11. رستانکس نام تجاری کدام دارو است؟

الف) مومتازون ب) فلوتیکازون ج) بکلومتازون د) بودزوناید

12. برای حمله آسم کدام یک استفاده می شود (کدام یک سریع اثرتر است)؟

الف) سالبوتامول ب) سالمترول ج) فورمترول د) کرومولین

13. کدام یک از داروهای ضد یبوست برای بیمار با مشکل انسداد روده منع مصرف دارد؟

الف) بیزاکودیل ب) PEG ج) لاکتولوز د) سوربیتول

14. کدام یک ازنمادهای زیر نشانگر اشکال تنفسی است؟

الف) Nasal Spray ب) Neb ج) Supp د) گزینه الف و ب

15. کدام یک نیاز به نسخه ندارد؟

الف) آمپول نوروبیون ب) قرص سفکسیم ج) آمپول کتورولاک د) کپسول کوآموکسی کلاو

16. کدام یک از موارد مصرف کورتون ها نیست؟

الف)جلوگیری از رد پیوند قلب ب) درمان اگزما ج) درمان آسم د) درمان دیابت

17. کدام یک از موارد زیر جزو عوارض کورتون ها نیست؟

الف) افزایش قند خون ب) افت فشار خون ج) کاعش سیستم ایمنی د) عوارض گوارشی

18. بعد از مصرف کدام یک از آنتی بیوتیک های زیر باید آب زیاد مصرف شود و تا یک ساعت از دراز کشیدن خودداری کرد؟

الف) داکسی سایکلین ب) سفکسیم ج) آموکسی سیلین د) مترونیدازول

19. کدام یک از داروهای زیر با لبنیات تداخل دارد و باید حداقل فاصله دو ساعت را رعایت شود؟

الف) داکسی سایکلین ب) آموکسی سیلین ج) پنی سیلین د) مترونیدازول

20. برای عرق سوز ناشی از پوشک کردن نوزاذ کدام یک به صورت طولانی مصرف می شود؟

الف) کالامین(کالاندولا) ب) هیدروکورتیزون ج) تریامسینولون د) بتامتازون

21. کدام دارو را می توان به صورت ناگهانی حذف کرد؟

الف) دی سیکلومین ب) بتامتازون LA ج) پردنیزولون د) کلیندینیوم سی

22. کدام یک به عنوان خلط آور در درمان سرفه استفاده نمی شود؟

الف) دیفن هیدرامین کامپاند ب) اکسپکتورانت ج) گایافنزین د) دکسترومتورفان

23. کدام یک از آنتی هیسامین های زیر را نباید در آلرژی فصلی(طولانی مدت) مصرف کرد؟

الف) آنتی هیستامین دکونژستانت ب) نئوتادین ج) سیتریزین د) لوراتادین