۱. کدام مسکن زیر عوارض گوارشی ندارد؟

الف) ایندومتاسین ب) استامینوفن ج) سلکوکسیب د) ناپروکسن

2. مادر نوزاد سه ماهه به داروخانه برای فرزند قطره استامینوفن (پاراکتامول) خریداری کرده از شما درمورد نحوه مصرف مشورت می‌گیرد میزان دوز استاندارد را انتخاب کنید؟ (وزن بچه 5kg)

الف) ۱۰-۱۵ قطره هر ۴ ساعت ب) ۵-۷ قطره هر ۶ ساعت

ج) ۲۰-۲۵ قطره هر ۴ ساعت د) ۲-۳ قطره هر ۶ ساعت

3. روی بسته بندی قرص نوشته شده cap SR مفهوم این عبارت چیست؟

الف) کپسول [redacted] نباید خورد شود ب) کپسول پوشش‌دار هست

ج) می‌توان گرانول‌های کپسول را جدا مصرف کرد د) گزینه الف و ب صحیح است.

4. کدام شکل دارویی بیشترین جذب و بیشترین احتمال ایجاد عارضه را دارد؟

الف) IM ب) IV ج) SC د) ID

5. کدام مسکن زیر بالاترین قدرت اثر و بیشترین عوارض گوارشی را دارد؟

الف) ایندومتاسین ب) سلکوکسیب ج) استامینوفن د) همه موارد

6. کدام دارویی زیر برای درمان میگرن است؟

الف) ملیگرسترا ب) زیراتریپتان ج) ارگوتامین C د) همه موارد

7. کدام دارویی زیر جزء داروهای پیشگیری میگرن نمی‌باشد؟

الف) پروپرانولول ب) نورتریپتیلین ج) والپروات سدیم د) هیچ کدام

8. قرص آنتی هیستامینی که معروف به قرص ماشین گرفتگی است؟

الف) فنوتیازین ب) تلفنت ج) دیمن هیدرینات د) سیکلیزین

۹) کدام جفت آنتی هیستامین به عنوان ضد تهوع استفاده می شود؟

الف) دیفن هیدرامین ب) پرومتازین ج) سیکلیزین د) دیمن هیدرینات

۱۰) کدام آنتی هیستامین نسل دوم هست و عوارض خواب آلودگی کمتری دارد؟

الف) دیفن هیدرامین ب) کلرفنیرامین ج) تلفست د) هیدروکسی زین

. کدامیک از سرم های زیر برای تامین انرژی بدن مناسب تر و باعث افزایش فشار خون نمی‌شود است؟

سرم رینگر — سرم دکستروز — سرم نرمال سالین — سرم قندی نمکی

کدامیک از سرم های زیر باعث بیشترین افزایش فشار خون می‌شود؟

سرم نرمال سالین — سرم قندی نمکی — سرم رینگر — سرم دکستروز

کدامیک از مسکن های زیر برای افراد باردار مناسب تر است؟

ژلوفن — ایندومتاسین — استامینوفن — آسپرین

مصرف کدامیک از مسکن های زیر برای کودکان ممنوع است

استامینوفن — آکسار — بروفن — شیاف دیکلوفناک

کدامیک از مسکن های زیر می‌تواند باعث افزایش خونریزی شود؟

آکسار — بروفن — دیکلوفناک — ایندومتاسین — ملوکسیکام

[redacted]

کدامیک از کاربرد های قرص LD میباشد

تنظیم چرخه زنانه و درمان خونریزی شدید — ضدبارداری — کیست تخمدان — همه موارد

کدام یک از داروهای زیر برای عفونت و درد گلو بکار می رود

آموکسی سیلین — فکسوفنادین — سرترالین — سیتریزین

[redacted]

کدامیک از داروهای زیر برای دندان درد استفاده نمیشود

قطره میخک — لیکوفار — نوافن — دنتا فورت

کدامیک کاربرد داروی دیفن هیدرامین نیست

افت دهان — عفونت گلو — سرفه خشک — هیچکدام

کدامیک از شیاف های زیر برای کودکان و اطفال مناسب تر است

استامینوفن ۱۲۵ — دیکلوفناک ۱۰۰ — گلیسرین ۲ — هیچکدام

کدام یک از اشکال زیر قبل مصرف باید تکان داده شود

شربت — سوسپانسون

انسولین

کدامیک از داروهای زیر برای حالت تهوع مناسب نیست

دیفن هیدرامین　　دیمین هیدرینات　　پرو مازین　　لوراتادین

کدامیک از ملین (ضدیبوست) های زیر برای کودکان بکار نمیرود

سی لاکس　　سوربیتول

PEG　　لاکتولوز

کدامیک از ملین های زیر برای بارداری بکار میرود

شربت منیزی Mg　　لاکتولوز　　گزینه اول و دوم　　بیزاکودیل

کدامیک از داروهای ضدترش سریع اثر تر هستند

آنتی اسید ها　　فاموتیدین　　امپرازول　　تمام موارد بالا دیر اثر هستند

[redacted]

کدامیک از داروهای ضدترش همراه با غذا یا بلافاصله بعد از غذا استفاده میشود

امپرازول　　شربت منیزی　　فاموتیدین　　هیچکدام

فولیک اسید چیست و کاربرد آن چیست؟

B۹_کم خونی

B۱۲_کم خونی

B۹_حالت تهوع

B۱۲_حالت تهوع

در صورت فراموشی یه شب از داروهای ضد بارداری شب های بعدی چه اقدامی باید انجام دهند

دو شب بعدی هر شب دو قرص　　شب بعد دو قرص و ادامه مصرف به صورت شبی یه قرص

تمام شب های بعدی دو قرص　　دارو دیگر اثر گذاری ندارد

کدامیک از اشکال دارویی زیر را قبل از استفاده باید به خوبی تکان دهیم

شربت　　سوسپانسیون　　الگزیر　　آمپول

کدامیک از داروهای زیر برای تبخال کاربرد دارد

پماد اسیکلوویر　　پماد تتراسایکلین　　پماد بتامتازون　　پماد لوبراتکس

کدامیک از داروهای زیر برای درمان افت دهان مناسب نیست

دهان شویه کلرهگزیدین　　دیفن هیدرامین　　افتین ژل　　استامینوفن

برای ترس و اضطراب از صحنه و کنفرانس کدامیک از داروهای زیر مناسب تر است

الپرازولام　　لورازپام　　پرانول ۱۰　　کلیندیوم سی

کدامیک از داروهای زیر برای قرمزی چشم مناسب تر است

قطره نفازولین　　قطره بتامتازون　　قطره آزیترومایسین　　پماد چشمی لوبراتکس

کدامیک از داروهای زیر با کلسیم خوراکی تداخل ندارد؟

داکسی سایکلین　　لووتیروکسین　　سیپروفلوکساسین　　لوراتادین

کدامیک از گزینه های زیر برای برطرف کردن عفونت دندان مناسب تر است

آموکسی سیلین+مترونیدازول +ناپروکسن　　آموکسی سیلین+سفکسیم+کلداکس

لیکوفار +آموکسی سیلین+میرتکس　　آموکسی سیلین +مترونیدازول +دهان شویه کلرهگزیدین

کدامیک از داروهای زیر شل کننده عضلانی است و برای گرفتگی های عضلات استفاده می‌شود

ژلوفن　　دیکلوفناک　　آنتوم　　متوکاربامول

کدامیک از پمادهای زیر بدون نسخه برای عرق سوز شدن کودکان مناسب نیست

کالاندولا　　زینک اکساید　　کالندلیت　　بتامتازون

کدامیک از پماد های زیر برای برطرف کردن سوزش حاصل گزش حشرات مناسب است

رهامین　　بتامتازون　　کالاندولا　　پرمترین

کدامیک از داروهای زیر برای آکنه استفاده میشود

ایزوترتنوین　　کلیندامایسین　　داکسی سایکلین　　همه موارد

کدامیک از داروهای زیر برای دیابت بکار نمیرود

متفورمین　　گلی بنکلامید　　امپاگلیفلوزین　　متی مازول

برای گزش حشرات چه پمادی مناسب است؟

کالاندولا　　رهامین　　تروماهرب　　آنتی هموروئید

کدامیک از داروهای زیر ضدقارچ نیست؟

کوتریماکسازول　　کلوتریمازول　　میکونازول　　کتوکونازول

[redacted]

کدامیک از داروهای زیر با سرم رنگر تداخل دارد

سفتریاکسون　　سفازولین　　پنی سیلین　　بتامتازون

تاوانکس نام تجاری کدامیک از داروهای زیر است فکسوفنادین

سیپروفلوکساسین　　لووفلوکساسین　　جیم فلوکساسین

درستی و نادرستی جملات زیر را با عبارت ص یا غ مشخص کنید

روتارین برای گرفتگی عضلات کمر استفاده می‌شود　غ

لیکوفار برای سرفه و التهاب گلو کاربرد دارد　ص

* کدام از از دارمهای زیر در میگرن قابل استفاده است؟
پروپرانول آلکالوئید ارگوت(ارگوتامین سی) سوماتریپتان
سالبوتامول

* کدام یک از داروهای زیر جزو مخدرها است؟
پتدین مورفین فنتانیل
سوماتریپتان

* عوارض خارج هرمی از عوارض کدام دارو است؟
اندانسترون هوسین فاموتیدین
متوکلوپرامید

* کدام یک ضد تهوع است؟
اندانسترون امپرازول فاموتیدین
دایمتیکون

* در بیمار با بیماری قلبی که دچار درد است کدام مسکن توصیه میشود؟
ناپروکسن کتورولاک ایبوبروفن
مفنامیک اسید

* کدام یک در خانوم باردار که تب دارد ارجح است؟
استامینوفن دیکلوفناک ایبوبروفن
ناپروکسن

* کدام یک از داروهای ضد یبوست برای بیمار با مشکل انسداد روده منع مصرف دارد؟
بیزا کودیل PEG لاکتولوز
سوربیتول

* کدام یک از نماد های زیر نشانگر اشکال تنفسی است؟
supp nasal spray Neb
گزینه الف و ب

* کدام یک نیاز به نسخه ندارد؟
آمپول نوروبیون قرص سفیکسیم آمپول کتورولاک
کپسول کو آموکسی کلاو

* کدام یک از موارد مصرف کورتون‌ها نیست؟
جلوگیری از رد پیوند قلب درمان اگزما درمان آسم
درمان دیابت

* کدام یک از موارد زیر جزو عوارض کورتون‌ها نیست؟
افزایش قند خون افت فشار خون کاهش سیستم ایمنی
عوارض گوارشی

* بعد از مصرف کدام یک از آنتی بیوتیک‌های زیر باید آب زیاد مصرف شود و تا یک ساعت از دراز کشیدن خودداری کرد؟
داکسی سایکلین سفکسیم آموکسی سیلین
مترونیدازول

* کدام یک از داروهای زیر با لبنیات تداخل دارد و باید حداقل فاصله دو ساعت رعایت شود؟

داکسی سایکلین　　آموکسی سیلین　　پنی سیلین
مترونیدازول

* برای عرق سوز ناشی از پوشک کردن نوزاد کدام یک به صورت طولانی مصرف می‌شود؟

کالامین (کالاندولا)　　هیدروکورتیزون　　تریامسینولون
بتامتازون

* کدام دارو را می‌توان به صورت ناگهانی حذف کرد؟

دیسیکلومین　　بتامتازون LA　　پردنیزولون
کلیدینیوم سی

* کدام یک به عنوان خلط آور در درمان سرفه استفاده نمی‌شود؟

دیفن هیدرامین کامپاند　　اکسپکتورانت　　گایافنزین
دکسترومتورفان

* کدام یک از آنتی هیستامین‌های زیر را نباید در آلرژی فصلی (صورت طولانی مدت) مصرف کرد؟

آنتی هیستامین دکونژستانت　　نئوتادین　　سیتریزین
لوراتادین

* کدام یک از داروهای زیر برای آفت دهان مناسب است؟
دیفن هیدرامین سیتریزین لوراتادین
فکسوفنادین

* کدام یک علامت اختصاری پماد چشمی است ؟
nasal drop ophtalmic drop ophtalmic oint
supp

* کدام یک برای برفک دهان استفاده می‌شود؟
قطره نیستاتین بتامتازون فاموتیدین
اکسپکتورات

* دپومترول ((DEPO MEDROL نام تجاری کدام دارو است؟
متیل پردنیزولون فلوتیکازون بکلومتازون
امپرازول

* رس‌ت‌انکس نام تجاری کدام است؟
مومتازون فلوتیکازون بکلومتازون
بودزوناید

* برای حمله آسم کدام یک استفاده می‌شود(کدام یک سریع اثرتر است)؟
سالبوتامول سالمترول فـورمترول
کرومولین