

Álgebra Lineal

Victoria Torroja Rubio

9/10/2024 -

Índice general

0.1. Introducción	2
1. Espacios Vectoriales	7
1.1. Subespacios vectoriales	8
1.2. Bases de un espacio vectorial	11
1.3. Suma directa de subespacios.	16
1.4. Espacio vectorial cociente	21
2. Aplicaciones Lineales	24
2.1. Ejemplos de aplicaciones lineales	34
2.1.1. Formas Lineales	34
2.1.2. Homotecias vectoriales	35
2.1.3. Proyecciones	36
2.1.4. Simetrías vectoriales	38
2.2. Espacio vectorial dual	39
2.2.1. Anulador de un subespacio	43
2.2.2. Matriz de f^*	48
3. Matrices	49
3.1. Matriz asociada a una aplicación lineal	49
3.2. Producto de matrices	51
3.3. Permutaciones	53
3.4. Estructura de álgebra	57
3.5. Determinantes	60
3.6. Sistemas de Cramer	65
4. Reducción de Endomorfismos	75
4.1. Polinomios	77
4.2. Vectores y valores propios	82
4.3. Polinomio característico	84
4.4. Endomorfismos diagonalizables y triangulables	86
4.5. Teorema de Cayley-Hamilton	88

0.1. Introducción

El cuerpo de los números reales cumple los siguientes requisitos:

$(\mathbb{R}, +)$ es un grupo abeliano:

Definimos suma y producto como

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\rightarrow a + b \\ \cdot : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\rightarrow a \cdot b. \end{aligned}$$

1. La suma es asociativa

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a + b) + c = a + (b + c).$$

2. Existe un elemento neutro

$$\exists! 0 \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}, 0 + a = a + 0 = a.$$

3. Existe el opuesto

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists -a \in \mathbb{R}, a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

4. La suma es conmutativa

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a + b = b + a.$$

5. El producto es asociativo,

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c.$$

6. El producto es distributivo con respecto a la suma (distributivo por la izquierda y por la derecha),

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

7. Existe la unidad,

$$\exists! 1 \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}, 1 \cdot a = a \cdot 1 = a.$$

8. Existe la inversa,

$$\forall a \in \mathbb{R} - \{0\}^1, \exists a^{-1} \in \mathbb{R}, a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1.$$

Definición 0.1 (Anillo). Se denomina **anillo** a un conjunto y dos operaciones $(R, +, \cdot)$ que verifica las propiedades (1)-(6). Si se verifica también (7), se llama **anillo con unidad**.

¹Utilizamos la notación \mathbb{R}^* por sencillez para denotar $\mathbb{R} - \{0\}$

Definición 0.2 (Cuerpo). Se denomina **cuerpo** a un conjunto con al menos dos elementos ($1 \neq 0$) y dos operaciones $(R, +, \cdot)$ que cumple las propiedades (1)-(8). Si también se verifica que la multiplicación es commutativa, decimos que se trata de un **cuerpo abeliano**.

Definición 0.3. Un conjunto $V \neq \emptyset$ es un \mathbb{R} -espacio vectorial si existen dos operaciones

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V, (\vec{x}, \vec{y}) \rightarrow \vec{x} + \vec{y} \\ \cdot : \mathbb{R} \times V &\rightarrow V, (a, \vec{x}) \rightarrow a \cdot \vec{x} \end{aligned}$$

que verifican que

(i) $(V, +)$ es un grupo abeliano.

(ii) Se cumple la propiedad distributiva,

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall \vec{x}, \vec{y} \in V, a(\vec{x} + \vec{y}) = a\vec{x} + a\vec{y}.$$

(iii) Se cumple otra propiedad distributiva,

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \vec{x} \in V, (a + b)\vec{x} = a\vec{x} + b\vec{x}.$$

(iv) Se cumple la propiedad asociativa,

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \vec{x} \in V, a(b\vec{x}) = (a \cdot b)\vec{x}.$$

(v) $\exists 1 \in \mathbb{R}, \forall \vec{x} \in V, 1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$.

Definición 0.4. Se define \mathbb{R}^n , con $n \in \mathbb{N}$, como

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}\}.$$

Definición 0.5. Se define la suma $+$ en \mathbb{R}^n de la siguiente manera:

$$\forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

Utilizamos las propiedades de \mathbb{R} como cuerpo abeliano para justificar que $(\mathbb{R}^n, +)$ es un grupo abeliano.

Definición 0.6. Definimos el producto escalar en \mathbb{R}^n de la siguiente manera,

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n, a \cdot \vec{x} = (a \cdot x_1, a \cdot x_2, \dots, a \cdot x_n).$$

Una consecuencia clara de esto es que para todo $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ se cumple que

$$0 \cdot \vec{x} = \vec{0}.$$

Al igual que antes, podemos utilizar las propiedades de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ como cuerpo abeliano para justificar que \mathbb{R}^n es un \mathbb{R} -espacio vectorial.

Por las definiciones anteriores tenemos que para todo $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \vec{x} &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= (x_1, 0, \dots, 0) + (0, x_2, \dots, 0) + \dots + (0, \dots, x_n) \\ &= x_1 (1, 0, \dots, 0) + x_2 (0, 1, \dots, 0) + \dots + x_n (0, \dots, 1) .. \end{aligned}$$

Además, podemos concluir que si

$$x_1 (1, \dots, 0) + x_2 (0, 1, \dots, 0) + \dots + x_n (0, \dots, 1) = y_1 (1, \dots, 0) + y_2 (0, 1, \dots, 0) + \dots + y_n (0, \dots, 1),$$

entonces $\forall i, 1 \leq i \leq n, x_i = y_i$.

Definición 0.7 (Sistema de ecuaciones homogéneo). Sea H un sistema de ecuaciones homogéneo:

$$\begin{aligned} a_1^1 x_1 + a_2^1 x_2 + \dots + a_n^1 x_n &= 0 \\ \vdots \\ a_1^m x_1 + a_2^m x_2 + \dots + a_n^m x_n &= 0. \end{aligned}$$

donde $m, n \in \mathbb{N}$ y $a_i^j \in \mathbb{R}$. Definimos L como el conjunto de soluciones de H :

$$L = \{ (x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n) : x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n \text{ es solución de } H \} \subset \mathbb{R}^n.$$

^a

^a a_j^i no es exponente sino una forma de numeración.

Teorema 0.1. Si $\vec{x}_0, \vec{y}_0 \in L$, se cumple que

$$\vec{x}_0 + \vec{y}_0 \in L.$$

Demostración. Tenemos que $\forall i, 1 \leq i \leq m$,

$$\begin{aligned}
 & a_1^i (x_0^1 + y_0^1) + \cdots + a_n^i (x_0^n + y_0^n) \\
 &= a_1^i x_0^1 + a_1^i y_0^1 + \cdots + a_n^i x_0^n + a_n^i y_0^n \\
 &= \underbrace{(a_1^i x_0^1 + a_2^i x_0^2 + \cdots + a_n^i x_0^n)}_0 + \underbrace{(a_1^i y_0^1 + a_2^i y_0^2 + \cdots + a_n^i y_0^n)}_0 \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

□

Teorema 0.2. Si $\vec{x}_0 \in L$ y $a \in \mathbb{R}$, se cumple que

$$a\vec{x}_0 = (ax_0^1, ax_0^2, \dots, ax_0^n) \in L.$$

Demostración. Tenemos que para $\forall i, 1 \leq i \leq m$,

$$\begin{aligned}
 & a_1^i (ax_0^1) + a_2^i (ax_0^2) + \cdots + a_n^i (ax_0^n) \\
 &= a \underbrace{(a_1^i x_0^1 + a_2^i x_0^2 + \cdots + a_n^i x_0^n)}_0 \\
 &= a \cdot 0 \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

□

Teorema 0.3. Por lo visto anteriormente, $L \subset \mathbb{R}^n$ es un **subespacio vectorial** sobre \mathbb{R} .

Demostración. Muchas de las propiedades de un espacio vectorial automáticamente se heredan a un subespacio vectorial. Las únicas excepciones son la definición de la suma, del producto y la existencia del elemento neutro 0. En este caso, hemos comprobado que la suma está definida en L y que existe la multiplicación $\cdot : \mathbb{R} \times L \rightarrow L$ definida en L . Además, $\vec{0} \in L$ es una solución trivial. □

Consideramos un sistema de ecuaciones no homogéneo S :

$$\begin{aligned}
 & a_1^1 x_1 + a_2^1 x_2 + \cdots + a_n^1 x_n = b^1 \\
 & \vdots \\
 & a_1^m x_1 + a_2^m x_2 + \cdots + a_n^m x_n = b^m.
 \end{aligned}$$

Consideramos que $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ es el conjunto de las soluciones.

$$\mathcal{L} = \{ (x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n) : x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n \text{ es solución de } S \}.$$

Entonces, ya no se cumple necesariamente que la suma de dos soluciones también es solución.
Si $\vec{x}_0, \vec{y}_0 \in \mathcal{L}$, $\forall j$, $1 \leq j \leq m$,

$$\begin{aligned} & a_1^j (x_0^1 + y_0^1) + a_2^j (x_0^2 + y_0^2) + \cdots + a_n^j (x_0^n + y_0^n) \\ &= \left(a_1^j x_0^1 + a_2^j x_0^2 + \cdots + a_n^j x_0^n \right) + \left(a_1^j y_0^1 + a_2^j y_0^2 + \cdots + a_n^j y_0^n \right) \\ &= b^j + b^j = 2b^j \neq b^j. \end{aligned}$$

Si $\vec{X}_0 \in L$ y $\vec{x}_0 \in \mathcal{L}$, tenemos que

$$\vec{X}_0 + \vec{x}_0 = b^j \in \mathcal{L}.$$

Capítulo 1

Espacios Vectoriales

Consideramos un cuerpo conmutativo con característica distinta de 2, es decir, $1 + 1 \neq 0$. A este cuerpo lo llamaremos \mathbb{K} .

Definición 1.1 (\mathbb{K} -Espacio vectorial). Un conjunto $V \neq \emptyset$ es un \mathbb{K} -espacio vectorial si se tienen definidas dos aplicaciones

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ (\vec{x}, \vec{y}) &\rightarrow \vec{x} + \vec{y} \\ \cdot : \mathbb{K} \times V &\rightarrow V \\ (a, \vec{x}) &\rightarrow a \cdot \vec{x}, \end{aligned}$$

tales que verifican que

(1) $(V, +)$ es un cuerpo abeliano.

[Commutatividad.] $\forall \vec{x}, \vec{y} \in V, \vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$.

[Asociatividad.] $\forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V, (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$.

[Existencia del elemento neutro.] $\exists \vec{0} \in V, \forall \vec{x} \in V, \vec{0} + \vec{x} = \vec{x}$.

[Existencia del opuesto.] $\forall \vec{x} \in V, \exists -\vec{x} \in V, \vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$.^a

(2) $\forall \vec{x}, \vec{y} \in V, \forall a \in \mathbb{K}, a \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = a \cdot \vec{x} + a \cdot \vec{y}$.

(3) $\forall \vec{x} \in V, \forall a, b \in \mathbb{K}, (a + b) \cdot \vec{x} = a \cdot \vec{x} + b \cdot \vec{x}$.

(4) $\forall \vec{x} \in V, \forall a, b \in \mathbb{K}, (a \cdot b) \cdot \vec{x} = a \cdot (b \cdot \vec{x})$.

(5) $\forall \vec{x} \in V, 1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$.

^aEn la propiedad del elemento neutro y del opuesto, como la conmutatividad es un requisito no hay que especificar que el elemento neutro funciona por ambos lados, al igual que el opuesto.

Si considero a \mathbb{R} como un cuerpo, tenemos que \mathbb{C} es un \mathbb{R} -espacio vectorial (dimensión 2) y un \mathbb{C} -espacio vectorial (dimensión 1).

Teorema 1.1. Sea V un \mathbb{K} -espacio vectorial, entonces se verifica que:

(a) $\forall \vec{x} \in V, 0 \cdot \vec{x} = \vec{0}$.

(b) $\forall \vec{x} \in V, \forall a \in \mathbb{K}, (-a) \cdot \vec{x} = -a \cdot \vec{x}$.

(c) $\forall a \in \mathbb{K}, a \cdot \vec{0} = \vec{0}$.

(d) $a \cdot \vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \vec{x} = \vec{0} \vee a = 0$.

Demostración. (a)

$$\begin{aligned} \vec{x} &= (1 + 0) \cdot \vec{x} = 1 \cdot \vec{x} + 0 \cdot \vec{x} = \vec{x} + 0 \cdot \vec{x} \\ \iff -\vec{x} + \vec{x} &= -\vec{x} + \vec{x} + 0 \cdot \vec{x} \\ \iff 0 &= 0 \cdot \vec{x}. \end{aligned}$$

Se puede hacer de otra manera:

$$0 \cdot \vec{x} = (0 + 0) \cdot \vec{x} = 0 \cdot \vec{x} + 0 \cdot \vec{x} \iff 0 = 0 \cdot \vec{x}.$$

(b)

$$\begin{aligned} 0 \cdot \vec{x} &= (a + (-a)) \cdot \vec{x} = a \cdot \vec{x} + (-a) \cdot \vec{x} \\ \iff -a \cdot \vec{x} &= -a \cdot \vec{x} + a \cdot \vec{x} + (-a) \cdot \vec{x} \\ \iff -a \cdot \vec{x} &= (-a) \cdot \vec{x}. \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} a \cdot \vec{x} &= a \cdot (\vec{x} + \vec{0}) = a \cdot \vec{x} + a \cdot \vec{0} \iff -a \cdot \vec{x} + a \cdot \vec{x} = -a \cdot \vec{x} + a \cdot \vec{x} + a \cdot \vec{0}. \\ \therefore \vec{0} &= a \cdot \vec{0}. \end{aligned}$$

También se puede hacer de la siguiente manera:

$$a \cdot \vec{0} = a \cdot (\vec{0} + \vec{0}) = a \cdot \vec{0} + a \cdot \vec{0} \iff 0 = a \cdot \vec{0}.$$

(d) Si $a = 0$, hemos ganado. Si $a \neq 0$, $\exists \frac{1}{a} \in \mathbb{K}$. Por tanto,

$$\vec{0} = \frac{1}{a} \cdot \vec{0} = \frac{1}{a} \cdot (a \cdot \vec{x}) = \left(\frac{1}{a} \cdot a \right) \cdot \vec{x} = \vec{x}.$$

□

1.1. Subespacios vectoriales

Definición 1.2 (Subespacio vectorial). Un conjunto $L \neq \emptyset$ y $L \subset V$ es **parte estable** si

- (i) $\forall \vec{x}, \vec{y} \in L, \vec{x} + \vec{y} \in L$.
- (ii) $\forall a \in \mathbb{K}, \forall \vec{x} \in V, a \cdot \vec{x} \in L$.

Teorema 1.2. Sea $L \neq \emptyset$ y $L \subset V$, entonces L es parte estable si y sólo si L es subespacio vectorial.

Demostración. (i) Si L es un subespacio vectorial es trivial.

- (ii) Si L es parte estable, tenemos que para $\vec{x} \in L$ se verifica la propiedad conmutativa, asociativa, etc, dado que $L \subset V$. Además, dado que $\cdot : \mathbb{K} \cdot L \rightarrow L$ y $(-1) \cdot \vec{x} = -\vec{x}$, tenemos que si $\vec{x} \in L$ entonces $-\vec{x} \in L$. Además, $\vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0} \in L$. El resto de propiedades se derivan de que $L \subset V$.

□

Definición 1.3 (Combinación lineal). $\vec{x} \in V$ es la **combinación lineal** de $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p$ con coeficientes a^1, a^2, \dots, a^p si existen $\vec{x}_i \in V$ y $a^i \in \mathbb{K}$, con $p \in \mathbb{N}$ ($1 \leq i \leq p$) tales que:

$$\vec{x} = a^1 \cdot \vec{x}_1 + a^2 \cdot \vec{x}_2 + \dots + a^p \cdot \vec{x}_p.$$

^a

^aLos a^i no denotan exponente sino que se trata de una forma de numeración.

Nota. Podemos apreciar que, dadas las condiciones del subespacio vectorial, cualquier combinación lineal de vectores $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p \in L$ es un vector de L .

Teorema 1.3. Sea $H \subset V$ con $H \neq \emptyset$. Definimos $L(H)$ como el conjunto de todas las combinaciones lineales finitas de H , es decir:

$$L(H) = \{a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p : p \in \mathbb{N}, \vec{x}_i \in H, a^i \in \mathbb{K}\}.$$

Se verifica que

- (1) $H \subset L(H)$.
- (2) $L(H)$ es un espacio vectorial sobre \mathbb{K} .
- (3) $L(H)$ es el menor subespacio vectorial que contiene a H . Es decir, si L es un subespacio vectorial y $H \subset L$, entonces $L(H) \subset L$.

Demostración. (1) Tenemos que si $\vec{x} \in H$ entonces

$$\vec{x} = \underbrace{1 \cdot \vec{x}}_{\text{combinación lineal}} \in L(H).$$

- (2) Sean $\vec{x}, \vec{y} \in L(H)$, queremos ver que $\vec{x} + \vec{y} \in L(H)$. Dado que $\vec{x}, \vec{y} \in L(H)$, se pueden expresar como combinación lineal de otros vectores en H .

$$\exists p \in \mathbb{N}, \exists \vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p \in H, \exists a^1, a^2, \dots, a^p \in \mathbb{K},$$

tales que

$$\vec{x} = a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p.$$

De manera similar, como $\vec{y} \in L(H)$,

$$\exists q \in \mathbb{N}, \exists \vec{y}_1, \vec{y}_2, \dots, \vec{y}_q \in H, \exists b^1, b^2, \dots, b^q \in \mathbb{K},$$

tales que

$$\vec{y} = b^1 \vec{y}_1 + b^2 \vec{y}_2 + \dots + b^q \vec{y}_q.$$

Entonces,

$$\vec{x} + \vec{y} = (a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p) + (b^1 \vec{y}_1 + b^2 \vec{y}_2 + \dots + b^q \vec{y}_q).$$

Como $\forall \vec{x}_i, \vec{y}_i \in H$, tenemos que $\vec{x} + \vec{y} \in L(H)$.

A continuación, demostramos que si $\vec{x} \in L(H)$ entonces $a \cdot \vec{x} \in L(H)$. Como $\vec{x} \in L(H)$,

$$\exists p \in \mathbb{N}, \exists \vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p \in H, \exists a^1, a^2, \dots, a^p \in \mathbb{K},$$

tales que

$$\vec{x} = a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} a \cdot \vec{x} &= a \cdot (a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p) \\ &= a \cdot (a^1 \vec{x}_1) + a \cdot (a^2 \vec{x}_2) + \dots + a \cdot (a^p \vec{x}_p) \\ &= (a \cdot a^1) \cdot \vec{x}_1 + (a \cdot a^2) \cdot \vec{x}_2 + \dots + (a \cdot a^p) \cdot \vec{x}_p. \end{aligned}$$

Aprovechamos las propiedades de V como espacio vectorial y el hecho de que $H \subset V$ (hemos utilizado la propiedad distributiva). Como $\forall a \cdot a^i \in \mathbb{K}$ y $\vec{x}_i \in H$, $a \cdot \vec{x}$ se trata de una combinación lineal y, por tanto, $a \cdot \vec{x} \in L(H)$.

- (3) Si $\vec{x} \in L(H)$, tenemos que $\exists p \in \mathbb{N}, \exists \vec{x}_i \in H, \exists a^i \in \mathbb{K}$ con $1 \leq i \leq p$, tales que

$$\vec{x} = a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p.$$

Como $H \subset L$, $\vec{x}_i \in L$ y, como L es un subespacio vectorial, tenemos que $a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p \in L$, por lo que $\vec{x} \in L$. □

Definición 1.4. $L(H)$ es el subespacio generado por H o H es un sistema de generadores de $L(H)$. Si $L(H) = V$ diremos que H es sistema de generadores.

1.2. Bases de un espacio vectorial

Definición 1.5. V es **finito generado** si existe un sistema de generadores formado por un número finito de vectores. Es decir, si $\exists \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\} = H$ tal que $V = L(H)$, es decir, $\exists \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\} \subset V$ tales que $\forall \vec{x} \in V, \exists a^1, a^2, \dots, a^p \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x} = a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p.$$

Definición 1.6. Una familia de vectores $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ es **linealmente dependiente** si uno de ellos es combinación lineal de los otros.

$$\exists i = 1, 2, \dots, p, \vec{x}_i \in L(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}).$$

Es decir,

$$\begin{aligned} \exists i = 1, 2, \dots, p, \exists a^1, a^2, \dots, a^{i-1}, a^{i+1}, \dots, a^p \in \mathbb{K} \\ \vec{x}_i = a^1 \vec{x}_1 + \dots + a^{i-1} \vec{x}_{i-1} + a^{i+1} \vec{x}_{i+1} + \dots + a^p \vec{x}_p. \end{aligned}$$

Es decir, si $\vec{x}_j = \vec{0}$, $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ es dependiente, pues

$$\vec{0} = 0 \cdot \vec{x}_1 + \dots + 0 \cdot \vec{x}_{j-1} + 0 \cdot \vec{x}_{j+1} + \dots + 0 \cdot \vec{x}_p.$$

Teorema 1.4. Sea $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\} \subset V$. Son linealmente dependientes si y solo si $\exists a^1, a^2, \dots, a^p \in \mathbb{K}$ no todos nulos tales que

$$\vec{0} = a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p.$$

Demostración. (i) Supongamos que la familia es linealmente dependiente. Por tanto, $\exists i = 1, \dots, p$ tal que $\vec{x}_i \in L(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{i-1}, \vec{x}_{i+1}, \dots, \vec{x}_p\})$. Por tanto, existen $a^i \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x}_i = a^1 \vec{x}_1 + \dots + a^{i-1} \vec{x}_{i-1} + a^{i+1} \vec{x}_{i+1} + \dots + a^p \vec{x}_p.$$

Si sumamos el opuesto a ambos lados tenemos que

$$\vec{0} = \vec{x}_i - \vec{x}_i = a^1 \vec{x}_1 + \dots + a^{i-1} \vec{x}_{i-1} + (-1) \vec{x}_i + a^{i+1} \vec{x}_{i+1} + \dots + a^p \vec{x}_p.$$

(ii) Suponemos que $\exists a^1, a^2, \dots, a^p \in \mathbb{K}$ no todos nulos tales que

$$a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p = \vec{0}.$$

Como no todos los escalares son nulos, podemos encontrar $a^i \neq 0$, y a^i tiene inversa.

$$\therefore (-1) a^i \vec{x}_i = a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^{i-1} \vec{x}_{i-1} + a^{i+1} \vec{x}_{i+1} + \dots + a^p \vec{x}_p.$$

Aprovechando las propiedades:

$$\vec{x}_i = \frac{-a^1}{a^i} \vec{x}_1 + \cdots + \frac{-a^{i-1}}{a^i} \vec{x}_{i-1} + \frac{-a^{i+1}}{a^i} \vec{x}_{i+1} + \cdots + \frac{-a^p}{a^i} \vec{x}_p.$$

□

Corolario 1.1. La familia de vectores $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\} \subset V$ es **linealmente independiente** si y solamente si

$$a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \cdots + a^p \vec{x}_p = \vec{0} \Rightarrow a^1 = a^2 = \cdots = a^p = 0.$$

Teorema 1.5. Una familia de vectores $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ es linealmente independiente si y solamente si $\forall \vec{x} \in L(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}), \exists! a^1, a^2, \dots, a^p \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x} = a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \cdots + a^p \vec{x}_p.$$

Demostración. (i) Si $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ es linealmente independiente y sea $\vec{x} \in L(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\})$. Supongamos que existen otros escalares $b^1, b^2, \dots, b^p \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x} = b^1 \vec{x}_1 + \cdots + b^p \vec{x}_p.$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} \vec{0} &= \vec{x} - \vec{x} = (a^1 \vec{x}_1 + \cdots + a^p \vec{x}_p) - (b^1 \vec{x}_1 + \cdots + b^p \vec{x}_p) \\ &= (a^1 - b^1) \vec{x}_1 + \cdots + (a^p - b^p) \vec{x}_p. \end{aligned}$$

Como se trata de una familia linealmente independiente, tenemos que $\forall i, 1 \leq i \leq p$,

$$a^i - b^i = 0 \iff a^i = b^i.$$

(ii) Recíprocamente, tenemos que si $a^1, a^2, \dots, a^p \in \mathbb{K}$ tales que

$$a^1 \vec{x}_1 + \cdots + a^p \vec{x}_p = \vec{0}.$$

Esto puede pasar si $a^1 = a^2 = \cdots = a^p = 0$. Como a^i son únicos, tenemos que si hay alguno no nulo, la combinación lineal no va a ser nula. Por tanto, será linealmente independiente. □

Definición 1.7 (Base). Una **base** de un espacio vectorial V es un sistema de generadores linealmente independientes.

Corolario 1.2. Una familia de vectores $B \subset V$ es una base de E si y solo si $\forall \vec{x} \in V$ se expresa de manera única como combinación lineal de elementos de B .

Teorema 1.6. Si $V \neq \{0\}$, es finitamente generado, entonces $\exists \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$ es base de V . Es decir, todo espacio vectorial $V \neq \{0\}$ generado por un número finito de vectores tiene una base finita.

Demostración. Sea $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ un sistema de generadores de V . Si $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ son linealmente independientes, forman una base (hemos ganado). Sino, uno se puede expresar como combinación lineal de los otros, por lo que $\exists i = 1, 2, \dots, p$ tal que $\vec{x}_i \in L(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{i-1}, \vec{x}_{i+1}, \dots, \vec{x}_p\})$, por lo que $\exists b^1, b^2, \dots, b^p \in \mathbb{K}$

$$\vec{x}_i = b^1 \vec{x}_1 + b^2 \vec{x}_2 + \dots + b^{i-1} \vec{x}_{i-1} + b^{i+1} \vec{x}_{i+1} + \dots + b^p \vec{x}_p.$$

Dado que $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ es un sistema de generadores de V , $\forall \vec{x} \in V, \exists a^1, a^2, \dots, a^p \in \mathbb{K}$ tales que

$$\begin{aligned} \vec{x} &= a^1 \vec{x}_1 + a^2 \vec{x}_2 + \dots + a^p \vec{x}_p \\ &= a^1 \vec{x}_1 + \dots + a^{i-1} \vec{x}_{i-1} + a^i (b^1 \vec{x}_1 + b^2 \vec{x}_2 + \dots + b^{i-1} \vec{x}_{i-1} + b^{i+1} \vec{x}_{i+1} + \dots + b^p \vec{x}_p) + a^{i+1} \vec{x}_{i+1} + \dots + a^p \vec{x}_p \\ &= (a^1 + a^i b^1) \vec{x}_1 + \dots + (a^{i-1} + a^i b^{i-1}) \vec{x}_{i-1} + (a^i b^{i+1} + a^{i+1}) \vec{x}_{i+1} + \dots + (a^i b^p + a^p) \vec{x}_p. \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\} - \{\vec{x}_i\}$ también es un sistema de generadores de V . Si $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{i-1}, \vec{x}_{i+1}, \vec{x}_p\}$ es linealmente independiente, es un sistema de generadores de V . Si es linealmente dependiente repetimos el proceso hasta tener $\{\vec{x}_i\}$, que no puede ser $\vec{0}$, porque $V \neq \{0\}$, y $\{\vec{x}_i\}$ es linealmente independiente. \square

Observación. De esto podemos concluir que todo sistema de generadores contiene una base.

Teorema 1.7 (Teorema de Steinitz). Sea $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \dots, \vec{y}_p\} \subset V$ una base de V y sea $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_q\} \subset V$ linealmente independiente, entonces $q \leq p$ y se puede obtener una nueva base sustituyendo q de los vectores \vec{y}_i por $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_q\}$.

Demostración. Se trata de introducir uno por uno los vectores $\{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_p\}$ por los vectores de la base dada. Sea $\vec{x}_1 \in V$, entonces $\exists a^1, a^2, \dots, a^p \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x}_1 = a^1 \vec{y}_1 + a^2 \vec{y}_2 + \dots + a^p \vec{y}_p = \sum_{i=1}^p a^i \vec{y}_i.$$

Existe al menos un $a^i \neq 0$ (porque \vec{x}_1 no es nulo). Sea $a^1 \neq 0$.

$$\vec{y}_1 = (a^1)^{-1} \vec{x}_1 - \sum_{i=2}^p (a^1)^{-1} a^i \vec{y}_i$$

Entonces, $\forall x \in V, \exists b^1, b^2, \dots, b^p \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned}\vec{x} &= b^1 \vec{y}_1 + b^2 \vec{y}_2 + \dots + b^p \vec{y}_p \\ &= b^1 \left(\frac{1}{a^1} \vec{x}_1 + \left(-\frac{a^2}{a^1} \right) \vec{y}_2 + \dots + \left(-\frac{a^p}{a^1} \right) \vec{y}_p \right) + b^2 \vec{y}_2 + \dots + b^p \vec{y}_p \\ &= \frac{b^1}{a^1} \vec{x}_1 + \left(b^1 \left(-\frac{a^2}{a^1} \right) + b^2 \right) \vec{y}_2 + \dots + \left(b^1 \left(-\frac{a^p}{a^1} \right) + b^p \right) \vec{y}_p.\end{aligned}$$

Hemos llegado a la conclusión de que $\{\vec{x}_1, \vec{y}_2, \dots, \vec{y}_p\}$ forman un sistema de generadores de V . Además, son linealmente independientes, pues

$$\begin{aligned}\vec{0} &= b^1 \vec{x}_1 + b^2 \vec{y}_2 + \dots + b^p \vec{y}_p \Rightarrow b^1 \left(\sum_{i=1}^p a^i \vec{y}_i \right) + b^2 \vec{y}_2 + \dots + b^p \vec{y}_p = \vec{0} \\ &= b^1 a^1 \vec{y}_1 + \sum_{i=2}^p (b^1 a^i + b^i) \vec{y}_i = \vec{0} \\ &\Rightarrow b^1 a^1 = 0, \quad b^1 a^i + b^i = 0, \quad i \geq 2.\end{aligned}$$

pues $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \dots, \vec{y}_p\}$ son una base. Como $a^1 \neq 0$, tenemos que $b^1 = b^i = 0$. Por tanto, $\{\vec{x}_1, \vec{y}_2, \dots, \vec{y}_p\}$ es una base de V .

Supongamos que $i < \min(p, q)$ y que $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_{i-1}, \vec{x}_i, \vec{y}_{i+1}, \dots, \vec{y}_p\}$ es sistema de generadores. Entonces, $\exists c^1, c^2, \dots, c^i, d^{i+1}, \dots, d^p \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x}_{i+1} = c^1 \vec{x}_1 + c^2 \vec{x}_2 + \dots + c^i \vec{x}_i + d^{i+1} \vec{y}_{i+1} + \dots + d^p \vec{y}_p = \sum_{j=1}^i c^j \vec{x}_j + \sum_{j=i+1}^p d^j \vec{y}_j.$$

El procedimiento anterior nos asegura que podemos sustituir \vec{x}_{i+1} por cualquier vector con coeficiente no nulo. Por tanto, tenemos que demostrar que existe un coeficiente del segundo sumatorio no nulo. Si fueran todos nulos, tendríamos que \vec{x}_{i+1} se puede expresar como combinación lineal de los vectores $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$, esto contradice que sean linealmente independientes. \square

Corolario 1.3. Si el espacio vectorial V tiene una base finita, todas las bases de V tienen el mismo número de vectores.

Demostración. Sean $B_1 = \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ y $B_2 = \{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \dots, \vec{y}_q\}$ dos bases de V . Como B_1 es una base y B_2 es un conjunto de vectores linealmente independientes, tenemos que todas las bases de V han de ser finitas. Entonces, como B_1 y B_2 son bases y, consecuentemente, linealmente independientes, tenemos que $p \leq q$ y $q \leq p$, por lo que $p = q$. \square

Definición 1.8 (Dimensión). La **dimensión** de un espacio vectorial V sobre un cuerpo \mathbb{K} es el número de elementos de sus bases, si son finitas. Si no lo son, diremos que V es de dimensión infinita.

Corolario 1.4. La dimensión de un espacio vectorial coincide con el número máximo de elementos linealmente independientes, y también con el número mínimo de generadores.

Corolario 1.5. Todo conjunto de vectores linealmente independientes puede completarse hasta obtener una base.

Lema 1.1. Si $S \subset V$ es linealmente independiente y $\vec{x} \in V$ y $\vec{x} \notin L(S)$, tenemos que la familia $S \cup \{\vec{x}\}$ es linealmente independiente.

Demostración. Sean $a, a^i \in \mathbb{K}$ y

$$a\vec{x} + a^1\vec{x}_1 + \cdots + a^p\vec{x}_p = \vec{0}.$$

Si $a \neq 0$, entonces \vec{x} se puede expresar como combinación lineal de S , pero por hipótesis esto no es posible. Por tanto, debe ser que $a = 0$ y, consecuentemente, $\forall a^i = 0$, pues S es linealmente independiente. Por tanto, $S \cup \{\vec{x}\}$ también es linealmente independiente. \square

Proposición 1.1. Si V es finitamente generado y L es subespacio vectorial de V , entonces L es finitamente generado y

$$\dim L \leq \dim V.$$

Además,

$$\dim L = \dim V \iff L = V.$$

Demostración. Si $L = \{0\}$ no hay nada que probar (no tiene bases). En caso contrario, existe $\vec{x}_1 \in L$. Si $L = L(\{\vec{x}_1\})$, tenemos que \vec{x}_1 es una base. En caso contrario, existe $\vec{x}_2 \in L$ con $\vec{x}_2 \notin L(\{\vec{x}_1\})$. Si $L = L(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\})$, $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ forman una base. Sabemos que son linealmente independientes por el lema anterior. En algún momento llegaremos a que $L(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n\})$ forman una base, pues un corolario anterior nos dice que hay un número máximo de vectores linealmente independientes.

Además, si $\dim L = n$ y $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n\}$ es una base de L , por el teorema de Steinitz, también es una base de V . Por tanto,

$$L = L(\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n\}) = V.$$

\square

Teorema 1.8 (Teorema de aplicación de base). Sea L un subespacio vectorial de V y sea $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ una base de L . Entonces existe $\{\vec{u}_{p+1}, \vec{u}_{p+2}, \dots, \vec{u}_n\} \subset V$ tales que $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p, \vec{u}_{p+1}, \vec{u}_{p+2}, \dots, \vec{u}_n\}$ son base de V .

Demostración. Si $\dim V = n$ tenemos que existe un número finito de generadores que forman una base de V , y consideramos que los vectores $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ forman una base de L . Entonces, $p \leq n$ y, por el teorema de Steinitz, se puede obtener una nueva base sustituyendo $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p\}$ por p vectores de $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$. \square

1.3. Suma directa de subespacios.

Notación.

$$\mathcal{P}(V) = \{A : A \subset V\}.$$

$$\mathcal{L}(V) = \{L \in \mathcal{P}(V) : L \text{ es subespacio vectorial de } V\}.$$

Por tanto,

$$\mathcal{L}(V) \subset \mathcal{P}(V).$$

Teorema 1.9. $\forall I$ conjunto, $\forall i \in I$, si $L_i \in \mathcal{L}(V)$ entonces

$$\bigcap_{i \in I} L_i \in \mathcal{L}(V).$$

Es decir, la intersección de espacios vectoriales es un espacio vectorial.

Demostración. $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \bigcap_{i \in I} L_i$ implica que $\vec{x}, \vec{y} \in L_i, \forall i \in I$. Como L_i son subespacios vectoriales:

$$\vec{x} + \vec{y} \in L_i, \forall i \in I \Rightarrow \vec{x} + \vec{y} \in \bigcap_{i \in I} L_i.$$

Similarmente, si $\vec{x} \in \bigcap_{i \in I} L_i$ y $a \in \mathbb{K}$, tenemos que $\vec{x} \in L_i, \forall i \in I$. Como L_i son subespacios vectoriales, son parte estable, por lo que

$$a \cdot \vec{x} \in L_i, \forall i \in I \Rightarrow a \cdot \vec{x} \in \bigcap_{i \in I} L_i.$$

□

Observación. Sin embargo, no tiene que cumplirse necesariamente que $L_1 \cup L_2 \in \mathcal{L}(V)$ si $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$.

Ejemplo 1.1. Sean $\{\vec{u}, \vec{v}\} \subset V$ linealmente independientes y $L_1 = L(\{\vec{u}\})$ y $L_2 = L(\{\vec{v}\})$ las rectas que generan. Asumamos que $\vec{u} + \vec{v} \in L_1 \cup L_2$. Sin pérdida de generalidad, $\vec{u} + \vec{v} \in L_1$. Por tanto, $\exists a \in \mathbb{K}$ tal que $\vec{u} + \vec{v} = a\vec{u}$. De esta manera,

$$(a - 1)\vec{u} + \vec{v} = \vec{0}.$$

Esto es absurdo, pues hemos dicho que estos vectores son linealmente independientes.

Definición 1.9. Si $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$, definimos $L_1 + L_2$ al menor subespacio vectorial generado por la unión.

$$L_1 + L_2 = L(L_1 \cup L_2).$$

Teorema 1.10. Sean $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$ y sea $L' = \{\vec{x}_1 + \vec{x}_2 : \vec{x}_1 \in L_1, \vec{x}_2 \in L_2\}$. Tenemos que $L' = L_1 + L_2$.

Demostración. Si $\vec{x}_1 \in L_1$, tenemos que $\vec{x}_1 = \vec{x}_1 + \vec{0} \in L'$, pues $\vec{x}_1 \in L_1$ y $\vec{0} \in L_2$. Por tanto, $L_1 \subset L'$. Similarmente, $L_2 \subset L'$. Consecuentemente, $L_1 \cup L_2 \subset L'$.

Además, tenemos que $L' \in \mathcal{L}(V)$, pues $\forall \vec{x}, \vec{y} \in L'$ tenemos que $\exists \vec{x}_1, \vec{y}_1 \in L_1$ y $\exists \vec{x}_2, \vec{y}_2 \in L_2$.

$$\vec{x} + \vec{y} = (\vec{x}_1 + \vec{x}_2) + (\vec{y}_1 + \vec{y}_2) = \underbrace{(\vec{x}_1 + \vec{y}_1)}_{\in L_1} + \underbrace{(\vec{x}_2 + \vec{y}_2)}_{\in L_2}.$$

Por tanto, $\vec{x} + \vec{y} \in L'$. Similarmente, si $a \in \mathbb{K}$ y $\vec{x} \in L'$ tenemos que existen $\vec{x}_1 \in L_1$ y $\vec{x}_2 \in L_2$ tales que

$$a \cdot \vec{x} = a \cdot (\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = \underbrace{a\vec{x}_1}_{\in L_1} + \underbrace{a\vec{x}_2}_{\in L_2}.$$

Por tanto, $a \cdot \vec{x} \in L'$. Por tanto, $L' \in \mathcal{L}(V)$.

A continuación demostramos que si $L \in \mathcal{L}(V)$ y $L_1 \cup L_2 \subset L$, entonces $L' \subset L$. Tenemos que $\forall \vec{x} \in L'$ existen $\vec{x}_1 \in L_1$ y $\vec{x}_2 \in L_2$ tales que $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$. Por tanto, $\vec{x} \in L$.

$$\therefore L' \subset L.$$

Por todo ello, $L' = L_1 + L_2$. □

Teorema 1.11 (Fórmula de Grassmann). Supongamos que V es de dimensión finita, por lo que todos los conjuntos que vamos a tratar a continuación son de dimensión finita.

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2).$$

Demostración. Sea $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$ una base de $L_1 \cap L_2$, y sea $v = \dim(L_1 \cap L_2)$. Podemos ampliar esta base hasta obtener una base de L_1 y L_2 . Sea $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m, \vec{u}_{m+1}, \dots, \vec{u}_r\}$ una base de L_1 . Sea $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m, \vec{v}_{m+1}, \dots, \vec{v}_s\}$ base de L_2 . Queremos ver que $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m, \dots, \vec{u}_{m+1}, \dots, \vec{u}_r, \vec{v}_{m+1}, \dots, \vec{v}_s\}$ es base de $L_1 + L_2$. Primero queremos ver que es sistema de generadores. Sea $\vec{x} \in L_1 + L_2$. Entonces, existen $\vec{x}_1 \in L_1$ y $\vec{x}_2 \in L_2$ tales que $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$. Como anteriormente hemos definido bases para L_1 y L_2 , tenemos que existen $a^i \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x}_1 = a^1 \vec{u}_1 + a^2 \vec{u}_2 + \dots + a^r \vec{u}_r.$$

Similarmente, existen $b^i \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x}_2 = b^1 \vec{u}_1 + \dots + b^m \vec{u}_m + b^{r+1} \vec{v}_{r+1} + \dots + b^s \vec{v}_s.$$

Por tanto, tenemos que \vec{x} se puede expresar como combinación lineal de $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m, \vec{u}_{m+1}, \dots, \vec{u}_r, \vec{v}_{m+1}, \dots, \vec{v}_s\}$.

$$\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2 = \sum_{i=1}^r a^i \vec{u}_i + \sum_{i=1}^m b^i \vec{u}_i + \sum_{i=m+1}^s b^i \vec{v}_i.$$

Por tanto, es sistema de generadores, ahora tenemos que ver que son linealmente independientes. Sean $a^i, b^j \in \mathbb{K}$ tales que

$$a^1 \vec{u}_1 + a^2 \vec{u}_2 + \cdots + a^m \vec{u}_m + \cdots + a^r \vec{u}_{r+1} + \cdots + \cdots + b^{m+1} \vec{v}_{m+1} + \cdots + b^s \vec{v}_s = \vec{0}$$

$$\sum_{i=1}^r a^i \vec{u}_i + \sum_{i=m+1}^s b^i \vec{v}_i = \vec{0}.$$

Sea $\vec{y} = \sum_{i=1}^r a^i \vec{u}_i$ por lo que $\vec{y} \in L_1$. Entonces,

$$-\vec{y} = \sum_{i=m+1}^s b^i \vec{v}_i \in L_2.$$

Por tanto, $\vec{y} \in L_1 \cap L_2$. Entonces, \vec{y} se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base de la intersección. Es decir, existen $c^i \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{y} = c^1 \vec{u}_1 + c^2 \vec{u}_2 + \cdots + c^m \vec{u}_m.$$

Entonces,

$$\vec{0} = \vec{y} - \vec{y} = \sum_{j=1}^m c^j \vec{u}_j + \sum_{i=m+1}^s b^i \vec{v}_i = \vec{0}.$$

Como la base de L_2 es linealmente independiente (porque es una base), tenemos que $c^1 = c^2 = \cdots = c^r = b^1 = \cdots = b^s = 0$. Consecuentemente, $\sum_{i=1}^r a^i \vec{u}_i = \vec{0}$ y, dado que $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r\}$ es base de L_1 , tenemos que $a^i = 0, \forall i = 1, \dots, r$. Por tanto, hemos visto que el conjunto que estábamos estudiando es base.

Esta base tiene dimensión $r + s = r + (s + m) - m$. □

Si $L_1 \cap L_2 = \{\vec{0}\}$, tenemos que $\dim L_1 + \dim L_2 = \dim (L_1 + L_2)$.

Definición 1.10. Sean $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$ su suma es directa si $L_1 \cap L_2 = \{\vec{0}\}$ y se escribe de la siguiente manera:

$$L_1 \oplus L_2.$$

Proposición 1.2. Sean $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$. Entonces

$$L_1 \oplus L_2 \iff \forall \vec{x} \in L_1 + L_2, \exists! \vec{x}_1 \in L_1, \vec{x}_2 \in L_2, \vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2.$$

Demostración. (i) Supongamos que $L_1 \oplus L_2$. Asumimos que existen, $\vec{x}_1, \vec{y}_1 \in L_1$ y $\vec{x}_2, \vec{y}_2 \in L_2$ tales que si $\vec{x} \in L_1 + L_2$ tenemos que

$$\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2 = \vec{y}_1 + \vec{y}_2.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\vec{0} &= (\vec{x}_1 - \vec{y}_1) + (\vec{x}_2 - \vec{y}_2). \\ \Rightarrow \vec{x}_1 - \vec{y}_1 &= \vec{y}_2 - \vec{x}_2\end{aligned}$$

Consecuentemente, $\vec{x}_1 - \vec{y}_1, \vec{y}_2 - \vec{x}_2 \in L_1 \cap L_2$, por tanto, $\vec{x}_1 - \vec{y}_1 = \vec{0} \iff \vec{x}_1 = \vec{y}_1$. Similarmente, $\vec{y}_2 = \vec{x}_2$.

(ii) Suponemos que $\forall \vec{x} \in L_1 + L_2, \exists! \vec{x}_1 \in L_1, \vec{x}_2 \in L_2, \vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$. Queremos ver que $L_1 \cap L_2 = \{\vec{0}\}$. Sea $\vec{x} \in L_1 \cap L_2$. Tenemos que $\vec{x} = \vec{x} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{x}$. Tenemos que $\vec{0} \in L_1 \cap L_2$. Como la expresión de \vec{x} ha de ser única, tenemos que $\vec{x} = \vec{0}$, por lo que $L_1 \cap L_2 = \{\vec{0}\}$. \square

Tenemos que si $L_1, L_2, \dots, L_k \in \mathcal{L}(V)$,

$$(L_1 + L_2) + L_3 = \{(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) + \vec{x}_3 : \vec{x}_1 \in L_1, \vec{x}_2 \in L_2, \vec{x}_3 \in L_3\} = L_1 + (L_2 + L_3).$$

Generalmente, esta suma es asociativa, es decir se puede escribir

$$L_1 + L_2 + \dots + L_k = \{\vec{x}_1 + \vec{x}_2 + \dots + \vec{x}_k : \vec{x}_i \in L_i\}.$$

Definición 1.11. Diremos que la suma $L_1 + L_2 + \dots + L_k$ es directa si $\forall \vec{x} \in L_1 + L_2 + \dots + L_k, \exists! \vec{x}_i \in L_i$ tales que $\vec{x} = \sum_{i=1}^k \vec{x}_i$. Esto se denotará de la siguiente manera:

$$L_1 \oplus L_2 \oplus \dots \oplus L_k.$$

Proposición 1.3. Si L_1, \dots, L_k , entonces $L_1 \oplus \dots \oplus L_k$ si y solo si $\forall i = 1, \dots, k$,

$$L_i \cap (L_1 + L_2 + \dots + L_{i-1} + L_{i+1} + \dots + L_k) = \{\vec{0}\}.$$

Demostración. (i) Demostramos la primera implicación. Supongamos que $\forall i = 1, \dots, k$, y sea $\vec{x} \in L_i \cap (L_1 + \dots + L_{i-1} + L_{i+1} + \dots + L_k)$. Queremos decir que $\vec{x} = \vec{0}$. Tenemos que, dado que $\vec{x} \in L_i$:

$$\vec{x} = \vec{0} + \dots + \vec{0} + \vec{x}_i + \vec{0} + \dots + \vec{0}.$$

Como $\vec{x} \in L_i \cap (L_1 + \dots + L_{i-1} + L_{i+1} + \dots + L_k)$, tenemos que $\vec{x} \in L_1 + \dots + L_{i-1} + L_{i+1} + \dots + L_k$:

$$\vec{x} = \vec{x}_1 + \dots + \vec{x}_{i-1} + \vec{x}_{i+1} + \dots + \vec{x}_k.$$

Como $L_1 \oplus \dots \oplus L_k$, tenemos que la expresión de \vec{x} es única, por lo que $\vec{x} = \vec{0}$.

(ii) Demostramos la siguiente implicación. Asumimos que

$$\forall i = 1, \dots, k; L_i \cap (L_1 + L_2 + \dots + L_{i-1} + L_{i+1} + \dots + L_k) = \{\vec{0}\}.$$

Sea

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^k \vec{x}_i = \sum_{i=1}^k \vec{y}_i.$$

Con $\vec{x}_i, \vec{y}_i \in L_i$, tenemos que

$$\vec{0} = (\vec{x}_1 - \vec{y}_1) + \dots + (\vec{x}_i + \vec{y}_i) + \dots + (\vec{x}_k + \vec{y}_k).$$

$$\therefore \vec{y}_i - \vec{x}_i = (\vec{x}_1 - \vec{y}_1) + \dots + (\vec{x}_{i-1} - \vec{y}_{i-1}) + (\vec{x}_{i+1} - \vec{y}_{i+1}) + \dots + (\vec{x}_k - \vec{y}_k).$$

Por lo que $\vec{y}_i - \vec{x}_i = \vec{0}, \forall i = 1, \dots, k$. Si esto no fuera cierto para algún $\vec{x}_j - \vec{y}_j$, podríamos despejarlo y tendríamos que está en la intersección pero a la vez no es $\vec{0}$, lo cual contradice nuestra hipótesis. □

Definición 1.12. $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$ son **complementarios** si $L_1 \oplus L_2$ y $V = L_1 \oplus L_2$.

$$L_1 \oplus L_2 = V \iff \forall \vec{x} \in V, \exists! \vec{x}_1 \in L_1, \vec{x}_2 \in L_2, \vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2.$$

Teorema 1.12. Sea $L \in \mathcal{L}(V)$, entonces existe $L' \in \mathcal{L}(V)$ tal que $L \oplus L' = V$.

Demostración. Sea $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_r\}$ una base de L y sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r, \vec{u}_{r+1}, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V . La manera de ampliar una base no es única. Sea L' el subespacio generado por los vectores que he añadido a la base de L para formar la base de V , es decir,

$$L' = L(\{\vec{u}_{r+1}, \dots, \vec{u}_n\}).$$

Tenemos que $\forall \vec{x} \in V$, existen $a^i \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x} = a^1 \vec{u}_1 + \dots + a^r \vec{u}_r + a^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + a^n \vec{u}_n.$$

Sea $\vec{x}_1 = a^1 \vec{u}_1 + \dots + a^r \vec{u}_r \in L$ y $\vec{x}_2 = a^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + a^n \vec{u}_n \in L'$. Vamos a ver que $L \cap L' = \{\vec{0}\}$.

Sabemos que $\{\vec{0}\} \subset L \cap L'$. Si $\vec{x} \in L \cap L'$. Entonces existen $a^i \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x} = a^1 \vec{u}_1 + \dots + a^r \vec{u}_r.$$

Como $\vec{x} \in L'$, existen $a^j \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x} = a^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + a^n \vec{u}_n.$$

Entonces,

$$\vec{0} = (a^1 \vec{u}_1 + \dots + a^r \vec{u}_r) - (a^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + a^n \vec{u}_n).$$

Esto es una combinación lineal de los elementos de una base que me da el vector nulo. Como las bases son linealmente independientes, tenemos que

$$a^1 = \dots = a^r = a^{r+1} = \dots = a^n = 0.$$

Por tanto, $\vec{x} = \vec{0}$. Consecuentemente, la suma es directa. □

1.4. Espacio vectorial cociente

Definición 1.13. Definimos la relación de equivalencia:

$$\vec{x}R\vec{y} \iff \vec{y} - \vec{x} \in L.$$

Si $\vec{x} \in V$,

$$[\vec{x}] = \{\vec{y} \in V : \vec{y} - \vec{x} \in L\} = \{\vec{y} \in V : \vec{y} - \vec{x} = \vec{l}\} = \{\vec{x} + \vec{l} : \vec{l} \in L\} = \vec{x} + L$$

Teorema 1.13. Sea V un \mathbb{K} -espacio vectorial. Si $\vec{x}, \vec{y} \in V$ decimos que $\vec{x}R\vec{y}$ si $\vec{x} - \vec{y} \in L$, donde $L \in \mathcal{L}(V)$. Tenemos que R es una relación de equivalencia en V .

Demostración. (i) Reflexiva. Si $\vec{x} \in V$, tenemos que

$$\vec{x} - \vec{x} \in \vec{0} \in L.$$

(ii) Simétrica. Si $\vec{x}, \vec{y} \in V$ tal que $\vec{x}R\vec{y}$, tenemos que

$$\vec{x} - \vec{y} \in L \iff \vec{y} - \vec{x} \in L.$$

Pues $\vec{y} - \vec{x} = (-1)(\vec{x} - \vec{y}) \in L$.

(iii) Transitiva. Si $\vec{x}R\vec{y}$ y $\vec{y}R\vec{z}$, tenemos que $\vec{x} - \vec{y} \in L$ y $\vec{y} - \vec{z} \in L$. Como L es espacio vectorial tenemos que:

$$(\vec{x} - \vec{y}) + (\vec{y} - \vec{z}) = \vec{x} - \vec{z} \in L.$$

□

Si $\vec{x} \in V$, tenemos que

$$[\vec{x}] = \{\vec{y} \in V : \vec{y}R\vec{x}\} = \{\vec{y} \in V : \vec{y} - \vec{x} \in L\} = \{\vec{y} \in V : \exists \vec{l} \in L, \vec{y} - \vec{x} = \vec{l}\} = \{\vec{x} + \vec{l} : \vec{l} \in L\} = \vec{x} + L.$$

Definición 1.14 (Espacio cociente).

$$V/R = V/L = \{\vec{x} + L : \vec{x} \in V\}.$$

En V/L defino una suma y un producto por escalares:

$$\begin{aligned} + : V/L \times V/L &\rightarrow V/L \\ (\vec{x} + L, \vec{y} + L) &\rightarrow (\vec{x} + L) + (\vec{y} + L) = (\vec{x} + \vec{y}) + L. \end{aligned}$$

Si $\vec{x} + L = \vec{x}' + L$ y $\vec{y} + L = \vec{y}' + L$. Tenemos que ver que si $\vec{x} + L = \vec{y} + L$, entonces $\vec{x}' + L = \vec{y}' + L$.

¹ Tenemos que

$$\begin{aligned} \vec{x}' &= \vec{x} + \vec{l} \quad \text{y} \quad \vec{y}' = \vec{y} + \vec{l}', \quad \text{con } \vec{l}, \vec{l}' \in L. \\ \vec{x}' + \vec{y}' &= (\vec{x} + \vec{l}) + (\vec{y} + \vec{l}') = (\vec{x} + \vec{y}) + (\vec{l} + \vec{l}'). \end{aligned}$$

Entonces,

$$(\vec{x}' + \vec{y}') - (\vec{x} + \vec{y}) = \vec{l} + \vec{l}' \in L.$$

Entonces, $(\vec{x} + \vec{y}) R (\vec{x}' + \vec{y}')$, por lo que sus clases de equivalencia son iguales.

Teorema 1.14. $(V/L, +)$ es un grupo abeliano.

Demostración. (i) $\forall \vec{x}, \vec{y} \in V$,

$$(\vec{x} + L) + (\vec{y} + L) = (\vec{x} + \vec{y}) + L = (\vec{y} + \vec{x}) + L.$$

(ii) $\forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V$,

$$((\vec{x} + L) + (\vec{y} + L)) + (\vec{z} + L) = ((\vec{x} + \vec{y}) + L) + (\vec{z} + L) = ((\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z}) + L = (\vec{x} + L) + ((\vec{y} + L) + (\vec{z} + L)).$$

(iii) Si consideramos la clase $\vec{0} + L$, tenemos que $\forall \vec{x} \in V$,

$$(\vec{0} + L) + (\vec{x} + L) = (\vec{0} + \vec{x}) + L = \vec{x} + L.$$

(iv) Si $\vec{x} \in V$, el opuesto será, $-(\vec{x} + L) = (-\vec{x}) + L$.

$$(\vec{x} + L) + (-\vec{x} + L) = (\vec{x} + L) + ((-\vec{x}) + L) = (\vec{x} - \vec{x}) + L = \vec{0} + L.$$

□

El producto por escalares está definido así:

$$\begin{aligned} \cdot \mathbb{K} \times V/L &\rightarrow V/L \\ \forall a \in \mathbb{K}, \forall \vec{x} \in V &a \cdot (\vec{x} + L) = (a\vec{x}) + L. \end{aligned}$$

Queremos ver que se trata de una aplicación. Si $\vec{x}' + L = \vec{x} + L$, queremos ver que $(a\vec{x}') + L = (a\vec{x}) + L$. Tenemos que $\vec{x}' - \vec{x} \in L$, por lo que $a\vec{x}' - a\vec{x} \in L$. Por tanto,

$$(a\vec{x}) + L = (a\vec{x}') + L.$$

Observación 1.1. Estas operaciones hacen V/L un espacio vectorial sobre \mathbb{K} .

¹El objetivo, tanto en la suma como en el producto por escalares, es ver que realmente se trata de una aplicación, es decir, si cojo $[\vec{x}] = [\vec{x}']$ y $[\vec{y}] = [\vec{y}']$, me tiene que dar que $[\vec{x} + \vec{y}] = [\vec{x}' + \vec{y}']$.

Teorema 1.15. La dimensión del espacio vectorial V/L se puede expresar como:

$$\dim(V/L) = \dim(V) - \dim(L).$$

Demostración. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r\}$ base de L y sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r, \dots, \vec{u}_n\}$ una base de V . Si $i = 1, \dots, r$, tenemos que

$$\vec{u}_i = \vec{u}_i - \vec{0} \in L \Rightarrow \vec{u}_i + L = \vec{0} + L.$$

Vamos a demostrar que $\{\vec{u}_{r+1} + L, \dots, \vec{u}_n + L\}$ base de V/L . Primero vemos que es un sistema de generadores. Si $\vec{x} \in V$, queremos ver que la clase de \vec{x} se puede expresar como combinación lineal de estas clases. Existen $a^j \in \mathbb{K}$ tales que:

$$\vec{x} = \underbrace{a^1 \vec{u}_1 + \dots + a^r \vec{u}_r}_{\in L} + a^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + a^n \vec{u}_n.$$

Entonces, \vec{x} está relacionado con $a^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + a^n \vec{u}_n$. Por tanto,

$$\vec{x} + L = (a^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + a^n \vec{u}_n) + L = a^{r+1} (\vec{u}_{r+1} + L) + \dots + a^n (\vec{u}_n + L).$$

Por tanto, $\{\vec{u}_{r+1} + L, \dots, \vec{u}_n + L\}$ es un sistema de generadores de V/L . Ahora tenemos que ver que son linealmente independientes.

$$b^{r+1} (\vec{u}_{r+1} + L) + \dots + b^n (\vec{u}_n + L) = \vec{0} + L.$$

Tenemos que

$$(b^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + b^n \vec{u}_n) + L = \vec{0} + L.$$

Entonces,

$$b^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + b^n \vec{u}_n - \vec{0} \in L.$$

Entonces, podemos escribir la expresión anterior como combinación lineal de la base de L :

$$\begin{aligned} b^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + b^n \vec{u}_n &= b^1 \vec{u}_1 + \dots + b^r \vec{u}_r. \\ \Rightarrow (-b^1) \vec{u}_1 + (-b^2) \vec{u}_2 + \dots + (-b^r) \vec{u}_r + \dots + b^n \vec{u}_n &= \vec{0}. \end{aligned}$$

Dado que $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r, \dots, \vec{u}_n\}$ es una base de V , $b^1 = b^2 = \dots = b^r = \dots = b^n = 0$. \square

Observación 1.2. Podemos formar la base de un espacio cociente V/L a partir de la expansión de la base de L para obtener una base de V .

Capítulo 2

Aplicaciones Lineales

Definición 2.1 (Aplicación Lineal). Sean V y V' son espacios vectoriales sobre \mathbb{K} . Una aplicación $f : V \rightarrow V'$ es lineal si

(a) $f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y}), \forall \vec{x}, \vec{y} \in V.$

(b) $f(a\vec{x}) = af(\vec{x}), \forall a \in \mathbb{K}, \forall \vec{x} \in V.$

Definición 2.2. Un **monomorfismo** de V en V' es una aplicación lineal inyectiva. Un **epimorfismo** es una aplicación lineal sobreyectiva. Un **isomorfismo** es una aplicación lineal biyectiva (es homomorfismo y epimorfismo a la vez).

Ejemplo 2.1. (a) Tenemos que $L \in \mathcal{L}(V),$

$$\begin{aligned} i : L &\rightarrow V \\ \vec{x} &\rightarrow \vec{x}. \end{aligned}$$

Esta aplicación es un monomorfismo.

(b) Si $L \in \mathcal{L}(V),$ la aplicación

$$\begin{aligned} p : V &\rightarrow V/L \\ \vec{x} &\rightarrow \vec{x} + L \end{aligned}$$

Es un epimorfismo.

(c) Sean $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ una base de V , la aplicación

$$\begin{aligned} f : V &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ \vec{x} &\rightarrow (a^1, \dots, a^n). \end{aligned}$$

Donde, $\vec{x} = a^1\vec{u}_1 + \dots + a^n\vec{u}_n$. Entonces f es un isomorfismo.

Proposición 2.1. Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal.

(a) Si $L \in \mathcal{L}(V)$

$$f(L) = \{f(\vec{x}) \in V' : \vec{x} \in L\} \in \mathcal{L}(V').$$

(b) $f(\vec{0}) = \vec{0}$ y $f(-\vec{x}) = -f(\vec{x})$.

(c) Si $L' \in \mathcal{L}(V')$,

$$f^{-1}(L') = \{\vec{x} \in V : f(\vec{x}) \in L'\} \in \mathcal{L}(V).$$

(d) $0 : V \rightarrow V'$ tal que $\vec{x} \rightarrow \vec{0}$ es una aplicación lineal.

Demostración. (a) Queremos ver que $\forall \vec{x}', \vec{y}' \in f(L) \Rightarrow \exists \vec{x}, \vec{y} \in L, f(\vec{x}) = \vec{x}'$ y $f(\vec{y}) = \vec{y}'$. Tenemos que ver que la suma y el producto por escalares está bien definidas.

$$\vec{x}' + \vec{y}' = f(\vec{x}) + f(\vec{y}) = f(\vec{x} + \vec{y}) \in f(L).$$

Similarmente, para el producto por escalares, si $a \in \mathbb{K}$,

$$a\vec{x}' = af(\vec{x}) = f(a\vec{x}) \in f(L).$$

(b) Tenemos que $f(\vec{0}) = f(0 \cdot \vec{x}) = 0f(\vec{x}) = \vec{0}$. Similarmente,

$$f(-\vec{x}) = f((-1)\vec{x}) = -f(\vec{x}).$$

Otra demostración es:

$$f(\vec{x}) + f(-\vec{x}) = f(\vec{x} + (-\vec{x})) = f(\vec{0}) = \vec{0}.$$

(c) Sean $\vec{x}, \vec{y} \in f^{-1}(L')$, entonces $f(\vec{x}), f(\vec{y}) \in L'$. Como L' es subespacio vectorial,

$$f(\vec{x}) + f(\vec{y}) \in L'.$$

Por tanto,

$$f(\vec{x} + \vec{y}) \in L' \Rightarrow \vec{x} + \vec{y} \in f^{-1}(L').$$

Para el producto por escalares, si $a \in \mathbb{K}, \vec{x} \in f^{-1}(L')$,

$$f(\vec{x}) \in L' \Rightarrow af(\vec{x}) = f(a\vec{x}) \in L' \Rightarrow a\vec{x} \in f^{-1}(L').$$

□

Corolario 2.1. (a) Imagen. $\text{Im}(f) = f(V) = \{f(\vec{x}) : \vec{x} \in V\} \in \mathcal{L}(V')$.

(b) Núcleo. $\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{\vec{0}\}) = \{\vec{x} \in V : f(\vec{x}) = \vec{0}\} \in \mathcal{L}(V)$.

Demostración. Como V y $\{\vec{0}\}$ son subespacios vectoriales su imagen y preimagen, respectivamente, también serán subespacios vectoriales por la proposición 2.1. \square

Proposición 2.2. Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal, entonces:

(a) f es epimorfismo $\iff \text{Im}(f) = V'$.

(b) f es monomorfismo $\iff \text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$.

Demostración. (a) Es la definición de sobreyectividad.

(b) Primera implicación. Tenemos que $f(\vec{0}) = \vec{0}$. Si $f(\vec{x}) = \vec{0}$, tenemos que $\vec{x} = \vec{0}$ (porque f es inyectiva). Segunda implicación. Supongo que $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$, entonces

$$f(\vec{x}) = f(\vec{y}) \Rightarrow f(\vec{x}) - f(\vec{y}) = f(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{x} - \vec{y} \in \text{Ker}(f) \Rightarrow \vec{x} = \vec{y}.$$

\square

Proposición 2.3. Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal y sea $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_p\}$ un sistema de generadores de $L \in \mathcal{L}(V)$. Entonces $\{f(\vec{x}_1), \dots, f(\vec{x}_p)\}$ es un sistema de generadores de $f(L)$.^a

^aLa independencia lineal no se conserva en una aplicación lineal en general.

Demostración. Sea $\vec{x}' \in f(L)$, existe $\vec{x} \in L$ tal que $f(\vec{x}) = \vec{x}'$. Como $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_p\}$ es un sistema de generadores de L , existen $a^i \in \mathbb{K}$ escalares tales que

$$\vec{x} = a^1 \vec{x}_1 + \dots + a^p \vec{x}_p.$$

Entonces,

$$\vec{x}' = f(a^1 \vec{x}_1 + \dots + a^p \vec{x}_p) = a^1 f(\vec{x}_1) + \dots + a^p f(\vec{x}_p).$$

\square

Teorema 2.1. Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal. Entonces, f es un monomorfismo si y solo si $\forall p \in \mathbb{N}, \forall \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p\} \subset V$ linealmente independientes, implica que $\{f(\vec{u}_1), \dots, f(\vec{u}_p)\}$ son linealmente independientes.

Demostración. (i) Si f es un monomorfismo y sea $p \in \mathbb{N}$, con $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p\} \subset V$ linealmente independientes. Cogemos $a^i \in \mathbb{K}$ tales que

$$a^1 f(\vec{u}_1) + \dots + a^p f(\vec{u}_p) = \vec{0}.$$

Como f es una aplicación lineal,

$$\begin{aligned} & a^1 f(\vec{u}_1) + \cdots + a^p f(\vec{u}_p) \\ &= f(a^1 \vec{u}_1 + \cdots + a^p \vec{u}_p) \\ &= \vec{0}. \end{aligned}$$

Como f es monomorfismo, tenemos que

$$a^1 \vec{u}_1 + \cdots + a^p \vec{u}_p = \vec{0}.$$

Como estos vectores forman una base, tenemos que $a^1 = \cdots = a^p = 0$.

- (ii) Lo hacemos por contraposición. Suponemos que f no es inyectiva (no es monomorfismo), por lo que existe $\vec{x} \neq \vec{0}$ tal que $\vec{x} \in \text{Ker}(f)$. Entonces, $\{\vec{x}\}$ es linealmente independiente y $\{f(\vec{x})\} = \{\vec{0}\}$ es linealmente dependiente. □

Teorema 2.2. Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal. Entonces f es epimorfismo si y solo si para cada sistema de generadores $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ de V , $\{f(\vec{u}_1), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ es sistema de generadores de V' .

Demostración. Sabemos que si $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ es sistema de generadores en V , entonces $\{f(\vec{u}_1), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ será sistema de generadores de $\text{Im}(f)$. Si f es epimorfismo, entonces será base de V' y, si es base de V' es porque $\text{Im}(f) = V'$, por lo que es epimorfismo. □

Proposición 2.4. Sean $f : V \rightarrow V'$ y $g : V' \rightarrow V''$ aplicaciones lineales. Entonces, la composición $g \circ f$ también es lineal.

Demostración. Sean $\vec{x}, \vec{y} \in V$, tenemos que

$$g(f(\vec{x} + \vec{y})) = g(f(\vec{x}) + f(\vec{y})) = g(f(\vec{x})) + g(f(\vec{y})).$$

Entonces, $g \circ f$ es lineal respecto a la suma. Similarmente, si $a \in \mathbb{K}, \vec{x} \in V$ tenemos que

$$g(f(a\vec{x})) = g(af(\vec{x})) = ag(f(\vec{x})).$$

Por tanto, $g \circ f$ es una aplicación lineal. □

Proposición 2.5. Sea $f : V \rightarrow V'$ un isomorfismo (lineal y biyectiva) ^a. Sabemos que existe $f^{-1} : V' \rightarrow V$. Entonces, f^{-1} es isomorfismo.

^aUna función es biyectiva si y sólo si tiene inversa.

Demostración. Solo tenemos que demostrar que es aplicación lineal, porque inversa de una biyección también es biyección. Si $\forall \vec{x}', \vec{y}' \in V'$, como f es biyectiva, $\exists! \vec{x}, \vec{y} \in V$ tales que $\vec{x}' = f(\vec{x}) \iff \vec{x} = f^{-1}(\vec{x}')$ y $\vec{y}' = f(\vec{y}) \iff \vec{y} = f^{-1}(\vec{y}')$. Entonces,

$$f^{-1}(\vec{x}' + \vec{y}') = f^{-1}(f(\vec{x}) + f(\vec{y})) = f^{-1}(f(\vec{x} + \vec{y})) = \vec{x} + \vec{y} = f^{-1}(\vec{x}') + f^{-1}(\vec{y}').$$

Similarmente, si $a \in \mathbb{K}$ y $\vec{x}' \in V'$, $\exists! \vec{x} \in V$ tal que $f(\vec{x}) = \vec{x}' \iff f^{-1}(\vec{x}') = \vec{x}$. Entonces tenemos que,

$$f^{-1}(a\vec{x}') = f^{-1}(af(\vec{x})) = f^{-1}(f(a\vec{x})) = a\vec{x} = af^{-1}(\vec{x}').$$

□

Teorema 2.3. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ una base de V y sean $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} \subset V'$. Entonces, $\exists! f : V \rightarrow V'$ lineal tal que $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$.

Demostración. (i) Primero demostramos la unicidad, es decir, asumimos que existe y demostramos que debe ser única. Entonces, asumimos que existe $f : V \rightarrow V'$ lineal tal que $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$, $\forall i = 1, \dots, n$. Sea $\vec{x} \in V$, entonces existen $a^i \in \mathbb{K}$ únicos tales que

$$\vec{x} = a^1 \vec{u}_1 + \dots + a^n \vec{u}_n.$$

Entonces,

$$f(\vec{x}) = f(a^1 \vec{u}_1 + \dots + a^n \vec{u}_n) = a^1 f(\vec{u}_1) + \dots + a^n f(\vec{u}_n) = a^1 \vec{v}_1 + \dots + a^n \vec{v}_n.$$

Si existiese otra función $g : V \rightarrow V'$ tal que $g(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$, $\forall i = 1, \dots, n$, tendríamos que $f(\vec{x}) = g(\vec{x})$, $\forall \vec{x} \in V$.

(ii) Ahora demostramos la existencia. Sea $f : V \rightarrow V'$ la aplicación $f(\vec{x}) = x^1 \vec{v}_1 + \dots + x^n \vec{v}_n$, donde $\vec{x} = x^1 \vec{u}_1 + \dots + x^n \vec{u}_n$. Tenemos que demostrar que esta aplicación es lineal. Si $\vec{x}, \vec{y} \in V$ queremos ver que $f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y})$. Tenemos que

$$\begin{aligned} f(\vec{x} + \vec{y}) &= f((x^1 \vec{u}_1 + \dots + x^n \vec{u}_n) + (y^1 \vec{u}_1 + \dots + y^n \vec{u}_n)) \\ &= f((x^1 + y^1) \vec{u}_1 + \dots + (x^n + y^n) \vec{u}_n) \\ &= (x^1 + y^1) \vec{v}_1 + \dots + (x^n + y^n) \vec{v}_n \\ &= (x^1 \vec{v}_1 + \dots + x^n \vec{v}_n) + (y^1 \vec{v}_1 + \dots + y^n \vec{v}_n) \\ &= f(\vec{x}) + f(\vec{y}). \end{aligned}$$

Similarmente,

$$f(a\vec{x}) = f(a(x^1 \vec{u}_1 + \dots + x^n \vec{u}_n)) = f(ax^1 \vec{u}_1 + \dots + ax^n \vec{u}_n) = af(\vec{x}).$$

□

Podemos ver que

$$f(\vec{u}_i) = f(0 \cdot \vec{u}_1 + \dots + 0 \cdot \vec{u}_{i-1} + 1 \cdot \vec{u}_i + 0 \cdot \vec{u}_{i+1} + \dots + 0 \cdot \vec{u}_n) = 0 \cdot \vec{v}_1 + \dots + 1 \cdot \vec{v}_i + \dots + 0 \cdot \vec{v}_n = \vec{v}_i.$$

Corolario 2.2. Sea $f : V \rightarrow V'$ lineal y $f(\vec{u}_i) = g(\vec{u}_i), \forall i = 1, \dots, n$ donde $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ es base, entonces $f = g$.

Definición 2.3. Dos espacios vectoriales V y V' son isomorfos si existe $f : V \rightarrow V'$ isomorfismo. Lo expresaremos como $V \approx V'$.

Teorema 2.4. Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal. Entonces son equivalentes:

- (a) f es isomorfismo.
- (b) $\forall \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ base de V , $\{f(\vec{u}_1), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ es base de V' .
- (c) $\exists \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V tal que $\{f(\vec{u}_1), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ es base de V' .

Demostración. Vamos a ver que (a) \Rightarrow (b), que (b) \Rightarrow (c) y que (c) \Rightarrow (a).

(a) \Rightarrow (b) Suponemos que f es un isomorfismo y sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V . Entonces este conjunto es sistema de generadores y son linealmente independientes. Entonces $\{f(\vec{u}_1), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ es sistema de generadores de V' . Además, como son linealmente independientes, $\{f(\vec{u}_1), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ también son linealmente independientes.

(b) \Rightarrow (c) Evidente.

(c) \Rightarrow (a) Sea $f : V \rightarrow V'$ lineal, entonces $\exists \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V , entonces tenemos que $\{f(\vec{u}_1), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ es base de V' . Sea $g : V' \rightarrow V$, tal que $g = f^{-1}$, la única aplicación lineal tal que $g(f(\vec{u}_i)) = \vec{u}_i, \forall i = 1, \dots, n$. Entonces, tenemos que f tiene inversa, por lo que es biyectiva y, además, como es aplicación lineal, es isomorfismo.

□

Corolario 2.3. $V \approx V' \iff \dim V = \dim V'$

Demostración. (i) Si $V \approx V'$, existe un isomorfismo entre ellos, y podemos encontrar una base con el mismo número de elementos en V' .

(ii) Supongamos que $\dim V = \dim V'$. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V y $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ base de V' y $f : V \rightarrow V'$ la única aplicación lineal tal que $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i, \forall i = 1, \dots, n$. Como es una aplicación lineal que lleva bases en bases es un isomorfismo.

□

Observación 2.1. Si consideramos la relación de equivalencia de que dos espacios vectoriales sean isomorfos, tenemos que el conjunto cociente tiene tantos elementos como biyecciones.

Teorema 2.5.

$$\dim V = \dim \operatorname{Ker}(f) + \dim \operatorname{Im}(f).$$

Demostración. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r\}$ base de $\operatorname{Ker}(f)$ y sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r, \vec{u}_{r+1}, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V . Entonces $\dim V = n$ y $\dim \operatorname{Ker}(f) = r$. Vamos a ver que $\{f(\vec{u}_{r+1}), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ es base de $\operatorname{Im}(f)$. Primero tenemos que ver que son sistema de generadores. Sea $\vec{x}' \in \operatorname{Im}(f)$, entonces existe $\vec{x} \in V$ tal que $f(\vec{x}) = \vec{x}'$. Como $\vec{x} \in V$, existen $a^i \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x} = a^1 \vec{u}_1 + \dots + a^n \vec{u}_n.$$

Entonces tenemos que

$$\vec{x}' = f(\vec{x}) = f(a^1 \vec{u}_1 + \dots + a^n \vec{u}_n) = f a^1(\vec{u}_1) + \dots + a^r f(\vec{u}_r) + a^{r+1} f(\vec{u}_{r+1}) + \dots + a^n f(\vec{u}_n).$$

Tenemos que como $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r\}$ es una base de $\operatorname{Ker}(f)$, $f(\vec{u}_i) = \vec{0}, \forall i = 1, \dots, r$:

$$\vec{x}' = a^{r+1} f(\vec{u}_{r+1}) + \dots + a^n f(\vec{u}_n).$$

Entonces, $\{f(\vec{u}_{r+1}), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ es sistema de generadores. Ahora vamos a ver que son linealmente independientes. Sean $b^i \in \mathbb{K}$ tal es que

$$\begin{aligned} b^{r+1} f(\vec{u}_{r+1}) + \dots + b^n f(\vec{u}_n) &= \vec{0} \\ \therefore f(b^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + b^n \vec{u}_n) &= \vec{0} \end{aligned}$$

Por tanto, $b^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + b^n \vec{u}_n \in \operatorname{Ker}(f)$ y lo podemos poner como combinación lineal de su base (existen $b^i \in \mathbb{K}$ tales que):

$$\begin{aligned} b^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + b^n \vec{u}_n &= b^1 \vec{u}_1 + \dots + b^r \vec{u}_r. \\ \therefore -b^1 \vec{u}_1 - \dots - b^r \vec{u}_r + b^{r+1} \vec{u}_{r+1} + \dots + b^n \vec{u}_n &= \vec{0}. \end{aligned}$$

Como se trata de una base de V , tenemos que son linealmente independientes y $b^1 = \dots = b^{r+1} = \dots = b^n = 0$. Por lo que todos los coeficientes son nulos, $\{f(\vec{u}_{r+1}), \dots, f(\vec{u}_n)\}$ son linealmente independientes y forman una base de $\operatorname{Im}(f)$. \square

Observación 2.2. Si $\dim V = \dim V'$ entonces, f es monomorfismo por lo que $\dim \operatorname{Ker}(f) = \vec{0}$. Entonces, $\dim V = \dim V' = \dim \operatorname{Im}(f) \iff \operatorname{Im}(f) = V'$. Es decir, monomorfismo si y solo si epimorfismo si y solo si isomorfismo, es decir, para demostrar que es un isomorfismo solo hay que demostrar que es un monomorfismo!

Definición 2.4 (Endomorfismo). Un **endomorfismo** de V es una aplicación lineal $f : V \rightarrow V$.

Definición 2.5 (Automorfismo). Un **automorfismo** de V es un endomorfismo biyectivo de V .

Teorema 2.6. Sea $f : V \rightarrow V'$ lineal, entonces $p : V \rightarrow V/\text{Ker}(f)$ tal que $\vec{x} \rightarrow \vec{x} + \text{Ker}(f)$ es un epimorfismo. Sea $i : \text{Im}(f) \rightarrow V'$ tal que $\vec{x}' \rightarrow \vec{x}'$ es monomorfismo. Entonces, $\exists! b : V/\text{Ker}(f) \rightarrow \text{Im}(f)$ tal que

$$i \circ b \circ p = f : V \rightarrow V'.$$

Además, b es isomorfismo.

Demostración. Definimos $b(\vec{x} + \text{Ker}(f)) = f(\vec{x})$.

Unicidad. Suponemos que existe b , $\forall \vec{x} \in V$ tal que $b(\vec{x} + \text{Ker}(f)) = f(\vec{x})$.

Vemos que b está bien definida. Si $\vec{y} \in V$, con $\vec{x} + \text{Ker}(f) = \vec{y} + \text{Ker}(f)$, tenemos que

$$\vec{x} - \vec{y} \in \text{Ker}(f) \Rightarrow f(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{0}.$$

Entonces,

$$f(\vec{x} - \vec{y}) = f(\vec{x}) - f(\vec{y}) = \vec{0} \iff f(\vec{x}) = f(\vec{y}).$$

Entonces,

$$b(\vec{x} + \text{Ker}(f)) = b(\vec{y} + \text{Ker}(f)).$$

Comprobamos que b es lineal. Comenzamos con la suma. Si $\vec{x}, \vec{y} \in V$,

$$\begin{aligned} b((\vec{x} + \text{Ker}(f)) + (\vec{y} + \text{Ker}(f))) &= b((\vec{x} + \vec{y}) + \text{Ker}(f)) \\ &= f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y}) \\ &= b(\vec{x} + \text{Ker}(f)) + b(\vec{y} + \text{Ker}(f)). \end{aligned}$$

Ahora comprobamos el producto por escalares. Sea $a \in \mathbb{K}$ y $\vec{x} \in V$,

$$\begin{aligned} b(a(\vec{x} + \text{Ker}(f))) &= b(a\vec{x} + \text{Ker}(f)) \\ &= f(a\vec{x}) = af(\vec{x}) = a(b(\vec{x} + \text{Ker}(f))). \end{aligned}$$

Comprobamos que b es un epimorfismo.

$$\forall \vec{x}' \in \text{Im}(f) \Rightarrow \exists \vec{x} \in V, f(\vec{x}) = \vec{x}'.$$

Por tanto, $f(\vec{x}) = b(\vec{x} + \text{Ker}(f)) = \vec{x}'$. Entonces, $\vec{x}' \in \text{Im}(b)$.

Comprobamos que b es un monomorfismo. Sea $\vec{x} + \text{Ker}(f) \in \text{Ker}(b)$, entonces $f(\vec{x}) = \vec{0}$ por lo que $\vec{x} \in \text{Ker}(f)$. Concluimos que

$$\vec{x} + \text{Ker}(f) = \vec{0} + \text{Ker}(f).$$

□

Observación 2.3. Lo que nos interesa concluir con este teorema es que si $f : V \rightarrow V'$ es lineal, entonces

$$\text{Im}(f) \approx V/\text{Ker}(f).$$

Proposición 2.6. Sea L el complementario vectorial de $\text{Ker}(f)$ en V , es decir,

$$L \oplus \text{Ker}(f) = V \Rightarrow \dim L + \dim \text{Ker}(f) = \dim V.$$

La aplicación

$$\begin{aligned} f_L : L &\rightarrow \text{Im}(f) \\ \vec{x} &\rightarrow f(\vec{x}), \end{aligned}$$

es un isomorfismo.

Demostración. Tenemos que f_L es lineal. Además,

$$\text{Ker}(f_L) = \{\vec{x} \in L : f(\vec{x}) = \vec{0}\} = L \cap \text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}.$$

Entonces tenemos que es monomorfismo. Por otro lado queremos ver que,

$$\text{Im}(f_L) = \text{Im}(f).$$

Si $\vec{x}' \in \text{Im}(f)$, existe $\vec{x} \in V$ tal que $\vec{x}' = f(\vec{x})$. Como $\vec{x} \in V$, $\exists \vec{y} \in \text{Ker}(f)$ y $\vec{z} \in L$ tales que

$$\vec{x}' \in \text{Im}(f_L).$$

Es decir,

$$\vec{x}' = f(\vec{x}) = f(\vec{y} + \vec{z}) = f(\vec{y}) + f(\vec{z}) = f(\vec{z}) = f_L(\vec{z}).$$

Es trivial ver que $\text{Im}(f_L) \subset \text{Im}(f)$. Por tanto es epimorfismo y, consecuentemente, isomorfismo. \square

Corolario 2.4. Si $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$,

$$(L_1 + L_2) / L_1 \approx L_2 / L_1 \cap L_2.$$

Demostración. Si $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$,

$$\dim(L_1 + L_2) - \dim L_1 = \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2).$$

Entonces tenemos que,

$$\dim(L_1 + L_2) / L_1 = \dim L_2 / L_1 \cap L_2.$$

\square

Corolario 2.5. Si $L_1 \subset L_2 \in \mathcal{L}(V)$, entonces

$$(V / L_1) / (L_2 / L_1) \approx V / L_2.$$

Teorema 2.7. $\text{Hom}(V, V')$ tiene una estructura de \mathbb{K} -espacio vectorial.

Demostración. Sea $\text{Hom}(V, V') = \{f : V \rightarrow V' : f \text{ lineal}\}$. En $\text{Hom}(V, V')$ definimos la suma de la siguiente manera. Si $f, g \in \text{Hom}(V, V')$ definimos

$$\begin{aligned} f + g : V &\rightarrow V' \\ (f + g)(\vec{x}) &= f(\vec{x}) + g(\vec{x}). \end{aligned}$$

Vamos a ver que $f + g$ es aplicación lineal. Si $\vec{x}, \vec{y} \in V$,

$$(f + g)(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x} + \vec{y}) + g(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y}) + g(\vec{x}) + g(\vec{y}) = (f + g)(\vec{x}) + (f + g)(\vec{y}).$$

Si $a \in \mathbb{K}$ y $\vec{x} \in V$,

$$(f + g)(a\vec{x}) = f(a\vec{x}) + g(a\vec{x}) = af(\vec{x}) + ag(\vec{x}) = a(f + g)(\vec{x}).$$

Entonces, $f + g$ es aplicación lineal. Así, vamos a comprobar que $(\text{Hom}(V, V'), +)$ es grupo abeliano. Comprobamos la conmutatividad. Si $\vec{x} \in V$,

$$(f + g)(\vec{x}) = f(\vec{x}) + g(\vec{x}) = g(\vec{x}) + f(\vec{x}) = (g + f)(\vec{x}).$$

Aplicamos la conmutatividad en V' como espacio vectorial. Comprobamos la asociatividad. Si $f, g, h \in \text{Hom}(V, V')$,

$$((f + g) + h)(\vec{x}) = (f + g)(\vec{x}) + h(\vec{x}) = f(\vec{x}) + g(\vec{x}) + h(\vec{x}) = f(\vec{x}) + (g + h)(\vec{x}) = (f + (g + h))(\vec{x}).$$

Vamos a ver que $0 \in \text{Hom}(V, V')$, definida por $0(\vec{x}) = \vec{0}, \forall \vec{x} \in V$. Tenemos que si $\vec{x}, \vec{y} \in V$,

$$0(\vec{x} + \vec{y}) = \vec{0} = 0(\vec{x}) + 0(\vec{y}).$$

Si $a \in \mathbb{K}, \vec{x} \in V$,

$$0(a\vec{x}) = \vec{0} = a \cdot 0(\vec{x}) = a \cdot \vec{0} = \vec{0}.$$

Si $f \in \text{Hom}(V, V'), \forall \vec{x} \in V$,

$$(f + 0)(\vec{x}) = f(\vec{x}) + 0(\vec{x}) = f(\vec{x}).$$

Entonces, existe el elemento neutro. Vamos a ver la existencia del opuesto. Si $f \in \text{Hom}(V, V')$, tomamos $-f$ tal que $-f(\vec{x}) = (-f)(\vec{x})$. Entonces tenemos que

$$(f + (-f))(\vec{x}) = f(\vec{x}) + (-f)(\vec{x}) = f(\vec{x}) - f(\vec{x}) = \vec{0}.$$

Entonces,

$$(f + (-f))(\vec{x}) = 0(\vec{x}).$$

Producto por escalares. Si $a \in \mathbb{K}$ y $f \in \text{Hom}(V, V')$, defino $(af)(\vec{x}) = af(\vec{x})$. Vamos a ver que $af \in \text{Hom}(V, V')$.

$$(af)(\vec{x} + \vec{y}) = af(\vec{x} + \vec{y}) = af(\vec{x}) + af(\vec{y}) = (af)(\vec{x}) + (af)(\vec{y}).$$

Similarmente,

Si $b \in \mathbb{K}$ y $\vec{x} \in V$,

$$(af)(b\vec{x}) = af(b\vec{x}) = abf(\vec{x}) = b(af(\vec{x})) = b(f(a\vec{x})).$$

Si $a \in \mathbb{K}$ y $f, g \in \text{Hom}(V, V')$, si $\vec{x} \in V$,

$$(a(f+g))(\vec{x}) = a(f+g)(\vec{x}) = af(\vec{x}) + ag(\vec{x}) = (af)(\vec{x}) + (ag)(\vec{x}) = (af+ag)(\vec{x}).$$

Además,

$$(1f)(\vec{x}) = 1f(\vec{x}) = f(\vec{x}).$$

□

2.1. Ejemplos de aplicaciones lineales

2.1.1. Formas Lineales

Definición 2.6 (Forma lineal). Una **forma lineal** definida en V es una aplicación lineal $\lambda : V \rightarrow \mathbb{K}$.

^a \mathbb{K} es un espacio vectorial sobre sí mismo de dimensión 1.

Teorema 2.8. Si λ es una forma lineal no nula, entonces λ es sobreyectiva (epimorfismo).

Demostración. Sea $a \in \mathbb{K}$. Sabemos que $\lambda \neq 0$, por lo que existe $\vec{x}_0 \in V$ tal que $\lambda(\vec{x}_0) = b \neq 0$. Consideramos $\vec{x} = \frac{a}{b}\vec{x}_0 \in V$, entonces

$$\lambda(\vec{x}) = \frac{a}{b}\lambda(\vec{x}_0) = a.$$

□

Definición 2.7. Una **recta vectorial** de V es un subespacio vectorial de dimensión 1. Análogamente, un **plano vectorial** de V es un subespacio vectorial de dimensión 2. Un **hiperplano vectorial** de V es un subespacio vectorial de dimensión $\dim V - 1$.

Observación 2.4. Los complementarios vectoriales de los hiperplanos son rectas y viceversa.

Si $\lambda : V \rightarrow \mathbb{K}$ lineal no nula,

$$\dim \text{Im}(\lambda) = 1.$$

Por tanto, la imagen de λ es una recta en \mathbb{K} . Además,

$$\dim V = \dim \text{Im}(\lambda) + \dim \text{Ker}(\lambda).$$

Si $\lambda \neq 0$, tenemos que $\text{Ker}(\lambda)$ es un hiperplano vectorial.

Proposición 2.7. Si $L \in \mathcal{L}(V)$ es un hiperplano vectorial, existe $\lambda : V \rightarrow \mathbb{K}$ lineal no nula, tal que $L = \text{Ker}(\lambda)$ ^a.

^aEsto nos sirve para definir los hiperplanos en dimensión infinita.

Demostración. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{n-1}\}$ base de L y sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V . Definimos $\lambda : V \rightarrow \mathbb{K}$ la única aplicación lineal tal que $\lambda(\vec{u}_i) = 0, \forall i = 1, \dots, n-1$, y cogemos $\lambda(\vec{u}_n) = 1$ ¹. Entonces $\text{Ker}(\lambda) = L$, pues su núcleo va a ser un hiperplano vectorial y este contiene a la base de L . Un hiperplano vectorial contenido en otro hiperplano vectorial es el mismo. \square

2.1.2. Homotecias vectoriales

Definición 2.8 (Homotecia vectorial). Sea $\alpha \in \mathbb{K} - \{0\}$. La **homotecia vectorial** de razón α es la aplicación $h_\alpha : V \rightarrow V$ tal que $\vec{x} \rightarrow \alpha\vec{x}$.

Teorema 2.9. (i) Todas las homotecias vectoriales son automorfismos. Es decir,

$$\forall \alpha \in \mathbb{K} - \{0\}, h_\alpha \in \text{Aut}(V).$$

(ii) La aplicación $\mathbb{K} - \{0\} \rightarrow H(V)$ donde $H(V) = \{h_\alpha : \alpha \in \mathbb{K} - \{0\}\}$ con $\alpha \rightarrow h_\alpha$, es biyectiva.

(iii) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}^*$,

$$h_{\alpha\beta} = h_\alpha \circ h_\beta.$$

Demostración. (i) Tenemos que demostrar que es aplicación lineal, pues está claro que es biyectiva.

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in V, h_\alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha\vec{x} + \alpha\vec{y} = h_\alpha(\vec{x}) + h_\alpha(\vec{y}).$$

Si $a \in \mathbb{K}$,

$$h_\alpha(a\vec{x}) = \alpha(a\vec{x}) = a h_\alpha(\vec{x}).$$

(ii) Está claro que la aplicación es sobreyectiva, tenemos que comprobar que es inyectiva: Si $h_\alpha = h_\beta$, tenemos que $\forall \vec{x} \in V$,

$$\alpha\vec{x} = \beta\vec{x}.$$

Si V no es nulo, podemos deducir que,

$$\exists \vec{x} \neq \vec{0}, (\alpha - \beta)\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \alpha = \beta.$$

Por lo que esta aplicación es inyectiva.

(iii)

$$\forall \vec{x} \in V, h_\beta \circ h_\alpha(\vec{x}) = h_\beta(\alpha\vec{x}) = \beta\alpha\vec{x} = h_{\beta\alpha}(\vec{x}).$$

\square

¹Vale cualquier escalar no nulo.

Teorema 2.10. Sea $f : V \rightarrow V$ lineal. Entonces f es una homotecia vectorial si y solo si $\forall L \in \mathcal{L}(V)$ recta vectorial $f(L) = L$.

Demostración. (i) Si $\alpha \in \mathbb{K}^*$ tal que $f = h_\alpha$, sea $L \in \mathcal{L}(V)$ una recta vectorial. Entonces, existe $\vec{x}_0 \in L^*$ tal que $\{\vec{x}_0\}$ es base de L . Entonces, $L = \{a\vec{x}_0 : a \in \mathbb{K}\}$. Además, tenemos que

$$h_\alpha(L) = \{\alpha a \vec{x}_0 : a \in \mathbb{K}\} = L.$$

(ii) Si $\vec{x} \in V^*$, entonces $L(\{\vec{x}\})$ es una recta vectorial. Tenemos que

$$f(L(\{\vec{x}\})) = L(\{\vec{x}\}).$$

Si $\vec{x} \in L(\{\vec{x}\})$,

$$f(\vec{x}) \in L(\{\vec{x}\}) \Rightarrow \exists \alpha_{\vec{x}} \in \mathbb{K}, f(\vec{x}) = \alpha_{\vec{x}} \vec{x}.$$

Tenemos que ver que α es único. Si $\vec{x}, \vec{y} \in V^*$, tenemos que ver si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Si son linealmente dependientes, $\exists a \in \mathbb{K}^*$ tal que

$$\vec{x} = a\vec{y}.$$

Entonces, $f(\vec{x}) = a f(\vec{y}) = f(a\vec{y}) = \alpha_{a\vec{y}} a\vec{y} = \alpha_{\vec{y}} \vec{x}$. Tenemos que

$$(\alpha_{\vec{x}} - \alpha_{\vec{y}})(\vec{x}) = \vec{0} \Rightarrow \alpha_{\vec{x}} = \alpha_{\vec{y}}.$$

Si son linealmente independientes, $\vec{x} + \vec{y} \neq 0$,

$$f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y}) = \alpha_{\vec{x} + \vec{y}}(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha_{\vec{x} + \vec{y}}\vec{x} + \alpha_{\vec{x} + \vec{y}}\vec{y} = \alpha_{\vec{x}}\vec{x} + \alpha_{\vec{y}}\vec{y}.$$

Entonces tenemos que

$$(\alpha_{\vec{x} + \vec{y}} - \alpha_{\vec{x}})\vec{x} = (\alpha_{\vec{x} + \vec{y}} - \alpha_{\vec{y}})\vec{y} \Rightarrow \alpha_{\vec{x}} = \alpha_{\vec{x} + \vec{y}} = \alpha_{\vec{y}}.$$

Sea $\alpha = \alpha_{\vec{x}}$, con $\vec{x} \in V^*$. Entonces si $\vec{y} \in V^*$ tenemos que $f(\vec{y}) = \alpha\vec{y}$ y $\vec{0} = \alpha\vec{0}$. Por tanto, se trata de una homotecia lineal. □

2.1.3. Proyecciones

Supongamos que $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$ y seam $L_1 \oplus L_2 = V$. $\forall \vec{x} \in V, \exists \vec{x}_1 \in L_1, \exists \vec{x}_2 \in L_2, \vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$.

Definición 2.9 (Proyección). La **proyección** de base L_1 (respecto a la base L_2) y dirección L_2 (respecto a L_1) es la aplicación

$$\begin{aligned} p_1 : V &\rightarrow V \\ \vec{x} &= \vec{x}_1 + \vec{x}_2 \rightarrow \vec{x}_1. \end{aligned}$$

Respecto a $p_2 : V \rightarrow V$ tal que $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2 \rightarrow \vec{x}_2$.

Teorema 2.11. (i) $p_1 + p_2 = id_V$.

(ii) $p_1 \circ p_2 = 0$ y $p_2 \circ p_1 = 0$.

(iii) p_1 y p_2 son lineales.

(iv) $p_1 \circ p_1 = p_1$ y $p_2 \circ p_2 = p_2$.

Demostración. (i) $\forall \vec{x}_1 \in L_1, \vec{x}_2 \in L_2$,

$$(p_1 + p_2)(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = p_1(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) + p_2(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = \vec{x}_1 + \vec{x}_2.$$

(ii)

$$p_1 \circ p_2(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = p_1(\vec{x}_2) = p_1(\vec{0} + \vec{x}_2) = \vec{0}.$$

(iii)

$$p_1(\vec{x}_1 + \vec{x}_2 + \vec{y}_1 + \vec{y}_2) = p_1((\vec{x}_1 + \vec{y}_1) + (\vec{x}_2 + \vec{y}_2)) = p_1(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) + p_1(\vec{y}_1 + \vec{y}_2).$$

$$p_1(a\vec{x}) = p_1(a(\vec{x}_1 + \vec{x}_2)) = p_1(a\vec{x}_1 + a\vec{x}_2) = a\vec{x}_1 = ap_1(\vec{x}_1 + \vec{x}_2).$$

(iv) Si $\vec{x} \in V$,

$$p_1 \circ p_1(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = p_1(\vec{x}_1) = \vec{x}_1.$$

□

Definición 2.10. Un endomorfismo $p : V \rightarrow V$ es un proyector si $p^2 = p$.

Teorema 2.12. Sea p un proyector definido en V , entonces $(id_V - p)$ es un proyector y $V = L_1 \oplus L_2$ donde $L_1 = \text{Im}(p) = \text{Ker}(p - id_V)$ y $L_2 = \text{Ker}(p) = \text{Im}(p - id_V)$.

Demostración. $\forall \vec{x} \in V$,

$$(id_V - p)^2(\vec{x}) = (id_V - p)(\vec{x} - p(\vec{x})) = \vec{x} - p(\vec{x}) - p(\vec{x}) + p^2(\vec{x}) = \vec{x} - p(\vec{x}) = (id_V - p)(\vec{x}).$$

Vamos a ver que $V = L_1 \oplus L_2$ donde $L_1 = \text{Im}(p)$ y $L_2 = \text{Ker}(p)$.

$$\forall \vec{x} \in V, \vec{x} = p(\vec{x}) + \vec{x} - p(\vec{x}), p(\vec{x} - p(\vec{x})) = p(\vec{x}) - p^2(\vec{x}) = \vec{0}.$$

Tenemos que $p(\vec{x}) \in \text{Im}(p)$ y $(id_V - p)(\vec{x}) \in \text{Ker}(p)$. Entonces $V = L_1 \oplus L_2$.

Si $\vec{x} \in L_1 \cap L_2$, existe $\vec{y} \in V$ tal que $p(\vec{y}) = \vec{x}$ y $p(\vec{x}) = \vec{0}$. Entonces,

$$p(\vec{x}) = \vec{0} \Rightarrow p^2(\vec{y}) = \vec{0}.$$

Por tanto, $\vec{x} = \vec{0}$ y $p(\vec{y}) = \vec{x}$.

Vamos a comprobar que

$$\text{Im}(p) = \text{Ker}(p - id_V).$$

(i) $\vec{x} \in \text{Im}(p)$, entonces $\exists \vec{y} \in V$ tal que $p(\vec{y}) = \vec{x}$.

$$(p - id_V)(\vec{x}) = (p - id_V)(p(\vec{y})) = \underbrace{p^2(\vec{y})}_p - p(\vec{y}) = \vec{0}.$$

Por tanto, $\vec{x} \in \text{Ker}(p - id_V)$.

(ii) Si $\vec{x} \in \text{Ker}(p - id_V)$, tenemos que

$$(p - id_V)(\vec{x}) = p(\vec{x}) - \vec{x} = \vec{0}.$$

Por tanto, $\vec{x} = p(\vec{x})$ y, consecuentemente, $\vec{x} \in \text{Im}(p)$.

La proposición $\text{Ker}(p) = \text{Im}(p - id_V)$ se demuestra igual. \square

2.1.4. Simetrías vectoriales

Asumimos que el cuerpo \mathbb{K} es de característica distinta de 2.

Definición 2.11. Un endomorfismo s de V es involutivo si $s^2 = id_V$ ($\iff \exists s^{-1}$ y $s^{-1} = s$).

Definición 2.12. s es la simetría vectorial de base L_1 y dirección L_2 .

Teorema 2.13. Sea $s : V \rightarrow V$ un endomorfismo involutivo. Sea $L_1 = \text{Im}(s + id_V)$ y $L_2 = \text{Im}(id_V - s)$. Entonces, $L_1 \oplus L_2 = V$ y $s = p_1 - p_2$ (p_1, p_2 son proyecciones). Diremos que s es la simetría de base L_1 y dirección L_2 .

$$\text{Im}(s - id_V) = \text{Ker}(s + id_V) \quad \text{y} \quad \text{Im}(s + id_V) = \text{Ker}(s - id_V).$$

Demostración. Sea $L_1 = \text{Im}(s + id_V)$ y $L_2 = \text{Im}(id_V - s)$.

$$\forall \vec{x} \in V, \vec{x} = \frac{\vec{x} - s(\vec{x})}{2} + \frac{\vec{x} + s(\vec{x})}{2} = (id_V - s)\left(\frac{\vec{x}}{2}\right) + (id_V + s)\left(\frac{\vec{x}}{2}\right).$$

Sea $\vec{x} \in L_1 \cap L_2$,

$$\vec{x} \in L_1, \exists \vec{y} \in V, (s + id_V)(\vec{y}) = \vec{x} \Rightarrow s(\vec{x}) = s((s + id_V)(\vec{y})) = s(s(\vec{y}) + \vec{y}) = s^2(\vec{y}) + s(\vec{y}) = \vec{y} + s(\vec{y}) = \vec{x}.$$

$$\vec{x} \in L_2, \exists \vec{z} \in V, (id_V - s)(\vec{z}) = \vec{x} \Rightarrow s(\vec{x}) = s((id_V - s)(\vec{z})) = s(\vec{z}) - s^2(\vec{z}) = s(\vec{z}) - \vec{z} = -\vec{x}.$$

Entonces, si $\vec{x} \in L_1 \cap L_2$,

$$s(\vec{x}) = \vec{x} \quad \text{y} \quad s(\vec{x}) = -\vec{x} \Rightarrow \vec{x} = \vec{0}.$$

\square

Observación 2.5. Tenemos que $p_1(\vec{x}) = (id_V + s)\left(\frac{\vec{x}}{2}\right)$, y $p_2(\vec{x}) = (id_V - s)\left(\frac{\vec{x}}{2}\right)$. Entonces, $s = p_1 - p_2$. Además, diremos que $L_1 = \text{Ker}(s - id_V)$ y $L_2 = \text{Ker}(s + id_V)$. Esto se puede demostrar con ambas implicaciones: $L_1 \subset \text{Ker}(id_V - s)$ y viceversa.




Figura 2.1: Ejemplo de simetrías vectoriales

2.2. Espacio vectorial dual

Definición 2.13 (Espacio dual). Llamaremos **espacio dual** de V y lo representaremos por $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{K})$.

Teorema 2.14. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V , entonces las formas lineales $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$ definidas por ser las únicas formas lineales tales que

$$\omega^i(\vec{u}_j) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j \\ 0, & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

que llamaremos base dual de $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$.

Demostración. Tenemos que ver que $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$ son linealmente independientes. Sean $a_i \in \mathbb{K}$ tales que

$$a_1\omega^1 + \dots + a_n\omega^n = 0 \in V^*.$$

Tenemos que $\forall i = 1, \dots, n$,

$$0(\vec{u}_i) = 0 = (a_1\omega^1 + \dots + a_n\omega^n)(\vec{u}_i) = a_1\omega^1(\vec{u}_i) + \dots + a_i\omega^i(\vec{u}_i) + \dots + a_n\omega^n(\vec{u}_i) = a_i.$$

Por tanto, $a_i = 0$, $\forall i = 1, \dots, n$.

Ahora vamos a ver que son sistema de generadores. Si $\lambda \in V^*$, $\forall i = 1, \dots, n$,

$$(\lambda(\vec{u}_1)\omega^1 + \lambda(\vec{u}_2)\omega^2 + \dots + \lambda(\vec{u}_n)\omega^n)(\vec{u}_i) = \lambda(\vec{u}_i).$$

Es decir, tenemos que

$$\lambda = \lambda(\vec{u}_1)\omega^1 + \cdots + \lambda(\vec{u}_n)\omega^n.$$

□

Observación 2.6.

$$\vec{x} = a^1\vec{u}_1 + \cdots + a^n\vec{u}_n$$

$$\forall i = 1, \dots, n, w^i(\vec{x}) = w^i(a^1\vec{u}_1 + \cdots + a^n\vec{u}_n) = a^1w^i(\vec{u}_1) + \cdots + a^nw^i(\vec{u}_n) = a^i.$$

Corolario 2.6. $\dim V = \dim V^*$.

Observación 2.7. $(V^*)^* = V^{**}$ bidual. $\forall \vec{x} \in V$,

$$\theta_{\vec{x}} : V^* \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\lambda \rightarrow \theta_{\vec{x}}(\lambda) = \lambda(\vec{x}), \forall \lambda \in V^*.$$

Tenemos que, $\theta_{\vec{x}} \in V^{**}$, además, $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in V^*$,

$$\theta_{\vec{x}}(\lambda_1 + \lambda_2) = (\lambda_1 + \lambda_2)(\vec{x}) = (\lambda_1 + \lambda_2)(\vec{x}) = \lambda_1(\vec{x}) + \lambda_2(\vec{x}) = \theta_{\vec{x}}(\lambda_1) + \theta_{\vec{x}}(\lambda_2).$$

Además, si $a \in \mathbb{K}$, $\forall \lambda \in V^*$,

$$\theta_{\vec{x}}(a\lambda) = (a\lambda)(\vec{x}) = a\lambda(\vec{x}) = a\theta_{\vec{x}}(\vec{\lambda}).$$

Entonces tenemos que $\theta_{\vec{x}}$ es una aplicación lineal y, por tanto, $\theta_{\vec{x}} \in V^{**}$.

Teorema 2.15. La aplicación

$$\theta : V \rightarrow V^{**}$$

$$\vec{x} \rightarrow \theta_{\vec{x}},$$

es lineal.

Demostración. Tenemos que $\forall \lambda \in V^*$,

$$\theta_{\vec{x}+\vec{y}}(\lambda) = \lambda(\vec{x} + \vec{y}) = \lambda(\vec{x}) + \lambda(\vec{y}) = \theta_{\vec{x}}(\lambda) + \theta_{\vec{y}}(\lambda) = (\theta_{\vec{x}} + \theta_{\vec{y}})(\lambda).$$

Entonces tenemos que

$$\theta_{\vec{x}+\vec{y}} = \theta_{\vec{x}} + \theta_{\vec{y}} \iff \theta(\vec{x} + \vec{y}) = \theta(\vec{x}) + \theta(\vec{y}).$$

Además, si $a \in \mathbb{K}$ y $\vec{x} \in V$:

$$\theta(a\vec{x}) = \theta_{a\vec{x}} = a\theta_{\vec{x}} = a\theta(\vec{x}).$$

Entonces, $\forall \lambda \in V^*$,

$$\theta_{a\vec{x}}(\lambda) = \lambda(a\vec{x}) = a\lambda(\vec{x}) = (a\theta_{\vec{x}})(\lambda).$$

Por tanto,

$$\theta_{a\vec{x}} = a\theta_{\vec{x}} \iff \theta(a\vec{x}) = a\theta(\vec{x}).$$

□

Definición 2.14. Sea $V^{**} = \text{Hom}(V^*, \mathbb{K})$ el espacio dual de V^* . Entonces es el espacio **bidual** de V . Además,

$$\dim V^{**} = \dim V^* = \dim V.$$

Teorema 2.16. θ es un isomorfismo de espacios vectoriales.

Demostración. Como tienen la misma dimensión, nos basta con demostrar que es inyectiva. Sea $\vec{x} \in \text{Ker}(\theta)$, queremos ver que $\vec{x} = \vec{0}$. Tenemos que $\forall \lambda \in V^*$,

$$\theta_{\vec{x}}(\lambda) = \lambda(\vec{x}) = \vec{0}.$$

Por tanto, tenemos que $\vec{x} = \vec{0}$ (porque todas las formas lineales devuelven 0 si insertas 0) y, consecuentemente, θ es isomorfismo. \square

Teorema 2.17. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V y sea $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$ su dual. Tenemos que $\{\theta_{\vec{u}_1}, \dots, \theta_{\vec{u}_n}\}$ es base de V^{**} . Además, $\forall i, j = 1, \dots, n$,

$$\theta_{\vec{u}_i}(\omega^j) = \omega^j(\vec{u}_i) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j \\ 0, & \text{si } i \neq j \end{cases}.$$

Es decir, tenemos que $\{\theta_{\vec{u}_1}, \dots, \theta_{\vec{u}_n}\}$ es la base dual de $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$.

Observación 2.8. Si $f : V \rightarrow V'$ lineal y $\lambda' \in V'^*$, tenemos que

$$\lambda' \circ f : V \rightarrow \mathbb{K}, \lambda' \circ f \in V^*.$$

Se tiene definida una aplicación (la aplicación dual de f)

$$\begin{aligned} f^* : V'^* &\rightarrow V^* \\ \lambda' &\rightarrow f^*(\lambda') = \lambda' \circ f \end{aligned}$$

Proposición 2.8. f^* es lineal.

Demostración. Tenemos que $\forall \lambda'_1, \lambda'_2 \in V'^*$,

$$f^*(\lambda'_1 + \lambda'_2) = (\lambda'_1 + \lambda'_2) \circ f.$$

Además, $\forall \vec{x} \in V$,

$$\begin{aligned} ((\lambda'_1 + \lambda'_2) \circ f)(\vec{x}) &= (\lambda'_1 + \lambda'_2)(f(\vec{x})) = \lambda'_1(f(\vec{x})) + \lambda'_2(f(\vec{x})) = (\lambda'_1 \circ f)(\vec{x}) + (\lambda'_2 \circ f)(\vec{x}) \\ &= f^*(\lambda'_1)(\vec{x}) + f^*(\lambda'_2)(\vec{x}) = (f^*(\lambda'_1) + f^*(\lambda'_2))(\vec{x}). \end{aligned}$$

Además, $\forall a \in \mathbb{K}, \forall \lambda' \in V'^*$, tenemos que

$$f^* (a\lambda') = (a\lambda') \circ f = af^* (\lambda').$$

Tenemos que $\forall \vec{x} \in V$,

$$(a\lambda') \circ f (\vec{x}) = a (\lambda' \circ f) (\vec{x}) = af^* (\lambda') (\vec{x}).$$

□

Teorema 2.18. Se tiene definida una aplicación

$$\begin{aligned} * : \text{Hom} (V, V') &\rightarrow \text{Hom} (V'^*, V^*) \\ f &\rightarrow f^*. \end{aligned}$$

Tenemos que $*$ es lineal.

Demostración. Si $f, g \in \text{Hom} (V, V')$, tenemos que $\forall \lambda' \in V'^*$,

$$(f + g)^* (\lambda') = \lambda' \circ (f + g) = f^* (\lambda') + g^* (\lambda') = (f^* + g^*) (\lambda').$$

Entonces tenemos que $\forall \vec{x} \in V$,

$$\lambda' \circ (f + g) (\vec{x}) = \lambda' (f (\vec{x}) + g (\vec{x})) = (f^* (\lambda') + g^* (\lambda')) (\vec{x}).$$

Si $a \in \mathbb{K}$ y $f \in \text{Hom} (V, V')$, queremos ver que

$$* (af) = (af)^* = af^*.$$

Tenemos que $\forall \lambda' \in V'^*$,

$$(af)^* (\lambda') = \lambda' \circ (af) = af^* (\lambda').$$

Entonces, $\forall \vec{x} \in V$,

$$(\lambda' \circ (af)) (\vec{x}) = \lambda' (af (\vec{x})) = a\lambda' (f) (\vec{x}) = af^* (\lambda') (\vec{x}).$$

□

Proposición 2.9. Sea $f \in \text{Hom} (V, V')$ y $g \in \text{Hom} (V', V'')$. Se cumple que

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*.$$

Demostración. Tenemos que $\forall \lambda'' \in V''^*$,

$$(g \circ f)^* (\lambda'') = \lambda'' \circ (g \circ f) = (\lambda'' \circ g) \circ f = (g^* (\lambda'')) \circ f = f^* (g^* (\lambda'')) = (f^* \circ g^*) (\lambda'').$$

□

Proposición 2.10.

$$(id_V)^* = id_{V^*}.$$

Demostración. Tenemos que $\forall \lambda \in V^*$,

$$(id_V)^*(\lambda) = \lambda \circ id_V = id_{V^*}(\lambda).$$

□

Proposición 2.11. Si $f : V \rightarrow V'$ isomorfismo, f^* isomorfismo y $(f^{-1})^* = (f^*)^{-1}$.

Demostración. Existe $f^{-1} : V' \rightarrow V$ tal que $f^{-1} \circ f = id_V$ y $f \circ f^{-1} = id_{V'}$. Entonces tenemos que

$$f^* \circ (f^{-1})^* = (f^{-1} \circ f)^* = (id_V)^* = id_{V^*}.$$

Similarmente,

$$(f^{-1})^* \circ f^* = (f \circ f^{-1})^* = (id_{V'})^* = id_{V'^*}.$$

□

Si $f \in \text{Hom}(V, V')$, tenemos que $(f^*)^* = f^{**} \in \text{Hom}(V^{**}, V'^{**})$. Tenemos que $\forall \vec{x} \in V, \theta_{\vec{x}} \in V^{**}$, entonces

$$f^{**}(\theta_{\vec{x}}) = \theta_{\vec{x}} \circ f^* = \theta \circ f.$$

$$\forall \lambda' \in V'^*, \theta_{\vec{x}} \circ f^*(\lambda') = \theta_{\vec{x}}(\lambda' \circ f) = \lambda' \circ f(\vec{x}) = \lambda'(f(\vec{x})) = \theta_{f(\vec{x})}(\lambda').$$

Queremos ver que

$$\theta^{-1} f^{**} \theta_{\vec{x}} = f.$$

2.2.1. Anulador de un subespacio

Definición 2.15 (Ortogonal y anulador). Si $\emptyset \neq A \subset V$. Llamaremos **ortogonal** a A y la expresaremos por:

$$A^\perp = \left\{ \lambda \in V^* : \lambda(\vec{x}) = \vec{0}, \forall \vec{x} \in A \right\} = \{ \lambda \in V^* : A \subset \text{Ker}(\lambda) \}.$$

Proposición 2.12.

$$A^\perp \in \mathcal{L}(V^*).$$

Demostración. Sean $\lambda_1, \lambda_2 \in A^\perp$, vamos a ver que $\lambda_1 + \lambda_2 \in A^\perp$:

$$\forall \vec{x} \in A, (\lambda_1 + \lambda_2)(\vec{x}) = \lambda_1(\vec{x}) + \lambda_2(\vec{x}) = 0.$$

Por lo que, $\lambda_1 + \lambda_2 \in A^\perp$. Similarmente, si $\lambda \in A^\perp$ y $a \in \mathbb{K}$, vamos a ver que $a\lambda \in A^\perp$:

$$\forall \vec{x} \in A, (a\lambda)(\vec{x}) = a\lambda(\vec{x}) = a \cdot 0 = 0.$$

Por lo que $a\lambda \in A^\perp$.

□




Figura 2.2: Resumen del espacio dual

Proposición 2.13. Si $\emptyset \neq A \subset B \subset V$, entonces $B^\perp \subset A^\perp$.

Demostración. Si $\lambda \in B^\perp$, tenemos que $\forall \vec{x} \in B$, $\lambda(\vec{x}) = 0$. Como $A \subset B$, tenemos que $\forall \vec{x} \in A$, $\lambda(\vec{x}) = 0$, por lo que $\lambda \in A^\perp$. \square

Proposición 2.14.

$$A^\perp = L(A)^\perp.$$

Demostración. Si $A \subset L(A)$ tenemos que $L(A)^\perp \subset A^\perp$. Sea $\lambda \in A^\perp$,

$$\forall \vec{x} \in L(A), \exists p \in \mathbb{N}, \exists a^1, \dots, a^p \in \mathbb{K}, \exists \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_p \in A.$$

$$\vec{x} = a^1 \vec{x}_1 + \dots + a^p \vec{x}_p.$$

Entonces,

$$\lambda(\vec{x}) = \lambda(a^1 \vec{x}_1 + \dots + a^p \vec{x}_p) = a^1 \lambda(\vec{x}_1) + \dots + a^p \lambda(\vec{x}_p) = 0.$$

\square

Proposición 2.15. Sean $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$, entonces tenemos que $(L_1 + L_2)^\perp = L_1^\perp \cap L_2^\perp$ y $(L_1 \cap L_2)^\perp = L_1^\perp + L_2^\perp$.

Demostración. **(1.1)** Tenemos que $L_1 \subset L_1 + L_2$ y $L_2 \subset L_1 + L_2$. Entonces sabemos que $(L_1 + L_2)^\perp \subset L_1^\perp$ y $(L_1 + L_2)^\perp \subset L_2^\perp$. Por tanto

$$(L_1 + L_2)^\perp \subset L_1^\perp \cap L_2^\perp.$$

(1.2) Si $\lambda \in L_1^\perp \cap L_2^\perp$, tenemos que

$$\begin{aligned}\forall \vec{x} \in L_1^\perp, \lambda(\vec{x}) &= \vec{0} \\ \forall \vec{y} \in L_2^\perp, \lambda(\vec{y}) &= \vec{0}.\end{aligned}$$

Tenemos que

$$\forall \vec{x} \in L_1 + L_2, \exists \vec{x}_1 \in L_1, \vec{x}_2 \in L_2, \vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2.$$

Entonces tenemos que

$$\lambda(\vec{x}) = \lambda(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = \lambda(\vec{x}_1) + \lambda(\vec{x}_2) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}.$$

Por tanto, $\lambda \in (L_1 + L_2)^\perp$, por lo que

$$L_1^\perp \cap L_2^\perp \subset (L_1 + L_2)^\perp.$$

(2.1) Tenemos que $L_1 \cap L_2 \subset L_1, L_2$, por lo que

$$\begin{aligned}L_1^\perp &\subset (L_1 \cap L_2)^\perp \in \mathcal{L}(V^*) \\ L_2^\perp &\subset (L_1 \cap L_2)^\perp \in \mathcal{L}(V^*).\end{aligned}$$

Entonces,

$$L_1^\perp + L_2^\perp \subset (L_1 \cap L_2)^\perp.$$

(2.2) Vamos a ver que $(L_1 \cap L_2)^\perp \subset L_1^\perp + L_2^\perp$. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r\}$ base de $L_1 \cap L_2$ y sean $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{r+p}\}$ y $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r, \vec{w}_{r+1}, \dots, \vec{w}_{r+q}\}$ bases de L_1 y L_2 , respectivamente. Sea

$$\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{r+p}, \vec{w}_{r+1}, \dots, \vec{w}_{r+q}, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\},$$

base de V . Si $\lambda \in (L_1 \cap L_2)^\perp$, tenemos que ver que existen $\lambda_1 \in L_1^\perp, \lambda_2 \in L_2^\perp$ tales que $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$. Para $\forall i = 1, \dots, r$ defino

$$\lambda_1(\vec{u}_i) = 0 \quad \text{y} \quad \lambda_2(\vec{u}_i) = 0.$$

De esta manera, $(\lambda_1 + \lambda_2)(\vec{u}_i) = 0$. Para $i = r+1, \dots, r+p$ y $\vec{u}_i \in L_1$ defino

$$\lambda(\vec{u}_i) \in \mathbb{K}, \lambda_1(\vec{u}_i) = 0, \lambda_2(\vec{u}_i) = \lambda(\vec{u}_i).$$

Similarmente, para $i = r+1, \dots, r+q$,

$$\lambda(\vec{w}_i) \in \mathbb{K}, \lambda_1(\vec{w}_i) = \lambda(\vec{w}_i), \lambda_2(\vec{w}_i) = 0.$$

□

Teorema 2.19. Sea $L \in \mathcal{L}(V)$, entonces

$$\dim L^\perp = \dim V - \dim L.$$

Observación 2.9. Tenemos que

$$(L^\perp)^\perp = \theta(L).$$

Demostración. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r\}$ base de L , $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V y $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$ su base dual. Entonces tenemos ya que $\{\omega^{r+1}, \dots, \omega^n\}$ son linealmente independientes. Vamos a ver que son sistema de generadores,

$$\forall \lambda \in L^\perp \in \mathcal{L}(V), \exists a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}, .$$

$$\lambda = a_1 \omega^1 + \dots + a_n \omega^n.$$

Tenemos que $\forall i = 1, \dots, r$,

$$0 = \lambda(\vec{u}_i) = a_1 \omega^1(\vec{u}_i) + \dots + a_i \omega^i(\vec{u}_i) + \dots + a_r \omega^r(\vec{u}_i) + \dots + a_n \omega^n(\vec{u}_i) = a_i.$$

Así,

$$\lambda = a_{r+1} \omega^{r+1} + \dots + a_n \omega^n.$$

□

Observación 2.10. Tenemos que

$$\dim L = \dim \theta(L) = \dim (L^\perp)^\perp.$$

Lema 2.1. Sea $L_1, L_2 \in \mathcal{L}(V)$ tales que $V = L_1 \oplus L_2$ y sea $f_1 : L_1 \rightarrow V'$ y $f_2 : L_2 \rightarrow V'$ aplicaciones lineales. Entonces, existe una única $f : V \rightarrow V'$ tal que

$$f|_{L_1} = f_1 \quad \text{y} \quad f|_{L_2} = f_2.$$

^a

^a $f|_L$ es f restringida por L , es decir, solo está definida para los vectores de L .

Demostración. Tenemos que $\forall \vec{x} \in V$, $\exists! \vec{x}_1 \in L_1, \vec{x}_2 \in L_2$ tales que $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$. Queremos que $f(\vec{x}) = f(\vec{x}_1) + f(\vec{x}_2)$:

$$f(\vec{x}) = f(\vec{x}_1) + f(\vec{x}_2) = f|_{L_1}(\vec{x}_1) + f|_{L_2}(\vec{x}_2) = f_1(\vec{x}_1) + f_2(\vec{x}_2).$$

Sea $f : V \rightarrow V'$ la aplicación definida de esta manera:

$$f(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = f_1(\vec{x}_1) + f_2(\vec{x}_2).$$

Queremos ver que f es lineal:

$$\begin{aligned} \forall \vec{x}, \vec{y} \in V, \quad f(\vec{x} + \vec{y}) &= f((\vec{x}_1 + \vec{x}_2) + (\vec{y}_1 + \vec{y}_2)) \\ &= f((\vec{x}_1 + \vec{y}_1) + (\vec{x}_2 + \vec{y}_2)) \\ &= f_1(\vec{x}_1 + \vec{y}_1) + f_2(\vec{x}_2 + \vec{y}_2) \\ &= f_1(\vec{x}_1) + f_2(\vec{x}_2) + f_1(\vec{y}_1) + f_2(\vec{y}_2) \\ &= f(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) + f(\vec{y}_1 + \vec{y}_2) \\ &= f(\vec{x}) + f(\vec{y}). \end{aligned}$$

Similarmente, sea $a \in \mathbb{K}$ y $\vec{x} \in V$,

$$\begin{aligned} f(a\vec{x}) &= f(a(\vec{x}_1 + \vec{x}_2)) = f(a\vec{x}_1 + a\vec{x}_2) = f_1(a\vec{x}_1) + f_2(a\vec{x}_2) \\ &= af_1(\vec{x}_1) + af_2(\vec{x}_2) = a(f_1(\vec{x}_1) + f_2(\vec{x}_2)) \\ &= af(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = af(\vec{x}). \end{aligned}$$

Si $\vec{x}_1 \in L_1$, tenemos que

$$f|_{L_1}(\vec{x}_1) = f(\vec{x}_1 + \vec{0}) = f_1(\vec{x}_1) + f_2(\vec{0}) = f_1(\vec{x}_1).$$

□

Teorema 2.20. Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal. Entonces,

- (a) $\text{Ker}(f^*) = \text{Im}(f)^\perp$.
- (b) $\text{Im}(f^*) = \text{Ker}(f)^\perp$.
- (c) f inyectiva $\iff f^*$ sobreyectiva.
- (d) f sobreyectiva $\iff f^*$ inyectiva.
- (e) $\dim \text{Im}(f) = \dim \text{Im}(f^*)$.

Demostración. (a) Tenemos que $\forall \lambda' \in \text{Ker}(f^*)$, tenemos que

$$\forall \vec{x} \in V, \lambda' \circ f(\vec{x}) = \vec{0}.$$

Similarmente,

$$f^*(\lambda') = \lambda' \circ f = 0.$$

En la otra dirección,

$$\lambda' \in \text{Im}(f)^\perp \Rightarrow \forall \vec{x} \in V, \lambda'(f(\vec{x})) = f^*(\lambda')(\vec{x}) = 0.$$

Por tanto, $f^*(\lambda') = 0$ y $\lambda' \in \text{Ker}(f^*)$.

- (b) Si $\lambda \in \text{Im}(f^*)$. Entonces, existe $\lambda' \in V'^*$ tal que $\lambda = f^*(\lambda') = \lambda' \circ f$. Así, $\forall \vec{x} \in \text{Ker}(f)$, $\lambda(\vec{x}) = \lambda' \circ f(\vec{x}) = \lambda'(\vec{0}) = 0$.

En la otra dirección, si $\lambda \in \text{Ker}(f)^\perp$, buscamos $\lambda' \in V'^*$ tal que $f^*(\lambda') = \lambda' \circ f = \lambda$. Sea $L' \in \mathcal{L}(V')$ tal que $\text{Im}(f) \oplus L' = V'$ y buscamos $\lambda'|_{L'} = 0$. Si $\vec{x}' \in \text{Im}(f)$, existe un $\vec{x} \in V$ tal que $f(\vec{x}) = \vec{x}'$. Defino $\lambda'(\vec{x}') = \lambda(\vec{x})$. Como $\lambda \in \text{Ker}(f)^\perp$ ², tenemos que si $f(\vec{x}) = f(\vec{y})$,

$$f(\vec{x}) - f(\vec{y}) = f(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{x} - \vec{y} \in \text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(\lambda).$$

Así, definimos que $\lambda'(\vec{x}') = \lambda(\vec{x})$ con $\vec{x} \in V$ tal que $f(\vec{x}) = \vec{x}'$.

²Ortogonal del núcleo, que no el núcleo del ortogonal.

(c) Tenemos que f es inyectiva si y solo si $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$. Esto es equivalente a que $\text{Ker}(f)^\perp = \text{Im}(f^*) = V^*$, que es equivalente a que f^* es sobreyectiva.

(d) Tenemos que f es sobreyectiva si y solo si $\text{Im}(f) = V'$. Esto es equivalente a decir que $\text{Im}(f)^\perp = \text{Ker}(f^*) = \{\vec{0}\}$, que es equivalente a decir que f^* sea inyectiva.

(e)

$$\dim \text{Im}(f) = \dim V' - \dim \text{Im}(f^\perp) = \dim V' - \dim \text{Ker}(f^*) = \dim V'^* - \dim \text{Ker}(f^*) = \dim \text{Im}(f^*).$$

□

Definición 2.16. Si $f : V \rightarrow V'$ es lineal llamaremos $\text{ran}(f)$ a $\dim \text{Im}(f)$.

2.2.2. Matriz de f^*

Teorema 2.21.

$$\mathcal{M}_{\{\sigma^j\}\{\omega^i\}}(f^*) = (\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}(f))^t.$$

Demostración. Sea $f : V \rightarrow V'$ lineal y $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ una base de V y $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\}$ una base de V' . Entonces, tenemos que $\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}(f) = A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ es la matriz asociada a f . Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m & \cdots & a_n^m \end{pmatrix}.$$

Así, la dual de f está definida de la siguiente manera

$$\begin{aligned} f^* : V'^* &\rightarrow V^* \\ \lambda &\rightarrow \lambda \circ f. \end{aligned}$$

Así, si $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$ es la base dual de $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ y $\{\sigma^1, \dots, \sigma^m\}$ es la base dual de $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\}$, entonces $\mathcal{M}_{\{\sigma^j\}\{\omega^i\}}(f^*) = B \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$ es la matriz que corresponde a f^* . Las columnas de B son las coordenadas de $f^*(\sigma^j)$ en la base $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$. Así,

$$f^*(\sigma^j)(\vec{u}_i) = \sigma^j(f(\vec{u}_i)) = \sigma^j(a_i^1 \vec{v}_1 + \cdots + a_i^j \vec{v}_j + \cdots + a_i^m \vec{v}_m) = a_i^j.$$

Así, $B = A^t$.

□

Capítulo 3

Matrices

3.1. Matriz asociada a una aplicación lineal

Definición 3.1 (Matriz). Una matriz A con coeficientes \mathbb{K} de $m \in \mathbb{N}$ filas y $n \in \mathbb{N}$ columnas es una tabla

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m & \cdots & a_n^m \end{pmatrix}.$$

con $a_i^j \in \mathbb{K}$, $\forall i = 1, \dots, n$, $\forall j = 1, \dots, m$.

Sean V, V' espacios vectoriales con $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ y $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\}$ bases de V y V' , respectivamente. Si $f \in \text{Hom}(V, V')$, entonces $f(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n) \in V'$ y existen $a_i^j \in \mathbb{K}$ tales que

$$\begin{aligned} f(\vec{u}_1) &= a_1^1 \vec{v}_1 + \cdots + a_n^1 \vec{v}_m \\ f(\vec{u}_2) &= a_2^1 \vec{v}_1 + \cdots + a_n^2 \vec{v}_m \\ &\vdots \\ f(\vec{u}_n) &= a_n^1 \vec{v}_1 + \cdots + a_n^m \vec{v}_m. \end{aligned}$$

Entonces, a f le podemos asignar la matriz A tal que

$$f \rightarrow A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m & \cdots & a_n^m \end{pmatrix}.$$

Teorema 3.1. Sea $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) = \{A : A \text{ matriz } m \times n\}$. Definimos

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}} : \text{Hom}(V, V') &\rightarrow \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) \\ f &\rightarrow A. \end{aligned}$$

Tenemos que $\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}$ es biyectiva.

Demostración. Tenemos que si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, entonces existen unos únicos $\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n \in V'$ tales que

$$\begin{aligned} \vec{w}_1 &= a_1^1 \vec{v}_1 + \dots + a_1^m \vec{v}_m \\ &\vdots \\ \vec{w}_n &= a_n^1 \vec{v}_1 + \dots + a_n^m \vec{v}_m. \end{aligned}$$

Para estos existe una única $f \in \text{Hom}(V, V')$ tal que $f(\vec{u}_1) = \vec{w}_1, \dots, f(\vec{u}_n) = \vec{w}_n$. \square

Teorema 3.2. $\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}$ es isomorfismo.

Demostración. Sabemos que es biyectiva, ahora tenemos que ver que es una aplicación lineal. Para ello, definimos la suma de matrices de la siguiente forma: si $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$,

$$A + B = \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}} \left(\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}^{-1}(A) + \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}^{-1}(B) \right).$$

Definimos el producto por escalares. Sea $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ y $a \in \mathbb{K}$,

$$a \cdot A = \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}} \left(a \cdot \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}^{-1}(A) \right).$$

La demostración se puede completar con la demostración del siguiente teorema. \square

Teorema 3.3. $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ es un \mathbb{K} -espacio vectorial.

Demostración. Tenemos las siguientes equivalencias

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m & \dots & a_n^m \end{pmatrix} \iff f \in \text{Hom}(V, V') \quad y \quad B = \begin{pmatrix} b_1^1 & \dots & b_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ b_1^m & \dots & b_n^m \end{pmatrix} \iff g \in \text{Hom}(V, V').$$

Así, $A + B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) \iff f + g \in \text{Hom}(V, V')$. Tenemos que

$$\begin{aligned} f(\vec{u}_i) &= a_i^1 \vec{v}_1 + \dots + a_i^m \vec{v}_m, \quad \forall i = 1, \dots, n \\ g(\vec{u}_i) &= b_i^1 \vec{v}_1 + \dots + b_i^m \vec{v}_m, \quad \forall i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Entonces, tenemos que

$$(f + g)(\vec{u}_i) = f(\vec{u}_i) + g(\vec{u}_i) = (a_i^1 + b_i^1)\vec{v}_1 + \cdots + (a_i^m + b_i^m)\vec{v}_m.$$

Es decir,

$$A + B = \begin{pmatrix} a_1^1 + b_1^1 & \cdots & a_n^1 + b_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m + b_1^m & \cdots & a_n^m + b_n^m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}).$$

Hacemos lo mismo con el producto por escalares. Sea $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ y $a \in \mathbb{K}$, tenemos que $af \in \text{Hom}(V, V') \iff a \cdot A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$. Tenemos que

$$af(\vec{u}_i) = aa_i^1\vec{v}_1 + \cdots + aa_i^m\vec{v}_m.$$

Es decir,

$$a \cdot A = \begin{pmatrix} aa_1^1 & \cdots & aa_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ aa_1^m & \cdots & aa_n^m \end{pmatrix}.$$

Tenemos que existe la matriz 0, pues $0 \in \text{Hom}(V, V')$, por lo que

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Similarmente, la matriz opuesta se puede definir así:

$$-A = (-1) \cdot A = \begin{pmatrix} -a_1^1 & \cdots & -a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ -a_1^m & \cdots & -a_n^m \end{pmatrix}.$$

□

3.2. Producto de matrices

Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V , $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\}$ base de V' y $\{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_p\}$ base de V'' . Entonces, podemos encontrar aplicaciones lineales tales que

$$f \in \text{Hom}(V, V') \rightarrow A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}) \quad \text{y} \quad g \in \text{Hom}(V', V'') \rightarrow B \in \mathcal{M}_{p \times m}(\mathbb{K}).$$

Tenemos que $g \circ f \in \text{Hom}(V, V'')$. Definimos el producto de matrices tal que

$$g \circ f \rightarrow B \cdot A \in \mathcal{M}_{p \times n}(\mathbb{K}).$$

Es decir,

$$B \cdot A = \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{w}_k\}}(g \circ f).$$

Tenemos que la expresión de A y B será:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m & \cdots & a_n^m \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} b_1^1 & \cdots & b_p^1 \\ \vdots & & \vdots \\ b_1^p & \cdots & b_p^p \end{pmatrix}.$$

Entonces, $\forall i = 1, \dots, m$ y $\forall j = 1, \dots, p$,

$$\begin{aligned} f(\vec{u}_i) &= a_i^1 \vec{v}_1 + \cdots + a_i^m \vec{v}_m \\ g(\vec{v}_j) &= b_j^1 \vec{w}_1 + \cdots + b_j^p \vec{w}_p. \end{aligned}$$

Tenemos que $g \circ f$ será:

$$\begin{aligned} g(f(\vec{u}_i)) &= g(a_i^1 \vec{v}_1 + \cdots + a_i^m \vec{v}_m) \\ &= a_i^1 (b_1^1 \vec{w}_1 + \cdots + b_1^p \vec{w}_p) + \cdots + a_i^m (b_p^1 \vec{w}_1 + \cdots + b_p^p \vec{w}_p) \\ &= (a_i^1 b_1^1 + \cdots + a_i^m b_m^1) \vec{w}_1 + \cdots + (a_i^1 b_1^p + \cdots + a_i^m b_m^p) \vec{w}_p. \end{aligned}$$

Así, tenemos que

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^m a_j^1 b_j^1 & \cdots & \sum_{j=1}^m a_j^1 b_j^p \\ \vdots & & \vdots \\ \sum_{j=1}^m a_j^m b_j^1 & \cdots & \sum_{j=1}^m a_j^m b_j^p \end{pmatrix}.$$

Ahora vamos a ver como utilizamos la matriz de una transformación lineal para calcular $f(\vec{x})$.

Sea $f: V \rightarrow V'$ lineal. Si $\vec{x} \in V$, entonces existen únicos $x^1, \dots, x^n \in \mathbb{K}$ tales que

$$\vec{x} = x^1 \vec{u}_1 + \cdots + x^n \vec{u}_n.$$

Entonces tenemos que $f(\vec{x}) \in V'$, por lo que $\exists! x'^1, \dots, x'^m \in \mathbb{K}$ tales que

$$f(\vec{x}) = x'^1 \vec{v}_1 + \cdots + x'^m \vec{v}_m.$$

Similarmente,

$$\begin{aligned} f(\vec{x}) &= f(x^1 \vec{u}_1 + \cdots + x^n \vec{u}_n) = x^1 f(\vec{u}_1) + \cdots + x^n f(\vec{u}_n) \\ &= x^1 (a_1^1 \vec{v}_1 + \cdots + a_1^m \vec{v}_m) + \cdots + x^n (a_n^1 \vec{v}_1 + \cdots + a_n^m \vec{v}_m) \\ &= (x^1 a_1^1 + \cdots + x^n a_n^1) \vec{v}_1 + \cdots + (x^1 a_1^m + \cdots + x^n a_n^m) \vec{v}_m. \end{aligned}$$

Así, tenemos que las coordenadas de $f(\vec{x})$ serán:

$$\begin{cases} x'^1 = x^1 a_1^1 + \cdots + x^n a_n^1 \\ \vdots \\ x'^m = x^1 a_1^m + \cdots + x^n a_n^m \end{cases}.$$

En forma matricial tenemos que

$$A \cdot \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'^1 \\ x'^2 \\ \vdots \\ x'^m \end{pmatrix}.$$

A continuación, vamos a estudiar la matriz de cambio de base. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ y $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ bases de V . Tenemos que

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 &= a_1^1 \vec{u}_1 + \dots + a_1^n \vec{u}_n \\ &\vdots \\ \vec{v}_n &= a_n^1 \vec{u}_1 + \dots + a_n^n \vec{u}_n.\end{aligned}$$

Así, si $\vec{x} \in V$ existen unos únicos $x^1, \dots, x^n \in \mathbb{K}$ tales que $\vec{x} = x^1 \vec{u}_1 + \dots + x^n \vec{u}_n$ y existen unos únicos $x'^1, \dots, x'^n \in \mathbb{K}$ tales que $\vec{x} = x'^1 \vec{v}_1 + \dots + x'^n \vec{v}_n$. Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned}\vec{x} &= x'^1 \vec{v}_1 + \dots + x'^n \vec{v}_n \\ &= x'^1 (a_1^1 \vec{u}_1 + \dots + a_1^n \vec{u}_n) + \dots + x'^n (a_n^1 \vec{u}_1 + \dots + a_n^n \vec{u}_n) \\ &= (x'^1 a_1^1 + \dots + x'^n a_n^1) \vec{u}_1 + \dots + (x'^1 a_1^n + \dots + x'^n a_n^n) \vec{u}_n.\end{aligned}$$

Así, tenemos que

$$\begin{cases} x^1 = x'^1 a_1^1 + \dots + x'^n a_n^1 \\ \vdots \\ x^n = x'^1 a_1^n + \dots + x'^n a_n^n \end{cases} \Rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \dots & a_n^n \end{pmatrix}}_{\text{Matriz cambio de base}} \begin{pmatrix} x'^1 \\ \vdots \\ x'^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 3.1. $id_V : V_{\{\vec{v}_i\}} \rightarrow V_{\{\vec{u}_i\}}$. Queremos calcular la matriz $\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_i\}}(id_V)$. Tenemos que

$$id_V(\vec{v}_i) = \vec{v}_i = a_i^1 \vec{u}_1 + \dots + a_i^n \vec{u}_n.$$

Por tanto,

$$\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_i\}}(id_V) = \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \dots & a_n^n \end{pmatrix}.$$

3.3. Permutaciones

Definición 3.2 (Permutación). Sea $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Una **permutación** de X es una aplicación biyectiva $\sigma : X \rightarrow X$.

Normalmente se escriben de la siguiente forma:

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{bmatrix}.$$

Teorema 3.4. Sea $\mathcal{S}_n = \{\sigma : \sigma \text{ permutación de } X\}$ y $\circ : \mathcal{S}_n \times \mathcal{S}_n \rightarrow \mathcal{S}_n$ sea la operación de composición entre permutaciones. Entonces, (\mathcal{S}_n, \circ) es un grupo.

Demostración. Tenemos que la composición de funciones biyectivas es una operación cerrada. Además, tenemos que es asociativa, existe el elemento neutro (i.e. id_X) y el opuesto (i.e. σ^{-1} , el inverso, que también es biyección). \square

Definición 3.3. Sean $\{a_1, \dots, a_r\} \subset X$ distintos 2 a 2. El r -ciclo (a_1, \dots, a_r) es la permutación (a_1, \dots, a_r) tal que

$$\begin{aligned} a_1 &\rightarrow a_2 \\ a_2 &\rightarrow a_3 \\ &\vdots \\ a_r &\rightarrow a_1. \end{aligned}$$

Proposición 3.1. Toda permutación es composición de r -ciclos.

Demostración. Sea $\sigma \in \mathcal{S}_n$. Si $\forall a \in X$, $\sigma(a) = a$, entonces $\sigma = id_X$, que es un 1-ciclo. Si $\exists a_1 \in X$ tal que $\sigma(a_1) = a_2 \neq a_1$, defino

$$\begin{aligned} a_3 &= \sigma^2(a_1) = \sigma(a_2) \in X \\ &\vdots \\ a_k &= \sigma^{k-1}(a_1) = \sigma(a_{k-1}) \in X. \end{aligned}$$

Sea $r \in \mathbb{N}$ el primer natural tal que $a_r \in \{a_1, \dots, a_{r-1}\}$. Entonces, $\sigma(a_r) = a_1$. Así, tenemos que $a_r = \sigma^{r-1}(a_1)$ y $\sigma(a_r) = \sigma^h(a_1)$, con $h < r$. De esta manera, $a^{r-h} = \sigma^{r-1-h}(a_1) = a_1$. Si $\forall b \in X - \{a_1, \dots, a_r\}$ tenemos que $\sigma(b) = b$ ya hemos terminado. En cambio, si existe $b_1 \in X - \{a_1, \dots, a_r\}$ tal que $\sigma(b_1) = b_2 \neq b_1$, hacemos el mismo procedimiento de antes:

$$\begin{aligned} b_3 &= \sigma(b_2) = \sigma^2(b_1) \\ &\vdots \\ b_k &= \sigma(b_{k-1}) = \sigma^{k-1}(b_1). \end{aligned}$$

Sea s el primer natural tal que $\sigma(b_s) \in \{b_1, \dots, b_{s-1}\}$. Entonces, $\sigma(b_s) = b_1$. Así, tenemos que $\sigma = (b_1, \dots, b_s) \circ (a_1, \dots, a_r)$. Repetimos este proceso hasta que se agoten los elementos de X . \square

Ejemplo 3.2. Consideremos

$$\begin{aligned} \sigma &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 9 & 8 & 10 & 2 & 1 & 3 & 4 & 6 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 & 2 & 8 & 6 & 3 & 10 & 7 & 4 \\ 9 & 5 & 1 & 8 & 6 & 3 & 10 & 7 & 4 & 2 \end{bmatrix} \\ &= (1, 9, 5) \circ (2, 8, 6, 3, 10, 7, 4) \end{aligned}$$

Ejemplo 3.3.

$$\begin{aligned}\sigma &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 8 & 5 & 6 & 1 & 2 & 7 & 3 & 4 & 10 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 4 & 2 & 5 & 3 & 6 & 7 & 9 & 10 \\ 8 & 4 & 1 & 5 & 2 & 6 & 7 & 3 & 10 & 9 \end{bmatrix} \\ &= (1, 8, 4) \circ (2, 5) \circ (3, 6, 7) \circ (9, 10).\end{aligned}$$

Definición 3.4. Los 2-ciclos los llamaremos **trasposiciones**.

Proposición 3.2. Todo ciclo es producto de trasposiciones.

Demostración. Tenemos que

$$(a_1, \dots, a_m) = (a_1, a_2)(a_2, a_3) \cdots (a_{m-1}, a_m).$$

□

Definimos

$$\nabla = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\vec{x}_i - \vec{x}_j) = (\vec{x}_1 - \vec{x}_2)(\vec{x}_1 - \vec{x}_3) \cdots (\vec{x}_1 - \vec{x}_n)(\vec{x}_2 - \vec{x}_3) \cdots (\vec{x}_2 - \vec{x}_n) \cdots (\vec{x}_{n-1} - \vec{x}_n).$$

De esta manera, si $\sigma \in \mathcal{S}_n$, definimos

$$\nabla\sigma = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \vec{x}_{\sigma(i)} - \vec{x}_{\sigma(j)}.$$

Una permutación de σ es un par $i < j$ tal que $\sigma(i) < \sigma(j)$. Una inversión de σ es un par $i < j$ tal que $\sigma(j) < \sigma(i)$. Entonces, el número de factores de ∇ y $\nabla\sigma$ es el mismo. Así, tenemos que

$$\nabla\sigma = (-1)^{\text{número de inversiones}} \nabla.$$

El valor de -1 elevado al número de inversiones de σ lo llamaremos índice o signo de σ y se escribirá $\text{ind}(\sigma)$ o $\text{sig}(\sigma)$ ¹. Entonces,

$$\nabla\sigma = \text{sig}(\sigma) \nabla.$$

Sea $\tau \in \mathcal{S}_n$, entonces

$$\underbrace{\nabla\sigma \circ \tau}_{\text{sig}(\sigma \circ \tau) \nabla} = \text{sig}(\sigma) \nabla\tau = \text{sig}(\sigma) \text{sig}(\tau) \nabla.$$

Definimos,

$$\begin{aligned}\text{sig} : \mathcal{S}_n &\rightarrow \{-1, 1\} \\ \sigma &\rightarrow \text{sig}(\sigma).\end{aligned}$$

¹También se corresponde con el número de trasposiciones en las que se puede componer σ .

Proposición 3.3. La trasposición $(1, 2)$ tiene signo negativo.

Demostración. Tenemos que

$$\nabla(1, 2) = (x_2 - x_1)(x_2 - x_3) \cdots (x_2 - x_n)(x_1 - x_3) \cdots (x_1 - x_n) \cdots (x_{n-1} - x_n).$$

Como podemos ver respecto a la primera definición de ∇ , tenemos que todo es igual menos el primer factor, que es de signo opuesto. Así, $\text{sig}(1, 2) = -1$. \square

Proposición 3.4. La trasposición $(1, a)$ es negativa para $a \geq 2$.

Demostración. Tenemos que $(1, a) = (2, a) \circ (1, 2) \circ (2, a)$.

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow a \\ 2 &\rightarrow a \rightarrow a \rightarrow 2 \\ a &\rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 1. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\text{sig}(1, a) = \text{sig}(2, a)(-1)(\text{sig}(2, a)) = (\text{sig}(2, a))^2(-1) = -1.$$

\square

Proposición 3.5. $\text{sig}(a, b) = -1$.

Demostración. Tenemos que $(a, b) = (1, b) \circ (1, a) \circ (1, b)$. Así, $a \rightarrow b$ y $b \rightarrow a$, por lo que

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow b \rightarrow b \rightarrow b \\ a &\rightarrow a \rightarrow 1 \rightarrow b \\ b &\rightarrow 1 \rightarrow a \rightarrow a. \end{aligned}$$

Entonces, $\text{sig}((a, b)) = \text{sig}(1, b)^2 \cdot \text{sig}(1, a) = -1$. \square

Proposición 3.6. $\text{sig}((a_1, \dots, a_r)) = (-1)^{r-1}$.

Demostración. Tenemos que

$$(a_1, a_r) \circ (a_1 a_{r-1}) \cdots (a_1 a_3)(a_1 a_2).$$

De esta manera,

$$\begin{aligned} a_1 &\rightarrow a_2 \rightarrow a_2 \rightarrow \cdots \rightarrow a_2 \rightarrow a_2 \\ a_2 &\rightarrow a_1 \rightarrow a_3 \rightarrow \cdots \rightarrow a_3 \rightarrow a_3 \\ &\vdots \\ a_{r-1} &\rightarrow a_{r-1} \rightarrow a_{r-1} \rightarrow \cdots \rightarrow a_1 \rightarrow a_r \\ a_r &\rightarrow a_{r-1} \rightarrow a_r \rightarrow \cdots \rightarrow a_r \rightarrow a_r. \end{aligned}$$

\square

Ejemplo 3.4. Sea

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 10 & 9 & 7 & 2 & 1 & 3 & 8 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} = (1, 10, 5) \circ (2, 9, 6, 3, 7, 8, 4).$$

Por tanto,

$$\text{sig}(\sigma) = \text{sig}(1, 10, 5) \cdot \text{sig}(2, 9, 6, 3, 7, 8, 4) = (-1)^2 \cdot (-1)^6 = 1.$$

3.4. Estructura de álgebra

Sean $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$, $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\}$ y $\{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_p\}$ bases de V , V' y V'' respectivamente. Si $f \in \text{Hom}(V, V')$, tenemos que

$$\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}(f) = \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m & \cdots & a_n^m \end{pmatrix} = A,$$

donde $f(\vec{u}_i) = a_i^1 \vec{v}_1 + \cdots + a_i^m \vec{v}_m$. Similarmente, si $g \in \text{Hom}(V, V')$,

$$\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}(g) = \begin{pmatrix} b_1^1 & \cdots & b_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ b_1^m & \cdots & b_n^m \end{pmatrix} = B.$$

Recordamos que

$$A + B = \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}(f + g) = \begin{pmatrix} a_1^1 + b_1^1 & \cdots & a_n^1 + b_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m + b_1^m & \cdots & a_n^m + b_n^m \end{pmatrix}.$$

Similarmente, si $a \in \mathbb{K}$,

$$a \cdot A = \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}(a \cdot f) = \begin{pmatrix} aa_1^1 & \cdots & aa_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ aa_1^m & \cdots & aa_n^m \end{pmatrix}.$$

Proposición 3.7. El producto de matrices es distributivo por la izquierda y por la derecha.

Si $f \in \text{Hom}(V, V')$ y $g \in \text{Hom}(V', V'')$, tenemos que $\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}(f) = A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, $\mathcal{M}_{\{\vec{v}_j\}\{\vec{w}_k\}}(g) = B \in \mathcal{M}_{p \times m}(\mathbb{K})$. Definíamos el producto de matrices de la siguiente forma,

$$B \cdot A = \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{w}_k\}}(g \circ f).$$

Si $f \in \text{Hom}(V, V')$, $g \in \text{Hom}(V', V'')$ y $h \in \text{Hom}(V'', V''')$, tenemos que

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Así, como $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p \times m}(\mathbb{K})$ y $C \in \mathcal{M}_{q \times p}$, tenemos que el producto de matrices es asociativo:

$$C \cdot (B \cdot A) = (C \cdot B) \cdot A \in \mathcal{M}_{q \times n}(\mathbb{K}).$$

Si $f, g \in \text{Hom}(V, V')$, $h \in \text{Hom}(V', V'')$, tenemos que $\forall \vec{x} \in V$,

$$h \circ (f + g)(\vec{x}) = h \circ (f(\vec{x}) + g(\vec{x})) = h(f(\vec{x})) + h(g(\vec{x})) = (h \circ f + h \circ g)(\vec{x}).$$

Así, $h \circ (f + g) = h \circ f + h \circ g$. Entonces, hemos demostrado que el producto de matrices es distributivo por la izquierda. Entonces, $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{p \times m}(\mathbb{K})$,

$$C \cdot (A + B) = C \cdot A + C \cdot B.$$

Sea $f \in \text{Hom}(V, V')$ y $g, h \in \text{Hom}(V', V'')$. Tenemos que $\forall \vec{x} \in V$,

$$((g + h) \circ f)(\vec{x}) = (g + h)(f(\vec{x})) = g(f(\vec{x})) + h(f(\vec{x})) = g \circ f(\vec{x}) + h \circ f(\vec{x}) = (g \circ f + h \circ f)(\vec{x}).$$

Así, concluimos que $(g + h) \circ f = g \circ f + h \circ f$. Por lo que el producto de matrices es distributivo por la derecha. Es decir, sean $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, $B, C \in \mathcal{M}_{p \times m}(\mathbb{K})$,

$$(B + C) \cdot A = B \cdot A + C \cdot A.$$

Proposición 3.8. El producto de matrices no es conmutativo.

Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ y $B \in \mathcal{M}_{p \times m}(\mathbb{K})$. Entonces $B \cdot A \in \mathcal{M}_{p \times n}(\mathbb{K})$, pero $A \cdot B$ no está definido. Si $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$, tenemos que $A \cdot B, B \cdot A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$, pero no tienen por qué ser iguales. En efecto, sean $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Entonces

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposición 3.9. Existe un elemento identidad en el producto de matrices

Tenemos que Observando las imágenes, tenemos que



$$A \cdot I_{n \times n} = A \quad \text{y} \quad I_{m \times m} A = A.$$

Entonces, si consideramos la aplicación

$$id_V : V_{\{\vec{u}_i\}} \rightarrow V_{\{\vec{u}_i\}},$$

tal que $\forall i = 1, \dots, n$, $id_V(\vec{u}_i) = \vec{u}_i$, tenemos que su matriz será

$$\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{u}_i\}}(id_V) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = I_{n \times n}.$$

Figura 3.1: Matriz inversa respecto a V Figura 3.2: Matriz inversa respecto a V'

Consideremos la función,

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{u}_i\}} : \text{End}(V) &\rightarrow \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K}) \\ f &\rightarrow \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{u}_i\}}(f).\end{aligned}$$

Proposición 3.10. Por lo demostrado anteriormente, tenemos que $(\text{End}(V), +, \cdot_{\mathbb{K}})$ y $(\mathcal{M}_{n \times n}, +, \cdot_{\mathbb{K}})$ son \mathbb{K} -espacios vectoriales. Similarmente, $(\text{End}(V), +, \circ)$ y $(\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ son anillos con unidad.

Definición 3.5. Diremos que $\text{End}(V)$ y $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ son **álgebras** con unidad.

Tenemos que

$$\text{Aut}(V) = \{f \in \text{End}(V) : f \text{ invertible}\} = \{f \in \text{End}(V) : \exists f^{-1}\}.$$

Así, $(\text{Aut}(V), \cdot)$ es un grupo. En general, la suma de automorfismos no es automorfismo. Por ejemplo, $id_V - id_V = 0 \notin \text{Aut}(V)$. Definimos

$$\text{GL}_n(\mathbb{K}) = \{A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K}) : \exists A^{-1}\}.$$

Para estudiar este conjunto, introduciremos la noción de determinante.

3.5. Determinantes

Definición 3.6. Una **r -forma multilineal** definida en V es una aplicación $t : \underbrace{V \times V \cdots \times V}_{r \text{ veces}} \rightarrow \mathbb{K}$ tal que

(a) $\forall i = 1, \dots, r, \forall \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r, \vec{x}'_i \in V,$

$$t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i + \vec{x}'_i, \dots, \vec{x}_r) = t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r) + t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}'_i, \dots, \vec{x}_r).$$

(b) $\forall i = 1, \dots, r, \forall \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r \in V, \forall a \in \mathbb{K},$

$$t(x_1, \dots, a\vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r) = at(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r).$$

Definición 3.7. Una r -forma multilineal es **alternada** si $\forall \sigma \in \mathcal{S}_r,$

$$t(\vec{x}_{\sigma(1)}, \dots, \vec{x}_{\sigma(r)}) = \text{sig}(\sigma) t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r), \forall \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r \in V.$$

Proposición 3.11. Si t es una r -forma multilinear, $\forall \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r \in V$,

$$t(\vec{x}_1, \dots, \vec{0}, \dots, \vec{x}_r) = 0.$$

Demostración. Tenemos que $\vec{0} = 0 \cdot \vec{x}_i$, así,

$$t(\vec{x}_1, \dots, \vec{0}, \dots, \vec{x}_r) = 0 \cdot t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r) = 0.$$

□

Proposición 3.12. Sea t una r -forma multilinear alternada. Entonces $\forall \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r \in V$,

$$t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_r) = -t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r).$$

Demostración. Tenemos que $\text{sig}(i, j) = -1$.

□

Proposición 3.13. Si $\vec{x}_i = \vec{x}_j$ y t es una forma multilinear alternada,

$$t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_r) = 0, \quad i \neq j.$$

Demostración. Tenemos que

$$t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_r) = -t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_r).$$

Esto implica que $t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_r) = 0$.

□

Proposición 3.14.

$$t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, a\vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r) = 0.$$

Demostración. Por la proposición anterior,

$$t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, a\vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r) = at(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r) = a \cdot 0 = 0.$$

□

Proposición 3.15.

$$t\left(\vec{x}_1, \dots, \sum_{j=1}^r a^j \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_r\right) = 0, \quad j \neq i.$$

Demostración. Tenemos que

$$\sum_{j=1}^r a^j t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_r) = 0.$$

□

Proposición 3.16.

$$t \left(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i + \sum_{j=1}^r a^j \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_r \right) = t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r), \quad j \neq i.$$

Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V , t multilinear alternada

$$\begin{aligned} \vec{x}_1 &= a_1^1 \vec{u}_1 + \dots + a_1^n \vec{u}_n = \sum_{j=1}^n a_1^j \vec{u}_j \\ &\vdots \\ \vec{x}_i &= a_i^1 \vec{u}_1 + \dots + a_i^n \vec{u}_n = \sum_{j=1}^n a_i^j \vec{u}_j \\ &\vdots \\ \vec{x}_r &= a_r^1 \vec{u}_1 + \dots + a_r^n \vec{u}_n = \sum_{j=1}^n a_r^j \vec{u}_j. \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r) &= t \left(\sum_{j=1}^n a_1^j \vec{u}_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_r^j \vec{u}_j \right) \\ &= \sum_{(j_1, \dots, j_r)} a_1^{j_1} \dots a_r^{j_r} t(\vec{u}_{j_1}, \dots, \vec{u}_{j_r}). \end{aligned}$$

Se trata de r -variaciones con repetición. Tenemos que si $j_i = j_h$, entonces el término $t(\vec{u}_{j_1}, \dots, \vec{u}_{j_r})$ se va a anular, por lo que realmente se trata de variaciones n -arias sin repetición. Sea $\dim(V) = n$ y sea t una n -forma multilinear alternada. Si $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\} \subset V$,

$$(\vec{u}_1 \quad \dots \quad \vec{u}_n) \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \dots & a_n^n \end{pmatrix} = (\vec{x}_1 \quad \dots \quad \vec{x}_n).$$

Son variaciones n -arias sin repetición de $(1, 2, \dots, n)$.

$$\begin{aligned} t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} a_1^{\sigma(1)} a_2^{\sigma(2)} \dots a_n^{\sigma(n)} t(\vec{u}_{\sigma(1)}, \dots, \vec{u}_{\sigma(n)}) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} a_1^{\sigma(1)} \dots a_n^{\sigma(n)} \text{sig}(\sigma) t(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n). \end{aligned}$$

Definición 3.8 (Determinante). Si $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$, el determinante de $A_{\sigma \in \mathcal{S}_n}$ es

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \text{sig}(\sigma) a_1^{\sigma(1)} \cdots a_n^{\sigma(n)}.$$

Definición 3.9 (Traspuesta). Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, llamaremos **traspuesta** de A a la matriz $A^t \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$ que tiene por filas las columnas de A .

Teorema 3.5.

$$\det A^t = \det A.$$

Demostración. Si $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$, entonces

$$\det A^t = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \text{sig}(\sigma) a_{\sigma(1)}^1 \cdots a_{\sigma(n)}^n = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \text{sig}(\sigma^{-1}) a_1^{\sigma^{-1}(1)} \cdots a_n^{\sigma^{-1}(n)} = \sum_{\Pi \in \mathcal{S}_n} \text{sig}(\Pi) a_1^{\Pi(1)} \cdots a_n^{\Pi(n)} = \det A.$$

□

Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V tal que $t(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n) = 1$. Entonces, $t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) = \det A$ y

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_1 & \cdots & \vec{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{u}_1 & \cdots & \vec{u}_n \end{pmatrix} A.$$

Observación 3.1.

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_i^1 + b_i^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_i^n + b_i^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} &= t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i + \vec{y}_i, \dots, \vec{x}_n) \\ &= t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_n) + t(\vec{x}_1, \dots, \vec{y}_i, \dots, \vec{x}_n) \\ &= \det \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_i^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_i^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & b_i^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^n & \cdots & b_i^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Observación 3.2.

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & aa_i^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^n & \cdots & aa_1^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} &= t(\vec{x}_1, \dots, a\vec{x}_i, \dots, \vec{x}_n) \\ &= at(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_n) \\ &= a \det \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_i^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_1^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Observación 3.3. En el caso anterior, si $a = 0$, el determinante de la matriz es 0.

Observación 3.4.

$$\det \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_j^1 & \cdots & a_i^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_j^n & \cdots & a_i^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} = t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_n) = -t(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_n).$$

Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K}).$$

Tenemos que

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \text{sig}(\sigma) a_1^{\sigma(1)} \cdots a_n^{\sigma(n)}.$$

Vamos a ver como calcular el determinante de una matriz aislando una única fila o columna. Seleccionamos el elemento a_1^1 y calculamos la suma de todos los sumandos donde interviene a_1^1 :

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n, \sigma(1)=1} \text{sig}(\sigma) a_1^1 a_2^{\sigma(2)} \cdots a_n^{\sigma(n)} = \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_{n-1}} \text{sig}(\sigma) a_2^{\sigma(2)} \cdots a_n^{\sigma(n)} \right) \cdot a_1^1 = a_1^1 \det \begin{pmatrix} a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_2^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix}.$$

Este mismo procedimiento se puede hacer para un elemento cualquiera a_j^i .

Definición 3.10 (Adjunto). El menor complementario α_j^i es el determinante de la matriz $(n-1) \times (n-1)$ que se obtiene A suprimiendo la fila i y la columna j , y llamaremos **adjunto** a $A_j^i = (-1)^{i+j} \alpha_j^i$.

Si cogemos la fila j , vamos a tener que

$$\det(A) = a_j^1 A_j^1 + a_j^2 A_j^2 + \cdots + a_j^n A_j^n = a_1^i A_1^i + a_2^i A_2^i + \cdots + a_n^i A_n^i.$$

Proposición 3.17. Si $i \neq k$ tenemos que

$$a_i^1 A_k^1 + a_i^2 A_k^2 + \cdots + a_i^n A_k^n = 0.$$

Similarmente, si $j \neq k$,

$$a_1^j A_1^k + a_2^j A_2^k + \cdots + a_n^j A_n^k = 0.$$

Demostración. Sea \bar{A} una matriz con las mismas columnas que A , salvo la columna k , donde vuelve a aparecer la columna i . Claramente tenemos que $\det(\bar{A}) = 0$. Ahora, si desarrollamos \bar{A} por los términos de la columna k , tenemos que

$$0 = \det(\bar{A}) = \sum_{j=1}^n \bar{a}_k^j \bar{A}_k^j.$$

Sin embargo, tal y como hemos definido \bar{A} , tenemos que $\bar{a}_k^j = a_i^j$ y $\bar{A}_k^j = A_k^j$. \square

Tenemos que

$$(\vec{u}_1 \quad \cdots \quad \vec{u}_n) = (\vec{u}_1 \quad \cdots \quad \vec{u}_n) I_{n \times n}.$$

Por tanto, tenemos que

$$1 = t(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n) = \underbrace{t(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)}_1 \det(I_{n \times n}) \Rightarrow \det(I_{n \times n}) = 1.$$

Recordamos que $\text{Aut}(V) = \{f \in \text{End}(V) : \exists f^{-1}\}$ y $\text{GL}(n, \mathbb{K}) = \{A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K}) : \exists A^{-1}\}$.

Teorema 3.6. Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$. Entonces, $A \in \text{GL}(n, \mathbb{K}) \iff \det(A) \neq 0$.

Demostración. (i) Si $A \in \text{GL}(n, \mathbb{K})$, $\exists A^{-1}$ tal que $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_{n \times n}$. Así,

$$1 = \det(I_{n \times n}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(A) \cdot \det(A^{-1}).$$

Por tanto, tenemos que si $\det(A) \neq 0$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \neq 0$. Estrictamente tenemos que tener que $\det(A), \det(A^{-1}) \neq 0$.

(ii) Si $\det(A) \neq 0$. Vamos a comprobar que $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{Adj}(A))^t$. Tenemos que

$$\begin{pmatrix} \frac{A_1^1}{|A|} & \cdots & \frac{A_1^n}{|A|} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{A_n^1}{|A|} & \cdots & \frac{A_n^n}{|A|} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} A_1^1 a_1^1 + \cdots + a_1^n A_1^n & \cdots & A_n^1 a_1^1 + \cdots + A_1^n a_n^n \\ \vdots & & \vdots \\ \cdots & A_j^1 a_j^1 + \cdots + A_j^n a_j^n & \cdots \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix}.$$

Tenemos que $\forall i, j = 1, \dots, n$ el coeficiente de la fila j y la columna i de la matriz producto. Tenemos que

$$\frac{\sum_{k=1}^n A_k^i a_k^j}{|A|} = \begin{cases} \frac{\det(A)}{\det(A)} = 1, & \text{si } j = i \\ 0, & \text{si } j \neq i \end{cases}.$$

Es decir, el producto de las dos matrices anteriores es la identidad. \square

3.6. Sistemas de Cramer

Definición 3.11 (Sistemas de Cramer). Un **sistema de Cramer** es un sistema de ecuaciones lineales

$$(S) \begin{cases} a_1^1 x^1 + \cdots + a_n^1 x^n = b^1 \\ \vdots \\ a_1^n x^1 + \cdots + a_n^n x^n = b^n \end{cases} \quad \text{donde } a_i^j \in \mathbb{K}, b^j \in \mathbb{K}, \forall i, j = 1, \dots, n.$$

Además,

$$\det \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} \neq 0.$$

Teorema 3.7. Todo sistema de cramer tiene solución única.

Demostración. Primero vemos la **unicidad**. Si (x_0^1, \dots, x_0^n) es solución de (S) ,

$$(S) \begin{cases} a_1^1 x_0^1 + \cdots + a_n^1 x_0^n = b^1 \\ \vdots \\ a_1^n x_0^1 + \cdots + a_n^n x_0^n = b^n \end{cases} \quad \text{donde } a_i^j \in \mathbb{K}, b^j \in \mathbb{K}, \forall i, j = 1, \dots, n.$$

Entonces,

$$\begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0^1 \\ \vdots \\ x_0^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b^1 \\ \vdots \\ b^n \end{pmatrix}.$$

Como $\det(A) \neq 0$, tenemos que $\exists! A^{-1}$. Entonces,

$$A^{-1} A \begin{pmatrix} x_0^1 \\ \vdots \\ x_0^n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b^1 \\ \vdots \\ b^n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_0^1 \\ \vdots \\ x_0^n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b^1 \\ \vdots \\ b^n \end{pmatrix}.$$

Ahora vamos a ver la **existencia**. Vamos a ver que el producto $A^{-1} \begin{pmatrix} b^1 \\ \vdots \\ b^n \end{pmatrix}$ es solución de S .

$$A^{-1} \begin{pmatrix} b^1 \\ \vdots \\ b^n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} A_1^1 & \cdots & A_1^n \\ \vdots & & \vdots \\ A_n^1 & \cdots & A_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b^1 \\ \vdots \\ b^n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} A_1^1 b^1 + \cdots + A_1^n b^n \\ \vdots \\ A_n^1 b^1 + \cdots + A_n^n b^n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\det \begin{pmatrix} b^1 & a_2^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b^n & a_2^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix}}{\det(A)} \\ \vdots \\ \frac{\det \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_{i-1}^1 & b^1 & a_{i+1}^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_{i-1}^n & b^n & a_{i+1}^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix}}{\det(A)} \\ \vdots \\ \frac{\det \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \cdots & b^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \cdots & b^n \end{pmatrix}}{\det(A)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{A_1^1}{|A|} & \cdots & \frac{A_1^n}{|A|} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{A_n^1}{|A|} & \cdots & \frac{A_n^n}{|A|} \end{pmatrix}.$$

□

Definición 3.12 (Menor). Un **menor** de orden r de A , $r \leq \min\{m, n\}$, es el determinante de una matriz $r \times r$ que se obtiene de A suprimiendo $(m - r)$ filas y $(n - r)$ columnas.

Definición 3.13 (Rango). Decimos que el **rango** de A es r si existe un menor de orden r de A no nulo y todos los de orden $r + 1$ son nulos.

Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de un \mathbb{K} -espacio vectorial V y sean $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m\} \subset V$, tales que

$$\begin{aligned} \vec{x}_1 &= a_1^1 \vec{u}_1 + \cdots + a_1^n \vec{u}_n \\ &\vdots \\ \vec{x}_m &= a_m^1 \vec{u}_1 + \cdots + a_m^n \vec{u}_n. \end{aligned}$$

Entonces, en función de estos valores definimos,

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_m^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_m^n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{K}).$$

Teorema 3.8.

$$\text{ran}(A) = \dim(L(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_m\})).$$

Demostración. Sea $r = \text{ran}(A)$ y $\begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r \end{vmatrix} \neq 0$.

- (1) Vamos a ver que $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r\}$ son linealmente independientes.

Sean $a^1, \dots, a^r \in \mathbb{K}$. Si

$$a^1 \vec{x}_1 + \cdots + a^r \vec{x}_r = \vec{0}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} & a^1 (a_1^1 \vec{u}_1 + \cdots + a_1^r \vec{u}_r + \cdots + a_1^n \vec{u}_n) + \cdots + a^r (a_r^1 \vec{u}_1 + \cdots + a_r^r \vec{u}_r + \cdots + a_r^n \vec{u}_n) \\ &= (a^1 a_1^1 + \cdots + a^r a_r^1) \vec{u}_1 + \cdots + (a^1 a_1^r + \cdots + a^r a_r^r) \vec{u}_r + \cdots + (a^1 a_1^n + \cdots + a^r a_r^n) \vec{u}_n = \vec{0}. \end{aligned}$$

Así, tenemos que

$$a^1 a_1^1 + \cdots + a^r a_r^1 = 0$$

$$\vdots$$

$$a^1 a_1^r + \cdots + a^r a_r^r = 0$$

$$\vdots$$

$$a^1 a_1^n + \cdots + a^r a_r^n = 0.$$

Entonces, (a^1, \dots, a^r) es solución del sistema

$$\begin{cases} a_1^1 x^1 + \cdots + a_r^1 x^r = 0 \\ \vdots \\ a_1^r x^1 + \cdots + a_r^r x^r = 0 \end{cases}.$$

Como es un sistema de Cramer homogéneo, tenemos que $a^1 = \cdots = a^r = 0$.

- (2) Vamos a ver que $\forall i = 1, \dots, m - r$, \vec{x}_{r+i} es linealmente dependiente de $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r\}$.

Sea $i = 1, \dots, m - r$, queremos ver que $\vec{x}_{r+i} \in L(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r\})$. Queremos llegar al siguiente sistema, respecto a las coordenadas de \vec{x}_{r+i} , que es un sistema de Cramer:

$$(S) = \begin{cases} a_1^1 x^1 + \cdots + a_r^1 x^r = x_{r+i}^1 \\ \vdots \\ a_1^r x^1 + \cdots + a_r^r x^r = x_{r+i}^r \end{cases}.$$

Al ser un sistema de Cramer, tenemos que $\exists! (a^1, \dots, a^r)$ solución de S . Tenemos que

$$\begin{aligned}
 0 &= \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 & a_{r+i}^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r & a_{r+i}^r \\ a_1^{r+j} & \cdots & a_r^{r+j} & a_{r+i}^{r+j} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 & & a_{r+i}^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r & & a_{r+i}^r \\ 0 & \cdots & 0 & a_{r+i}^{r+j} - a^1 a_{r+i}^1 - \cdots - a^r a_{r+i}^r \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r \end{vmatrix} \left(a_{r+i}^{r+j} - a^1 a_{r+i}^1 - \cdots - a^r a_{r+i}^r \right)
 \end{aligned}$$

Entonces,

$$a_{r+i}^{r+j} = a^1 a_{r+i}^1 + \cdots + a^r a_{r+i}^r.$$

□

Dado el sistema

$$(S) \begin{cases} a_1^1 x^1 + \cdots + a_n^1 x^n = b^1 \\ \vdots \\ a_1^m x^1 + \cdots + a_n^m x^n = b^m \end{cases}$$

Definimos las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m & \cdots & a_n^m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}), \quad B = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \cdots & a_n^1 & b^1 \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ a_1^m & a_2^m & \cdots & a_n^m & b^m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m \times (n+1)}(\mathbb{K}).$$

Tenemos que $\text{ran}(A) \leq \text{ran}(B) \leq \text{ran}(A) + 1$.

Teorema 3.9 (Teorema de Rouché-Fröbenius). (S) tiene solución si y solo si $\text{ran}(A) = \text{ran}(B)$.

Demostración. (i) Si el sistema (S) tiene solución, existe $(x_0^1, \dots, x_0^n) \in \mathbb{K}^n$ tal que

$$\begin{cases} a_1^1 x_0^1 + \cdots + a_n^1 x_0^n = b^1 \\ \vdots \\ a_1^m x_0^1 + \cdots + a_n^m x_0^n = b^m \end{cases}$$

Como la última columna de la matriz B depende linealmente de A , tenemos que $\text{ran}(A) = \text{ran}(B)$.

(ii) Supongamos que $\text{ran}(A) = \text{ran}(B) = r$ y que $\begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r \end{vmatrix} \neq 0$. Consideramos el sistema (P) el sistema en el que intervienen las primeras r ecuaciones:

$$(P) \begin{cases} a_1^1 x^1 + \cdots + a_r^1 x^r + \cdots + a_n^1 x^n = b^1 \\ \vdots \\ a_1^r x^1 + \cdots + a_r^r x^r + \cdots + a_n^r x^n = b^r \end{cases}.$$

Tenemos que toda solución de (S) es solución de (P) . Vamos a ver que toda solución de (P) es solución de (S) . Sea $(x_0^1, \dots, x_0^r, \dots, x_0^n)$ solución de (P) . Entonces,

$$\begin{aligned} a_1^1 x_0^1 + \cdots + a_r^1 x_0^r + \cdots + a_n^1 x_0^n &= b^1 \\ &\vdots \\ a_1^r x_0^1 + \cdots + a_r^r x_0^r + \cdots + a_n^r x_0^n &= b^r. \end{aligned}$$

Si $i > 1, \dots, m - r$, queremos ver que

$$a_1^{r+i} x_0^1 + \cdots + a_r^{r+i} x_0^r + \cdots + a_n^{r+i} x_0^n = b^{r+i}.$$

Tenemos que existen $l_1, \dots, l_r \in \mathbb{K}$ tales que

$$\begin{aligned} l_1 a_1^1 + \cdots + l_r a_1^r &= a_1^{r+i} \\ &\vdots \\ l_1 a_r^1 + \cdots + l_r a_r^r &= a_r^{r+i} \\ &\vdots \\ l_1 a_n^1 + \cdots + l_r a_n^r &= a_n^{r+i} \\ l_1 b^1 + \cdots + l_r b^r &= b^{r+i} \end{aligned}.$$

Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned} a_1^{r+i} x_0^1 + \cdots + a_r^{r+i} x_0^r + \cdots + a_n^{r+i} x_0^n &= (l_1 a_1^1 + \cdots + l_r a_1^r) x_0^1 + \cdots + (l_1 a_n^1 + \cdots + l_r a_n^r) x_0^n \\ &= l_1 (a_1^1 x_0^1 + \cdots + a_n^1 x_0^n) + \cdots + l_r (a_1^r x_0^1 + \cdots + a_n^r x_0^n) \\ &= l_1 b^1 + \cdots + l_r b^r = b^{r+i}. \end{aligned}$$

Entonces, tenemos que el sistema (P')

$$(P') \begin{cases} a_1^1 x^1 + \cdots + a_r^1 x^r = b^1 - a_{r+1}^1 x^{r+1} - \cdots - a_n^1 x^n \\ \vdots \\ a_1^r x^1 + \cdots + a_r^r x^r = b^r - a_{r+1}^r x^{r+1} - \cdots - a_n^r x^n \end{cases}.$$

Claramente, el sistema (P') es equivalente al sistema (P) . Si fijo $(x_0^{r+1}, \dots, x_0^n) \in \mathbb{K}^{n-r}$, tenemos que el sistema

$$(P_1) \begin{cases} a_1^1 x^1 + \dots + a_r^1 x^r = b^1 - a_{r+1}^1 x_0^{r+1} - \dots - a_n^1 x_0^n \\ \vdots \\ a_1^r x^1 + \dots + a_r^r x^r = b^r - a_{r+1}^r x_0^{r+1} - \dots - a_n^r x_0^n \end{cases}.$$

Al tratarse de un sistema de Cramer, existe una única solución (x_0^1, \dots, x_0^r) de (P_1) . Entonces, $(x_0^1, \dots, x_0^r, x_0^{r+1}, \dots, x_0^n)$ es solución de (P) . Si $(y_0^{r+1}, \dots, y_0^n) \in \mathbb{K}^{n-r}$. Consideremos el sistema (P_2) ,

$$(P_2) \begin{cases} a_1^1 x^1 + \dots + a_r^1 x^r = b^1 - a_{r+1}^1 y_0^{r+1} - \dots - a_n^1 y_0^n \\ \vdots \\ a_1^r x^1 + \dots + a_r^r x^r = b^r - a_{r+1}^r y_0^{r+1} - \dots - a_n^r y_0^n \end{cases}.$$

Como es sistema de Cramer, $\exists!$ (y_0^1, \dots, y_0^r) solución de (P_2) . Por tanto, $(y_0^1, \dots, y_0^r, y_0^{r+1}, \dots, y_0^n)$ es solución de (P) . □

Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ una base de V . Sea $L \in \mathcal{L}(V)$ tal que $\dim(L) = r$ y sea $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r\}$ una base de L . Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 &= a_1^1 \vec{u}_1 + \dots + a_n^1 \vec{u}_n \\ &\vdots \\ \vec{v}_r &= a_r^1 \vec{u}_1 + \dots + a_n^r \vec{u}_n. \end{aligned}$$

Entonces, si $\vec{x} \in V$ con $\vec{x} = x^1 \vec{u}_1 + \dots + x^n \vec{u}_n$. Tenemos que $\vec{x} \in L$ si y solo si existen $\lambda^1, \dots, \lambda^r \in \mathbb{K}$ tales que $\vec{x} = \lambda^1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda^r \vec{v}_r$ (ecuaciones paramétricas). Esto es, si y solo si

$$\begin{aligned} x^1 \vec{u}_1 + \dots + x^n \vec{u}_n &= \lambda^1 (a_1^1 \vec{u}_1 + \dots + a_n^1 \vec{u}_n) + \dots + \lambda^r (a_r^1 \vec{u}_1 + \dots + a_n^r \vec{u}_n) \\ &= (\lambda^1 a_1^1 + \dots + \lambda^r a_r^1) \vec{u}_1 + \dots + (\lambda^1 a_1^n + \dots + \lambda^r a_r^n) \vec{u}_n. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} x^1 &= \lambda^1 a_1^1 + \dots + \lambda^r a_r^1 \\ &\vdots \\ x^n &= \lambda^1 a_1^n + \dots + \lambda^r a_r^n. \end{aligned}$$

Es decir, si y solo si el sistema anterior tiene solución. Es decir,

$$r = \text{ran} \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \dots & a_n^n \end{pmatrix} = \text{ran} \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_n^1 & x^1 \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_1^n & \dots & a_n^n & x^n \end{pmatrix}.$$

Así obtenemos las ecuaciones implícitas de L . Supongamos que

$$\begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r \end{vmatrix} = \nabla \neq 0.$$

Entonces, tenemos que los menores de orden $r+1$ de la matriz de coeficientes que contienen al menor anterior son nulos.

$$\begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 & x^1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r & x^r \\ a_1^{r+1} & \cdots & a_r^{r+1} & x^{r+1} \end{vmatrix} = 0.$$

Similarmente, $\forall i = 1, \dots, n-r$,

$$\begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 & x^1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r & x^r \\ a_1^{r+i} & \cdots & a_r^{r+i} & x^{r+i} \end{vmatrix} = 0.$$

Si desarrollamos este determinante por adjuntos:

$$x^1 b_1^1 + x^2 b_2^1 + \cdots + x^r b_r^1 x^{r+1} \nabla = 0.$$

Tenemos que $\forall i = 1, \dots, n-r$,

$$x^1 b_1^1 + \cdots + x^r b_r^1 + x^{r+i} \nabla = 0.$$

Tenemos $n-r$ ecuaciones donde la matriz de coeficientes será

$$\text{ran} \begin{pmatrix} b_1^1 & \cdots & b_r^1 & \nabla & 0 & \cdots & 0 \\ b_1^2 & \cdots & b_r^2 & 0 & \nabla & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_1^{n-r} & \cdots & b_r^{n-r} & 0 & \cdots & 0 & \nabla \end{pmatrix} = n-r.$$

Con esto hemos demostrado que todo subespacio vectorial es el conjunto de las soluciones de un sistema homogéneo. Ahora consideremos el recíproco. Consideremos el sistema homogéneo (H) :

$$(H) \begin{cases} c_1^1 x^1 + \cdots + c_n^1 x^n = 0 \\ \vdots \\ c_1^{n-r} x^1 + \cdots + c_n^{n-r} x^n = 0 \end{cases}.$$

Sea $L = \{x_0^1 \vec{u}_1 + \cdots + x_0^n \vec{u}_n : (x_0^1, \dots, x_0^n) \text{ solución de } (H)\} \in \mathcal{L}(V)$ tales que $\dim(L) = r$. Supongamos que

$$\text{ran} \begin{pmatrix} c_1^1 & \cdots & c_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ c_1^{n-r} & \cdots & c_n^{n-r} \end{pmatrix} = n-r.$$

En la introducción está demostrado que L es un subespacio vectorial. Supongamos que

$$\begin{vmatrix} c_1^1 & \cdots & c_{n-r}^1 \\ \vdots & & \vdots \\ c_1^{n-r} & \cdots & c_{n-r}^{n-r} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Entonces

$$\begin{cases} c_1^1 x^1 + \cdots + c_{n-r}^1 x^{n-r} = -c_{(n-r)+1}^1 x^{(n-r)+1} - \cdots - c_n^1 x^n \\ \vdots \\ c_1^{n-r} x^1 + \cdots + c_{n-r}^{n-r} x^{n-r} = -c_{(n-r)+1}^{n-r} x^{(n-r)+1} - \cdots - c_n^{n-r} x^n \end{cases}.$$

Supongamos que las siguientes tuplas son soluciones de (H) :

$$\begin{cases} (d_1^1, \dots, d_1^{n-r}, 1, 0, \dots, 0) \\ (d_2^1, \dots, d_2^{n-r}, 0, 1, \dots, 0) \\ \vdots \\ (d_r^1, \dots, d_r^{n-r}, 0, \dots, 0, 1) \end{cases}.$$

Sean

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 &= d_1^1 \vec{u}_1 + \cdots + d_1^{n-r} \vec{u}_{n-r} + \vec{u}_{n-r+1} \in L \\ &\vdots \\ \vec{v}_r &= d_r^1 \vec{u}_1 + \cdots + d_r^{n-r} \vec{u}_{n-r} + \vec{u}_{n-r+1} \in L \end{aligned}$$

Entonces,

$$\vec{x}_0 = x_0^1 \vec{u}_1 + \cdots + x_0^{n-r} \vec{u}_{n-r} + \cdots + x_0^n \vec{u}_n \in L$$

$$\vec{z}_0 = \vec{x}_0 - x_0^{n-r+1} \vec{x}_1 - x_0^{n-r+2} \vec{v}_2 - \cdots - x_0^n \vec{v}_r = z_0^1 \vec{u}_1 + \cdots + z_0^{n-r} \vec{u}_{n-r} + 0 \cdot \vec{u}_{n-r+1} + \cdots + 0 \cdot \vec{u}_n \in L.$$

Entonces tenemos que $(z_0^1, \dots, z_0^{n-r}, 0, \dots, 0)$ son solución de (H) . Entonces, $(z_0^1, \dots, z_0^{n-r})$ es solución del sistema de Cramer.

$$\begin{cases} c_1^1 x^1 + \cdots + c_{n-r}^1 x^{n-r} = 0 \\ \vdots \\ c_1^{n-r} x^1 + \cdots + c_{n-r}^{n-r} x^{n-r} = 0 \end{cases}.$$

Así, $\vec{z}_0 = \vec{0}$ y

$$\vec{x}_0 = x_0^{n-r+1} \vec{v}_1 + x_0^n \vec{v}_r \Rightarrow L = L(\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r\}).$$

Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V y $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r\} \subset V$, donde

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_r^n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n \times r}(\mathbb{K}).$$

Tenemos que $\dim(L(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r\})) = \text{ran}(A)$.

Proposición 3.18.

$$L(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_r\}) = L(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r\}).$$

Proposición 3.19. Sea $a \in \mathbb{K}/\{0\}$,

$$L(\{\vec{x}_1, \dots, a\vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r\}) = L(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r\})$$

Proposición 3.20. Si $a \in \mathbb{K}$,

$$L(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_j + a\vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r\}) = L(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_j, \dots, \vec{x}_i, \dots, \vec{x}_r\}).$$

Si $a_1^1 \neq 0$, a la segunda fila le resto la primera multiplicada por $\frac{a_2^1}{a_1^1}$. Para $i = 2, \dots, n$ a la fila i le resto la primera multiplicada por $\frac{a_i^1}{a_1^1}$.

$$\begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \cdots & a_r^1 \\ 0 & a_2^2 & \cdots & a_r^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & a_2^r & \cdots & a_r^r \end{pmatrix}.$$

Si $a_1^1 = 0$ y $\exists a_1^i \neq 0$, permutamos las filas 1 e i . Supongo por hipótesis de inducción que después de i etapas.

$$\begin{pmatrix} b_1^1 & * & \cdots & * \\ 0 & b_1^2 & \cdots & * \\ 0 & \cdots & b_1^i & * \\ 0 & \cdots & 0 & D \end{pmatrix},$$

donde

$$D = \begin{pmatrix} d_1^1 & \cdots & d_t^1 \\ \vdots & & \vdots \\ d_1^s & \cdots & d_r^t \end{pmatrix}.$$

El método anterior consiste en una forma de calcular el rango de una matriz usando Gauss. La forma de calcular la inversa de una matriz $A \in \text{GL}(n, \mathbb{K})$ consiste en utilizar combinaciones lineales hasta obtener la identidad. Si hacemos las mismas transformaciones con $I_{n \times n}$, obtenemos A^{-1} .

Capítulo 4

Reducción de Endomorfismos

Sea $f : V \rightarrow V'$ lineal. Si $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ y $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\}$ son bases de V y V' , respectivamente, tenemos que $A = \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{v}_j\}}(f) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$. Si $\{\vec{u}'_1, \dots, \vec{u}'_n\}$, $\{\vec{v}'_1, \dots, \vec{v}'_m\}$ son bases de V y V' , respectivamente, con $B = \mathcal{M}_{\{\vec{u}'_i\}\{\vec{v}'_j\}}(f)$, tenemos que

$$\begin{aligned}(\vec{u}'_1 \quad \dots \quad \vec{u}'_n) &= (\vec{u}_1 \quad \dots \quad \vec{u}_n) C, \quad C \in \text{GL}(n, \mathbb{K}) \\ (\vec{v}'_1 \quad \dots \quad \vec{v}'_m) &= (\vec{v}_1 \quad \dots \quad \vec{v}_m) D, \quad D \in \text{GL}(m, \mathbb{K}).\end{aligned}$$

Entonces, tenemos el siguiente diagrama. De aquí se deduce que $f = id_{V'} \circ f \circ id_V$, que es lo mismo que

$$B = D^{-1}AC.$$

Definición 4.1. Dos matrices $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ son equivalentes si existe $C \in \text{GL}(n, \mathbb{K})$, $D \in \text{GL}(m, \mathbb{K})$ tales que $D^{-1}AC = B$.

Observación 4.1. Esta es una relación de equivalencia en el conjunto de matrices $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$. En concreto las matrices equivalentes tienen el mismo rango.

Observación 4.2. Revisar el último ejercicio de aplicaciones lineales.

Observación 4.3. Si $f \in \text{End}(V)$, tenemos que $C = D$, por lo que $B = C^{-1}AC$.

Definición 4.2. Dos matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ son semejantes si existe $C \in \text{GL}(n, \mathbb{K})$ tal que $B = C^{-1}AC$.

Definición 4.3. El vector $\vec{x} \in V$ es un **vector propio** de $f \in \text{End}(V)$ si existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}$. Similarmente, se dice que $\lambda \in \mathbb{K}$ es un **valor propio** de f si $\exists \vec{x} \in V / \{\vec{0}\}$ tal que




Figura 4.1: Semejanza de matrices

$$f(\vec{x}) = \lambda \vec{x}.$$

Si $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$ es base de V formada por vectores propios de f

$$f(\vec{x}_i) = \lambda_i \vec{x}_i.$$

Ejemplo 4.1. No siempre existen los valores propios. Por ejemplo, consideremos la aplicación dada por la matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

A partir de un sistema de ecuaciones obtenemos que $\lambda^2 = -1$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, esta aplicación no tendría valores propios. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, sí que los tendría.

4.1. Polinomios

Definición 4.4. Una **sucesión** definida en \mathbb{K} es una aplicación $a(x) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ tal que $n \rightarrow a_n$. Diremos que $a(x) = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$. Un **polinomio** con coeficientes en \mathbb{K} es una sucesión $a(x) = (a_0, \dots, a_n, \dots)$ tal que existe $a_m \neq 0$ y $a_k = 0, \forall k > m$. Diremos que m es el **grado** del polinomio $a(x)$.

Observación 4.4. Por esta definición, el polinomio $0 = (0, \dots, 0, \dots)$ no tiene grado.

Sea $\mathbb{K}[x] = \{a(x) : a(x) \text{ polinomio con coeficientes en } \mathbb{K}\}$. Así, definimos la suma de polinomios

$$a(x) + b(x) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n, \dots).$$

Observación 4.5. Tenemos que con esta suma, $\mathbb{K}[x]$ es un grupo abeliano.

Ahora definimos el producto de polinomios:

$$a(x) \cdot b(x) = \left(\underbrace{a_0 b_0}_{c_0}, \underbrace{a_1 b_0 + a_0 b_1}_{c_1}, \dots, c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j, \dots \right).$$

Observación 4.6. Tenemos que con este producto, $(\mathbb{K}[x], +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad. La unidad será $(1, 0, \dots, 0, \dots)$.

Observación 4.7. Se deduce fácilmente que

- $\text{grad}(a(x) + b(x)) \leq \max(\text{grad}(a(x)), \text{grad}(b(x)))$
- $\text{grad}(a(x) \cdot b(x)) = \text{grad}(a(x)) + \text{grad}(b(x)).$

Proposición 4.1. A partir de la segunda igualdad tenemos que

- (a) Si $a(x) \cdot b(x) = 0$, $a(x) = 0$ o $b(x) = 0$.
- (b) Si $a(x) \cdot b(x) = a(x) \cdot c(x) \neq 0$, entonces $b(x) = c(x)$.

(c) Los únicos elementos invertibles de $\mathbb{K}[x]$ son los de grado 0.

Podemos definir el producto por escalares:

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K}[x] &\rightarrow \mathbb{K}[x] \\ (a, (a_0, \dots, a_n, \dots)) &\rightarrow (aa_0, \dots, aa_n, \dots). \end{aligned}$$

Observación 4.8. Así, $\mathbb{K}[x]$ es un \mathbb{K} -espacio vectorial.

Esto nos permite escribir

$$\begin{aligned} a(x) &= (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots) \\ &= a_0(1, 0, \dots, 0, \dots) + a_1(0, 1, \dots, 0, \dots) + \dots + a_n(0, \dots, 1, \dots) + \dots \end{aligned}$$

Así, definimos

$$\begin{aligned} x &= (0, 1, \dots, 0, \dots) \\ x^2 &= (0, 0, 1, \dots, 0, \dots) \\ x^3 &= (0, 1, \dots, 0, \dots) \cdot (0, 0, 1, \dots, 0, \dots) = (0, 0, 0, 1, \dots, 0, \dots) \end{aligned}$$

Supongamos que $x^{k-1} = (0, 0, \dots, 1, \dots, 0, \dots)$. Así, para x^k ,

$$x^k = (0, 1, \dots, 0, \dots) \cdot (0, 0, \dots, 1, \dots, 0, \dots).$$

Así, tenemos que si $a(x) \in \mathbb{K}[x]$,

$$a(x) = (a_0, 0, \dots, 0, \dots) + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n.$$

Si a cada $a \in \mathbb{K}$ le hacemos corresponder el polinomio $(a, 0, \dots, 0, \dots)$, obtenemos una aplicación inyectiva $\mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}[x]$ que conserva las operaciones anteriores. Así, podemos sustituir $(a_0, 0, \dots, 0, \dots)$ por a_0 .

Teorema 4.1. Sean $a(x), b(x) \in \mathbb{K}[x] \setminus \{0\}$, entonces $\exists! p(x), r(x) \in \mathbb{K}[x]$ tales que $a(x) = b(x)p(x) + r(x)$. Además, $\text{grad}(r(x)) < \text{grad}(b(x))$ o $r(x) = 0$.

Demostración. Si $\text{grad}(a(x)) < \text{grad}(b(x))$ tomamos $p(x) = 0$ y $r(x) = a(x)$. Supongamos que $\text{grad}(a(x)) \geq \text{grad}(b(x))$, entonces

$$\begin{aligned} a(x) &= a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad a_n \neq 0 \\ b(x) &= b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m, \quad b_m \neq 0. \end{aligned}$$

Tenemos que

$$a(x) - b(x) \frac{a_n}{b_m} (x^{n-m}) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n_1}x^{n_1}, \quad n_1 \geq n.$$

Si $n_1 < m$,

$$a(x) = b(x) \underbrace{\left(\frac{a_n}{b_m} (x^{n-m}) \right)}_{p(x)} + \underbrace{c(x)}_{r(x)}.$$

Si $n_1 \geq m$,

$$c(x) - \frac{c_{n_1}}{b_m} (x^{n_1-m}) = d_0 + d_1x + \cdots + d_{n_2}x^{n_2}, \quad n_2 < n_1 < n.$$

Si $n_2 < m$,

$$a(x) = b(x) \left(\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} + \frac{c_{n_1}}{b_m} x^{n_1-m} \right) + d_{n_2} x^{n_2}.$$

Si $n_2 \geq m$, $n_2 < n_1 < n$ y repetimos el paso anterior. Después de un número finito de pasos, obtendremos un polinomio resto que tenga grado 0 o cuyo grado sea menor que m . Ahora demostramos la unicidad, $a(x) = b(x)p(x) + r(x)$ con $\text{grad}(r(x)) < \text{grad}(b(x))$ o $r(x) = 0$ y $a(x) = b(x)p'(x) + r'(x)$ con $\text{grad}(r'(x)) < \text{grad}(b(x))$ o $r'(x) = 0$. Tenemos que

$$b(x)(p(x) - p'(x)) = r'(x) - r(x).$$

Si $r(x) \neq r'(x)$, entonces $\text{grad}(r(x) - r'(x)) < \text{grad}(b(x))$. Así, $\text{grad}(b(x)(p(x) - p'(x))) < \text{grad}(b(x))$. Sin embargo, tenemos que $\text{grad}(b(x)(p(x) - p'(x))) \geq \text{grad}(b(x))$. Esto es una contradicción, por lo que debe ser que $p(x) = p'(x)$ y $r(x) = r'(x)$. \square

Definición 4.5. Decimos que $p(x)$ es el **cociente** de la división de $a(x)$ entre $b(x)$ y $r(x)$ es el **resto**.

Definición 4.6. Si $r(x) = 0$, decimos que $a(x)$ es múltiplo de $b(x)$ o que $b(x)$ divide a $a(x)$. Esto se escribe $b(x) | a(x)$.

Definición 4.7 (Ideal). Un **ideal** I de $\mathbb{K}[x]$ es un conjunto $I \neq \emptyset$ y $I \subset \mathbb{K}[x]$, que verifica que

(a) Si $a(x), b(x) \in I$, $a(x) + b(x) \in I$.

(b) Si $a(x) \in I$ y $p(x) \in \mathbb{K}[x]$, tenemos que $p(x)a(x) \in I$.

Observación 4.9. Dado $b(x) \in \mathbb{K}[x]$ y sea $(b(x)) = \{p(x)b(x) : p(x) \in \mathbb{K}[x]\}$. Tenemos que este conjunto es un ideal.

Proposición 4.2. Sea $I \subset \mathbb{K}[x]$ un ideal. Entonces, $\exists! b(x) \in I$ mónico, tal que $I = (b(x))$.

Demostración. Si $I = \{0\}$, entonces $(0) = I$. Si $I \neq \{0\}$, sea $b(x) \in I$ un polinomio de menor grado entre los polinomios de I . Tenemos que $(b(x)) \subset I$ por las propiedades del ideal. Si $a(x) \in I$, tenemos que existen $p(x), r(x) \in \mathbb{K}[x]$ tales que

$$a(x) = b(x)p(x) + r(x).$$

Entonces, $r(x) = a(x) - b(x)p(x) \in I$. Como $\text{grad}(r(x)) < \text{grad}(b(x))$ y $r(x) \in I$, tenemos que $r(x) = 0$. Así, tenemos que $I \subset (b(x))$, por lo que tenemos que $I = (b(x))$. \square

Definición 4.8. Se dice que $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ es **mónico** si su coeficiente de mayor grado es 1.

Observación 4.10. (i) $\forall k \in \mathbb{K}/\{0\}, (b(x)) = (kb(x)).$

(ii) $a(x) \in (a(x)) \subset (b(x)) \iff b(x) | a(x).$

(iii) Si $(a(x)) = (b(x))$, entonces $a(x) = kb(x)$ con $k \in \mathbb{K}.$

Proposición 4.3. Sean I_1, \dots, I_i ideales de $\mathbb{K}[x]$ donde $i \in X$, entonces $\bigcap_{i \in X} I_i$ también es ideal.

Demostración. Si $a(x), b(x) \in \bigcap_{i \in X} I_i$, entonces $\forall i \in X, a(x), b(x) \in I_i$. Así, $\forall i \in X, a(x) + b(x) \in I_i$, de esta manera $a(x) + b(x) \in \bigcap_{i \in X} I_i$. Similarmente, si $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ y $a(x) \in \bigcap_{i \in X} I_i$, tenemos que $\forall i \in X, p(x)a(x) \in I_i$. Así, $p(x)a(x) \in \bigcap_{i \in X} I_i$. \square

Sean $a_1(x), \dots, a_p(x) \in \mathbb{K}[x]$. Entonces tenemos que

$$(a_1(x)) \cap (a_2(x)) \cap \dots \cap (a_p(x)),$$

es un ideal. Por tanto, $\exists! (m(x))$ mónico tal que $(a_1(x)) \cap (a_2(x)) \cap \dots \cap (a_p(x)) = (m(x)).$

Definición 4.9 (Mínimo común múltiplo). Decimos que $m(x)$ es **mínimo común múltiplo** de $a_1(x), \dots, a_p(x).$

Dados $a_1(x), \dots, a_q(x) \in \mathbb{K}[x]$, sea

$$I = \{p_1(x)a_1(x) + \dots + p_q(x)a_q(x) : p_1(x), \dots, p_q(x) \in \mathbb{K}[x]\}.$$

Tenemos que I es un ideal de $\mathbb{K}[x]$. Así, $\exists! d(x) \in \mathbb{K}[x]$ mónico tal que $I = (d(x)).$ Así, $(a_1(x)), \dots, (a_q(x)) \subset (d(x)).$ De esta manera tenemos que $\forall i = 1, \dots, q, d(x) | a_i(x).$ Si $q(x) \in \mathbb{K}[x]$ tal que $\forall i = 1, \dots, q, q(x) | a_i(x)$, tenemos que $q(x) | d(x).$

Definición 4.10 (Máximo común divisor). Se dice que $d(x)$ es el **máximo común divisor**.

Definición 4.11. Si $a(x), b(x) \in \mathbb{K}[x]$ son **primos entre sí** si su máximo común divisor es 1.

Teorema 4.2. Si $\text{mcd}(a(x), b(x)) = 1$ y $a(x) \mid c(x)b(x)$, entonces $a(x) \mid c(x)$.

Demostración. Tenemos que $\exists p(x), q(x) \in \mathbb{K}[x]$ tales que $1 = p(x)a(x) + q(x)b(x)$. Así,

$$c(x) = c(x)p(x)a(x) + c(x)q(x)b(x) \subset (a(x)).$$

□

Definición 4.12. Un polinomio $a(x) \in \mathbb{K}[x]$ es **irreducible** si sus únicos divisores sean k o $ka(x)$, donde $k \in \mathbb{K}/\{0\}$.

Teorema 4.3. Todo polinomio de grado mayor o igual que 1 es producto de polinomios irreducibles.

Demostración. Sea $a(x) \in \mathbb{K}[x]$. Si $a(x)$ es irreducible, tenemos que $a(x) = a(x) \cdot 1$. Si $a(x)$ no es irreducible, tenemos que $\exists p_1(x) \in \mathbb{K}[x]$ tal que $p_1(x) \mid a(x)$ de grado mínimo entre los divisores de $a(x)$. Así, $a(x) = p_1(x)a_1(x)$. Tenemos que $p_1(x)$ es irreducible. Si $a_1(x)$ es irreducible, hemos ganado. Si $a_1(x)$ no es irreducible, tenemos que $\exists p_2(x) \in \mathbb{K}[x]$ tal que $p_2(x) \mid a_1(x)$ de grado mínimo entre los polinomios que dividen $a_1(x)$. Tenemos que $p_2(x)$ es irreducible. Así, $a_1(x) = p_2(x)a_2(x)$, así $a(x) = p_1(x)p_2(x)a_2(x)$. Después de n etapas, tenemos que $a(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_n(x)a_n(x)$, donde $a_n(x)$ será irreducible. □

Proposición 4.4. Sea $p(x) = p_1(x) \cdots p_n(x) = q_1(x) \cdots q_m(x)$, donde $p_i(x), q_j(x)$ son irreducibles. Entonces, tenemos que $n = m$ y los polinomios $p_i(x), q_j(x)$ coinciden salvo en orden y factores escalares.

Demostración. Si $n = 1$, tenemos que $p_1 = q_1(x)q_2(x) \cdots q_m(x)$. Entonces, si $m \neq 1$, tenemos que $p_1(x)$ no es irreducible, lo cual es una contradicción. Por tanto, debe ser que $m = 1$ y $p_1(x) = q_1(x)$. Ahora, asumimos que es cierto para $n - 1$. Tenemos que

$$p_1(x) \cdots p_n(x) = q_1(x) \cdots q_m(x).$$

Así, $p_n(x) \mid q_1(x) \cdots q_m(x)$. Así, tenemos que $p_n(x) \mid q_1(x)$ o $p_n(x) \mid q_2(x) \cdots q_m(x)$.

- En el primer caso, tenemos que $\exists k \in \mathbb{K}/\{0\}$ tal que $p_n(x) = kq_1(x)$. Así, $p_1(x) \cdots p_{n-1}(x) = \frac{1}{k}(q_1(x) \cdots q_{m-1}(x))$. Por hipótesis, tenemos que $n-1 = m-1$ y $p_i(x) = q_j(x)$ salvo escalares no nulos.
- En el segundo caso, tenemos que $p_n(x) \mid q_2 \cdots q_m$, donde podemos iterar el paso anterior.

Llegaremos a un $q_j(x)$ tal que $p_n(x) = kq_j(x)$. Así, solo nos quedan $n - 1$ factores, que podemos reducir a la hipótesis de inducción, y se concluye que $n - 1 = m - 1$, por lo que $n = m$. □

Si $p(x) \in \mathbb{K}[x]$, $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, definimos la aplicación

$$\begin{aligned} p : \mathbb{K} &\rightarrow \mathbb{K} \\ k &\rightarrow p(k) = a_0 + a_1k + a_2k^2 + \cdots + a_nk^n. \end{aligned}$$

Definición 4.13. Se dice que $k \in \mathbb{K}$ es una **raíz** de $p(x)$ si $p(k) = 0$.

Proposición 4.5. Sea $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ de grado mayor o igual que 1, entonces $k \in \mathbb{K}$ es una raíz de $p(x)$ si y sólo si $(x - k) \mid p(x)$.

Demostración. (i) Sean $p(x) = q(x)(x - k) + r(x)$, donde $\text{grad}(r(x)) < 1$ o $r(x) = 0$. Así, tenemos que si $p(k) = 0 = q(k)(k - k) + r(x)$, entonces $(x - k) \mid p(x)$.

(ii) Recíprocamente, si $p(x) = q(x)(x - k)$, tenemos que $p(k) = 0$. □

Definición 4.14. Sea k una raíz de $p(x) \in \mathbb{K}[x]$. Diremos que k es una raíz de $p(x)$ de orden r si $(x - k)^r \mid p(x)$ y $(x - k)^{r+1} \nmid p(x)$.

Observación 4.11. La suma de las multiplicidades de las raíces de un polinomio de grado n es menor o igual que n .

4.2. Vectores y valores propios

Sea $f \in \text{End}(V)$. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V . Tenemos que $\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{u}_i\}}(f) = A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$. Si $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ es otra base de V . Sea $\mathcal{M}_{\{\vec{v}_i\}\{\vec{v}_i\}}(f) = B \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$. Tenemos que

$$(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n) C, \quad C \in \text{GL}(n, \mathbb{K}).$$

Así, tenemos que $B = C^{-1}AC$.

Definición 4.15. Dos matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ son **semejantes** si existe $C \in \text{GL}(n, \mathbb{K})$ tal que $B = C^{-1}AC$.

Sea $f \in \text{End}(V)$ (o $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$).

Definición 4.16. Un vector $\vec{x} \in V$ es un **vector propio** o **autovector** de f si existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}$. Similarmente, se dice que un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ es un **valor propio** o **autovalor** de f si existe $\vec{x} \in V / \{\vec{0}\}$ tal que $f(x) = \lambda\vec{x}$.

Sea $\lambda \in \mathbb{K}$ y sea $L_\lambda = \{\vec{x} \in V : f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}\} = \text{Ker}(f - \lambda id_V) \in \mathcal{L}(V)$. Si λ no es valor propio de f , tenemos que $L_\lambda = \{\vec{0}\}$.

Observación 4.12. En las simetrías los únicos autovalores son $\{-1, 1\}$. En efecto, tenemos que $V = \text{Ker}(s + id_V) \oplus \text{Ker}(s - id_V)$.

Teorema 4.4. Sea $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ valores propios de f distintos 2 a 2, y sean $\vec{x}_i \in L_{\lambda_i} \setminus \{\vec{0}\}$, $\forall i = 1, \dots, p$. Entonces, $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_p\}$ son linealmente independientes.

Demostración. Si $p = 1$, tenemos que $\vec{x}_1 \neq \vec{0}$, por lo que $\{\vec{x}_1\}$ es linealmente independiente. Ahora, consideremos el caso de $p = 2$. Sean $a^1, a^2 \in \mathbb{K}$ tales que $a^1\vec{x}_1 + a^2\vec{x}_2 = \vec{0}$. Así, tenemos que

$$\vec{0} = f(\vec{0}) = f(a^1\vec{x}_1 + a^2\vec{x}_2) = a^1f(\vec{x}_1) + a^2f(\vec{x}_2) = a^1\lambda_1\vec{x}_1 + a^2\lambda_2\vec{x}_2.$$

Así, tenemos que

$$\lambda_1 \cdot \vec{0} = \lambda_1(a^1\vec{x}_1 + a^2\vec{x}_2) = a^1\lambda_1\vec{x}_1 + a^2\lambda_1\vec{x}_2.$$

Así, restando las dos ecuaciones anteriores tenemos que

$$\vec{0} = (a^1\lambda_1 - a^1\lambda_1)\vec{x}_1 + (a^2\lambda_2 - a^2\lambda_1)\vec{x}_2 \Rightarrow \vec{0} = a^2(\lambda_2 - \lambda_1)\vec{x}_2 \Rightarrow a^2 = 0.$$

Así, como $a^1\vec{x}_1 = \vec{0}$, tenemos que $a^1 = 0$. Ahora, asumimos que es cierto para $p - 1$. En el caso de p , sean $\{a^1, \dots, a^p\} \subset \mathbb{K}$ tales que $a^1\vec{x}_1 + \dots + a^p\vec{x}_p = \vec{0}$. Tenemos que

$$\vec{0} = \lambda_1\vec{0} = \lambda_1 a^1\vec{x}_1 + \dots + \lambda_1 a^p\vec{x}_p.$$

Por otro lado tenemos que

$$\vec{0} = f(\vec{0}) = a^1\lambda_1\vec{x}_1 + \dots + a^p\lambda_p\vec{x}_p \Rightarrow a^2(\lambda_2 - \lambda_1)\vec{x}_2 + \dots + a^p(\lambda_p - \lambda_1)\vec{x}_p.$$

Por hipótesis de inducción tenemos que

$$a^2(\lambda_2 - \lambda_1) = a^3(\lambda_3 - \lambda_1) = \dots = a^p(\lambda_p - \lambda_1) = 0.$$

Por tanto, $a^2 = a^3 = \dots = a^p = 0$ y, consecuentemente $a^1\vec{x}_1 = \vec{0} \Rightarrow a^1 = 0$. □

Observación 4.13. Una consecuencia de este teorema es que

$$L_{\lambda_1} \oplus L_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_p}.$$

Observación 4.14. Otra consecuencia interesante es que si $\dim(V) = n$ y $f \in \text{End}(V)$, entonces no puede haber más de n valores propios.

4.3. Polinomio característico

Tenemos que $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}[x] \subset \mathbb{K}(x)$, donde $\mathbb{K}(x)$ denota el cuerpo de las fracciones racionales. Podemos definir la relación de divisibilidad, que es una relación de equivalencia:

$$\forall p(x), p'(x) \in \mathbb{K}[x], (p(x), q(x)) \mathcal{R} (p'(x), q'(x)) \iff p(x)q'(x) = q(x)p'(x).$$

Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$, tenemos que

$$\det(A - xI_{n \times n}) = \begin{vmatrix} a_1^1 - x & a_2^1 & \cdots & a_j^1 & \cdots & a_i^1 & \cdots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 - x & \cdots & a_j^2 & \cdots & a_i^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^j & a_2^j & \cdots & a_j^j - x & \cdots & a_i^j & \cdots & a_n^j \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^i & a_2^i & \cdots & a_j^i & \cdots & a_i^i - x & \cdots & a_n^i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \cdots & a_j^n & \cdots & a_i^n & \cdots & a_n^n - x \end{vmatrix}.$$

Así, tenemos que el valor del determinante será:

$$\det(A - xI_{n \times n}) = (a_1^1 - x) \cdots (a_n^n - x) + q(x) = (-1)^n x^n + (-1)^{n-1} (a_1^1 + \cdots + a_n^n) x^{n-1} + q(x), \text{ grad}(q(x)) \leq n-2.$$

Dado que el término independiente será $\det(A)$,

$$\det(A - xI_{n \times n}) = (-1)^n x^n + (-1)^{n-1} (a_1^1 + \cdots + a_n^n) x^{n-1} + \cdots + \det(A).$$

Sea $B \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$ semejante a $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$. Entonces, existe $C \in \text{GL}(n, \mathbb{K})$ tal que $B = C^{-1}AC$. Así, tenemos que

$$\begin{aligned} \det(B - xI_{n \times n}) &= \det(C^{-1}AC - xC^{-1}C) = \det(C^{-1}AC - C^{-1}xC) = \det(C^{-1}(A - xI_{n \times n})C) \\ &= \det(C^{-1}) \det(A - xI_{n \times n}) \det(C) = \det(A - xI_{n \times n}). \end{aligned}$$

Definición 4.17 (Polinomio característico). Decimos que $\det(A - xI_{n \times n})$ es el **polinomio característico** de A . Si $f \in \text{End}(V)$, el polinomio característico de f es el polinomio característico de A , donde A es la matriz de f en una base. ^a.

^aNormalmente se designa como P_{cf} o $P_{cf}(x)$.

Observación 4.15. Dado que el polinomio característico no depende de la base, la suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz de un endomorfismo es invariante.

Definición 4.18. Llamaremos **traza** de f a $a_1^1 + \cdots + a_n^n = \text{traz}(f)$

Observación 4.16. Tenemos que

$$\begin{aligned} \text{traz} : \text{End}(V) &\rightarrow \mathbb{K} \\ f &\rightarrow \text{traz}(f), \end{aligned}$$

es lineal. Además, $\text{traz}(f \circ g) = \text{traz}(g \circ f)$.

Observación 4.17. Tenemos que si $\lambda \in \mathbb{K}$ es valor propio de f , $\det(A - xI_{n \times n}) = 0$.

Teorema 4.5. $\lambda \in \mathbb{K}$ es un valor propio de f si y solo si λ es raíz de $P_{cf}(x)$. Además, si λ es un valor propio, $\dim(L_\lambda)$ es menor o igual que la multiplicidad de λ como raíz de $P_{cf}(x)$.

Demostración. Tenemos que λ es valor propio de f si y solo si existe $\vec{x} \in V / \{\vec{0}\}$ tal que $(f - \lambda id_V)(\vec{x}) = \vec{0}$, si y solo si $\text{Ker}(f - \lambda id_V) \neq \{\vec{0}\}$, si y solo si $f - \lambda id_V$ no es inyectiva, si y solo si $\det(A - \lambda I_{n \times n}) = 0$, si y solo si λ es raíz de $P_{cf}(x)$. Sea $\lambda \in \mathbb{K}$ valor propio de f y $L_\lambda = \{\vec{x} \in V : f(\vec{x}) = \lambda \vec{x}\}$. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ base de L_λ y $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V . Tenemos que $\forall i = 1, \dots, k$, $f(\vec{u}_i) = \lambda \vec{u}_i$. Así,

$$\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{u}_i\}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & A \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & A_1 \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & A_2 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Tenemos que A está formada por los componentes de las imágenes de los restantes vectores de la base. Si formásemos la matriz de la ecuación característica y desarrollásemos el determinante, está claro que en el polinomio característico aparece un factor de $(\lambda - x)^k$, por lo que k no supera la multiplicidad de la raíz λ en el polinomio característico. También se puede ver de la siguiente forma:

$$P_{cf}(x) = \begin{vmatrix} \lambda - x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda - x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda - x & A_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & A_2 - xI_{(n-k) \times (n-k)} \end{vmatrix} = (\lambda - x)^k |A_2 - I_{(n-k) \times (n-k)}|.$$

□

Definición 4.19. Sea λ un valor propio de f . La **multiplicidad geométrica** de λ como valor propio de f es $\dim(L_\lambda)$. Similarmente, la **multiplicidad algebraica** de λ como valor propio

de f es la multiplicidad de λ como raíz de $P_{cf}(x)$. Entonces

$$m.g(\lambda) \leq m.a(\lambda).$$

4.4. Endomorfismos diagonalizables y triangulables

Definición 4.20. Un endomorfismo f de V es **diagonalizable** si existe $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V formada por vectores propios de f .

Teorema 4.6. Un endomorfismo f es diagonalizable si y solo si $P_{cf}(x)$ se descompone en factores lineales en $\mathbb{K}[x]$ y $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ valor propio de f , $m.g(\lambda) = m.a(\lambda)$.

Demostración. (i) Si $\exists \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V formada por vectores propios de f , entonces

$$\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Por lo que

$$P_{cf}(x) = (\lambda_1 - x)(\lambda_2 - x) \cdots (\lambda_n - x).$$

En efecto,

$$P_{cf}(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda_1 - \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 - \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n - \lambda \end{pmatrix}.$$

Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ valores propios de f , donde $\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$. Entonces, tenemos que $L_{\lambda_1} \oplus L_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus L_{\lambda_k}$. Entonces, tenemos que existen $r_1, r_2, \dots, r_k \geq 1$, con $r_1 + \cdots + r_k = n$, tales que

$$P_{cf}(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}.$$

Entonces, tenemos que

$$\dim(V) \leq \dim(L_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(L_{\lambda_k}) \leq r_1 + \cdots + r_k = n.$$

Así, $\dim(L_{\lambda_i}) = r_i$, $\forall i = 1, \dots, k$. Así, hemos obtenido que $L_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus L_{\lambda_k} = V$.

(ii) Si $P_{cf}(x)$ se descompone en factores lineales de forma que

$$P_{cf}(x) = (\lambda_1 - x)^{r_1} \cdots (\lambda_k - x)^{r_k}.$$

Entonces, tenemos que las raíces del polinomio son valores propios de f , por lo que existen $L_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus L_{\lambda_k}$. Además, como $\dim(L_{\lambda_i}) = r_i$ para $i = 1, \dots, k$, tenemos que $L_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus$

$L_{\lambda_k} = V$, por lo que existe una base de V formada por vectores propios y f es diagonalizable. En efecto, sea $\{\vec{u}_1^i, \dots, \vec{u}_{r_i}^i\}$ base de L_{λ_i} con $i = 1, \dots, k$. Entonces, tenemos que $\bigcup_{i=1, \dots, k} \{\vec{u}_1^i, \dots, \vec{u}_{r_i}^i\}$ es base de V . Así, la matriz de f en esta base será

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_k \end{pmatrix}.$$

□

Observación 4.18. Para ver si un endomorfismo es diagonalizable, hay que resolver el polinomio característico lo que da unas raíces $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ y lo primero que hay que comprobar es si la suma de las multiplicidades coincide con la dimensión de V .

Definición 4.21. Sea $f \in \text{End}(V)$ es **triangulable** si $\exists \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ base de V tal que

$$\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{u}_i\}}(f) = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \cdots & a_n^1 \\ 0 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ 0 & 0 & \cdots & a_n^3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n^n \end{pmatrix}.$$

Observación 4.19. Tenemos que $P_{cf}(x) = \det(A - xI_{n \times n}) = (-1)^n (x - a_1^1) \cdots (x - a_n^n)$.

Teorema 4.7. f es triangulable si y solo si $P_{cf}(x)$ se descompone en factores lineales en $\mathbb{K}[x]$.

Demostración. (i) Evidente.

(ii) Consideremos el caso $n = 2$. Sea $\lambda \in \mathbb{K}$ un valor propio de f y $\vec{x}_1 \in L_\lambda / \{\vec{0}\}$. Entonces tenemos que $f(\vec{x}_1) = \lambda \vec{x}_1$. Si $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ es base de V , tenemos que

$$\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{u}_i\}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & a \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

Asumimos que es cierto para $n - 1$. Sea $\lambda_1 \in \mathbb{K}$ un valor propio de f y sea $\vec{x}_1 \in L_{\lambda_1} / \{\vec{0}\}$. Sea $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$ base de V y sea $L = L(\{\vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n\})$. Tenemos que $L \oplus L(\{\vec{x}_1\}) = V$. Sea p la proyección vectorial de base L y dirección $L(\{\vec{x}_1\})$, y sea $p \circ f \in \text{End}(L)$. Tenemos que $\dim(L) = n - 1$. Tenemos que

$$\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{u}_i\}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a_2^1 & \cdots & a_n^1 \\ 0 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix}.$$

Similarmente, sabemos que si $\vec{x} \in V$,

$$p \circ f(\vec{x}) = p(a_1^1 \vec{x}_1 + \cdots + a_i^n \vec{x}_n) = a_i^2 \vec{x}_2 + \cdots + a_i^n \vec{x}_n.$$

Entonces, tenemos que

$$p \circ f \rightarrow \begin{pmatrix} a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_2^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} \Rightarrow P_{cf}(x) = -(x - \lambda_1) P_{c,p \circ f}(x).$$

Por hipótesis de inducción, existe $\{\vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$ base de L tal que $\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}\{\vec{u}_i\}}(p \circ f) = \begin{pmatrix} \lambda_2 & b_2^2 & \cdots & b_n^2 \\ 0 & \lambda_3 & \cdots & b_n^3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$

Así, en la base $\{\vec{x}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$, la matriz de f es

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & a_2^1 & a_3^1 & \cdots & a_n^1 \\ 0 & \lambda_2 & b_3^2 & \cdots & b_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

□

Observación 4.20. Si p' es la proyección de base $L(\{\vec{x}_1\})$ y dirección L , tenemos que $id_V = p + p'$. Otra forma de decir que f es triangulable, es decir que existe una sucesión de subespacios de V : $\{\vec{0}\} \subset L_1 \subset \cdots \subset L_n = V$ tales que $f(L_i) \subset L_i$ para $i = 1, \dots, n$.

Definición 4.22. Un endomorfismo f de V es **nilpotente** si existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $f^m = 0$ y $f^{m-1} \neq 0$.

Observación 4.21. Si \vec{x} es un vector propio de f , tenemos que $f(\vec{x}) = \lambda \vec{x}, \dots, f^{m-1}(\vec{x}) = \lambda^{m-1} \vec{x}$ y $f^m(\vec{x}) = \lambda^m \vec{x} = \vec{0}$. Es decir, si es nilpotente, el único posible valor propio es el 0. Es decir, en este caso la matriz triangular tiene diagonal nula.

4.5. Teorema de Cayley-Hamilton

Tenemos que $P_{cf}(f) \in \text{End}(V)$. Si A es la matriz de f , tenemos que $P_{cA}(A) \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{K})$. Si $p(x), q(x) \in \mathbb{K}[x]$, tenemos definidas las operaciones

$$p(x) + q(x) = (p + q)(x) = (q + p)(x) = q(x) + p(x).$$

$$p(x)q(x) = q(x)p(x).$$

Similarmente,

$$(p(x) + q(x))(f) = p(f) + q(f).$$

$$(p(x)q(x))(f) = p(f) \circ q(f).$$

Entonces, tenemos que

$$p(A) = \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i\}, \{\vec{u}_i\}}(p(f)).$$

Observación 4.22. Si $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ tal que $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, y $f \in \text{End}(V)$, se define

$$p(f) = a_0 + a_1f + \cdots + a_nf^n \in \text{End}(V).$$

Teorema 4.8.

$$P_{cf}(f) = 0 \in \text{End}(V), \quad P_{CA}(A) = 0.$$

Demostración. Sea $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, entonces $P_{cf}(x) = (-1)^n(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_n)$. Según el teorema 4.7, tenemos que existe una base de V , $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ tal que

$$\begin{aligned} f(\vec{u}_1) &= \lambda_1 \vec{u}_1 \\ f(\vec{u}_2) &= a_2^1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 \\ &\vdots \\ f(\vec{u}_n) &= a_n^1 \vec{u}_1 + \cdots + a_n^{n-1} \vec{u}_{n-1} + \lambda_n \vec{u}_n. \end{aligned}$$

Entonces tenemos que

$$P_{cf}(f) = (-1)^n (f - \lambda_1 \text{id}_V) \circ \cdots \circ (f - \lambda_n \text{id}_V).$$

Para ver que $P_{cf}(f)$ es el endomorfismo nulo, tenemos que ver que se anula sobre la base anterior. Así, $(f - \lambda_1 \text{id}_V)(\vec{u}_1) = \vec{0}$. Dado que $(f - \lambda_1 \text{id}_V) \circ (f - \lambda_2 \text{id}_V) = (f - \lambda_2 \text{id}_V) \circ (f - \lambda_1 \text{id}_V)$, tenemos que $(f - \lambda_2 \text{id}_V) \circ (f - \lambda_1 \text{id}_V)(\vec{u}_1) = \vec{0}$. También tenemos que

$$(f - \lambda_1 \text{id}_V) \circ (f - \lambda_2 \text{id}_V)(\vec{u}_2) = (f - \lambda_1 \text{id}_V) \circ (f - \lambda_2 \text{id}_V)(a_2^1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2) = \vec{0}.$$

Se deja como ejercicio para el lector que esto definitivamente es cierto. Suponemos que es cierto para $i \leq n$. Tenemos que $(f - \lambda_{i-1} \text{id}_V)(\vec{u}_j) = \vec{0}$ para $j = 1, \dots, i-1$. Además,

$$(f - \lambda_i \text{id}_V) \circ (f - \lambda_1 \text{id}_V) \circ \cdots \circ (f - \lambda_{i-1} \text{id}_V) = (f - \lambda_1 \text{id}_V) \circ \cdots \circ (f - \lambda_i \text{id}_V).$$

Así, por hipótesis tenemos que para $j = 1, \dots, i-1$,

$$(f - \lambda_1 \text{id}_V) \circ \cdots \circ (f - \lambda_i \text{id}_V)(\vec{u}_j) = (f - \lambda_i \text{id}_V) \circ (f - \lambda_1 \text{id}_V) \circ \cdots \circ (f - \lambda_{i-1} \text{id}_V)(\vec{u}_j) = \vec{0}.$$

En el caso de \vec{u}_i , tenemos que $(f - \lambda_i \text{id}_V)(\vec{u}_i) = f(\vec{u}_i) - \lambda_i \vec{u}_i = a_i^1 \vec{u}_1 + \cdots + a_i^{i-1} \vec{u}_{i-1}$. Si aplicamos $(f - \lambda_1 \text{id}_V) \circ \cdots \circ (f - \lambda_{i-1} \text{id}_V)$ sobre el resultado anterior, obtendremos el vector nulo, por lo que

$$(f - \lambda_1 \text{id}_V) \circ \cdots \circ (f - \lambda_{i-1} \text{id}_V)(f - \lambda_i \text{id}_V)(\vec{u}_i) = \vec{0}.$$

□

Recordamos que $P_{cf}(x) = \det(A - xI_{n \times n})$, donde $f \in \text{End}(V)$ y A es la matriz asociada a f . Sea $I = \{p(x) \in \mathbb{K}[x] : p(f) = 0\}$. Sabemos que $I \neq \emptyset$. Tenemos que I es un ideal. En efecto, si $p(x), q(x) \in I$,

$$(p(x) + q(x))(f) = p(f) + q(f) = 0.$$

Similarmente, si $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ y $q(x) \in I$, entonces $p(f) \in \text{End}(V)$ y $q(f) = 0$, por lo que $p(f) \circ q(f) = 0$.

Entonces, existe $P_{mf}(x) \in \mathbb{K}[x]$ mónico tal que $I = (P_{mf}(x))$.

Definición 4.23. A $P_{mf}(x)$ lo llamamos **polinomio mínimo** de f . Se dice que $p(x)$ es un **polinomio anulador** de f si $p(x) \in I$.

Definición 4.24. Un subespacio vectorial L de V es **invariante** por f si $f(L) \subset L$.

Observación 4.23. Si $V = L_1 \oplus L_2 \oplus \cdots \oplus L_k$ con $L_i \in \mathcal{L}(V)$ invariante por f para $i = 1, \dots, k$:

$$f|_{L_i} : L_i \rightarrow L_i.$$

Si $\{\vec{u}_1^i, \dots, \vec{u}_k^i\}$ base de L_i para $i = 1, \dots, k$, entonces

$$\{\vec{u}_1^1, \dots, \vec{u}_k^1, \dots, \vec{u}_1^k, \dots, \vec{u}_k^k\},$$

es base de V . Así, tenemos que

$$\mathcal{M}_{\{\vec{u}_i^j\}\{\vec{u}_i^j\}}(f) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_n \end{pmatrix}.$$

Donde $A_j = \mathcal{M}_{\{\vec{u}_i^j\}\{\vec{u}_i^j\}}(f|_{L_j})$.

Si $p(x) \in \mathbb{K}[x]$.

Proposición 4.6. (a) $\text{Ker}(p(f))$ es un subespacio vectorial invariante por f .

(b) $\text{Im}(p(f)) \in \mathcal{L}(V)$ es un subespacio vectorial invariante por f .

Demostración. **(a)** Tenemos que $p(x) \cdot x = x \cdot p(x)$. Así, si $p(f)(\vec{x}) = \vec{0}$,

$$p(f)(f(\vec{x})) = ((p(x) \cdot x)(f))(\vec{x}) = f \circ p(f)(\vec{x}) = f(\vec{0}) = \vec{0}.$$

(b) Si $\vec{x} \in \text{Im}(p(f))$, entonces existe $\vec{y} \in V$ tal que $p(f)(\vec{y}) = \vec{x}$. Así,

$$f(\vec{x}) = f(p(f)(\vec{y})) = (f \circ p(f))(\vec{y}) = p(f) \circ f(\vec{y}) = p(f)(f(\vec{y})) \in \text{Im}(p(f)).$$

□

Teorema 4.9. Sea $p(x)$ un polinomio anulador de f y sea $p(x) = a_1(x) \cdot a_2(x)$, con $a_1(x)$ y $a_2(x)$ primos entre sí. Entonces, $V = \text{Ker}(a_1(f)) \oplus \text{Ker}(a_2(f))$.

Demostración. Tenemos que $\text{mcd}(a_1(x), a_2(x)) = 1$, por lo que existen $p_1(x), p_2(x) \in \mathbb{K}[x]$ tales que

$$1 = p_1(x) a_1(x) + p_2(x) a_2(x).$$

Así, $\forall \vec{x} \in V$,

$$\text{id}_V(\vec{x}) = ((p_1(x) a_1(x)) f)(\vec{x}) + ((p_2(x) a_2(x)) f)(\vec{x}).$$

Así,

$$\vec{x} = \underbrace{(p_1(f) \circ a_1(f))(\vec{x})}_{\in \text{Ker}(a_2(f))} + \underbrace{(p_2(f) \circ a_2(f))(\vec{x})}_{\in \text{Ker}(a_1(f))}.$$

En efecto, tenemos que

$$\begin{aligned} a_2(f) \circ (p_1(f) \circ a_1(f))(\vec{x}) &= p_1(f) \circ \underbrace{(a_1(f) \circ a_2(f))(\vec{x})}_{p(f)} = \vec{0} \\ a_1(f) \circ (p_2(f) \circ a_2(f))(\vec{x}) &= p_2(f) \circ \underbrace{(a_1(f) \circ a_2(f))(\vec{x})}_{p(f)} = \vec{0}. \end{aligned}$$

Finalmente, si $\vec{x} \in \text{Ker}(a_1(f)) \cap \text{Ker}(a_2(f))$, tenemos que

$$\vec{x} = (p_1(f) \circ a_1(f))(\vec{x}) + (p_2(f) \circ a_2(f))(\vec{x}) = p_1(f)(\vec{0}) + p_2(f)(\vec{0}) = \vec{0}.$$

□

Proposición 4.7. Si $p(x) = p_1(x)^{r_1} \cdots p_k(x)^{r_k}$ es la descomposición en factores irreducibles de un polinomio anulador de f , entonces

$$V = \text{Ker}(p_1(f)^{r_1}) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(p_k(f)^{r_k}).$$

Demostración. La demostración se realiza por inducción sobre k .

- (i) Si $k = 2$, queda demostrado por el resultado anterior.
- (ii) Asumimos que el resultado es cierto para $k-1$. Tenemos que los polinomios $p_1(x)^{r_1}, \dots, p_k(x)^{r_k}$ son primos entre sí. Entonces, tenemos que

$$V = \text{Ker}(p_1(f)^{r_1}) \oplus \text{Ker}(p_2(f)^{r_2} \circ \cdots \circ p_k(f)^{r_k}).$$

Por hipótesis de inducción, tenemos que $V = \text{Ker}(p_1(f)^{r_1}) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(p_k(f)^{r_k})$.

□

Proposición 4.8. Sea $P_{mf}(x) = p_1(x)p_2(x)$ con $p_1(x)$ y $p_2(x)$ primos entre sí. Entonces, $V = \text{Ker}(p_1(f)) \oplus \text{Ker}(p_2(f))$. Además, $p_1(x) = P_{m,f|_{\text{Ker}(p_1(f))}}$ y $p_2(x) = P_{m,f|_{\text{Ker}(p_2(f))}}$, salvo por factores escalares.

Demostración. Lo único que hay que demostrar es la última afirmación. Tenemos que $p_1(x)$ es un polinomio anulador de $f|_{\text{Ker}(p_2(f))}$ y lo mismo sucede para $p_2(x)$. Similarmente, $p_1(x)p_2(x)$ es anulador de f , por lo que es producto del polinomio mínimo de f . La demostración termina utilizando el hecho de que muchas cosas son primas entre sí. \square

Proposición 4.9. Sea $P_{mf} = p_1(x)^{r_1} \cdots p_k(x)^{r_k}$ la descomposición en factores irreducibles del polinomio mínimo de f . Entonces, tenemos que $V = \text{Ker}(p_1(f)^{r_1}) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(p_k(f)^{r_k})$.

Observación 4.24. Si cogemos la base de los subespacios anteriores, la matriz de f en esta base se nos quedará de la forma

$$f \rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_k \end{pmatrix}.$$

Donde $A_i = \mathcal{M}(f|_{\text{Ker}(p_i(f)^{r_i})})$, para $i = 1, \dots, k$. Además, tenemos que,

$$P_{m,f|_{\text{Ker}(p_i(f)^{r_i})}}(x) = p_i(x)^{r_i}.$$

Definición 4.25. Un endomorfismo $f \in \text{End}(V)$ es **nilpotente** si existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $f^m = 0$ pero $f^{m-1} \neq 0$.

Observación 4.25. Tenemos que $p_i(f)^{r_i}(x) = P_{m,f|_{\text{Ker}(p_i(f)^{r_i})}}(x)$. Si $P_{mf}(x) = p_1(x)$ se descompone en factores lineales en $\mathbb{K}[x]$ y $p_1(x) = x - \lambda_1$, entonces $p_1(f) = f - \lambda_1$.

Sea f un endomorfismo de índice de nilpotencia $m \in \mathbb{N}$. Sea $\vec{x} \in V$ tal que $f^{m-1}(\vec{x}) \neq \vec{0}$. Sea $L = L(\{\vec{x}, f(\vec{x}), \dots, f^{m-1}(\vec{x})\})$. Tenemos que $\{\vec{x}, f(\vec{x}), \dots, f^{m-1}(\vec{x})\}$ son linealmente independientes. En efecto, si $a_0, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{K}$,

$$a_0\vec{x} + a_1f(\vec{x}) + \cdots + a_{m-1}f^{m-1}(\vec{x}) = \vec{0}.$$

Por tanto,

$$f(a_0\vec{x} + a_1f(\vec{x}) + \cdots + a_{m-1}f^{m-1}(\vec{x})) = a_0f(\vec{x}) + \cdots + a_{m-2}f^{m-1}(\vec{x}) = \vec{0}.$$

Iterando, tenemos que $a_0f^{m-1}(\vec{x}) = \vec{0}$. Como $\vec{x} \notin \text{Ker}(f^{m-1})$, tenemos que $a_0 = 0$. Supongamos que $a_0 = a_1 = \cdots = a_i = 0$, con $i < m$. Entonces, tenemos que

$$a_i f^i(\vec{x}) + a_{i+1} f^{i+1}(\vec{x}) + \cdots + a_{m-1} f^{m-1}(\vec{x}) = \vec{0}.$$

Aplicando f^{m-i-1} , tenemos que

$$\vec{0} = a^i f^{m-1}(\vec{x}).$$

Como vimos anteriormente, $a_i = 0$. Así, concluimos que $a_i = 0$ para $i = 0, 1, \dots, m-1$.

Observación 4.26. Tenemos que L es de dimensión m y $f(L) \subset L$. Además, la matriz de $f|_L$ en la base anterior será de la forma:

$$f|_L \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 4.10. Existe $L' \in \mathcal{L}(V)$ invariante por f tal que $L \oplus L' = V$.

Demostración. Consideremos f^* , que es nilpotente de índice de nilpotencia m . Esto se deduce de que $(f^*)^i = (f^i)^*$. Dado que $f^{m-1} \neq 0$, para algún $\vec{x} \in V$ se tiene que $f^{m-1}(\vec{x}) \neq \vec{0}$. De manera similar, deducimos que existe $\alpha \in V^*$ tal que $\alpha(f^{m-1}(\vec{x})) \neq \vec{0}$. Así, $\{\alpha, f^*(\alpha), \dots, (f^*)^{m-1}(\alpha)\}$ son linealmente independientes. Sea $a_0, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{K}$ tales que

$$a_0\alpha + a_1f^*(\alpha) + \cdots + a_{m-1}(f^*)^{m-1}(\alpha) = 0.$$

Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned} 0 &= \left(a_0\alpha + a_1f^*(\alpha) + \cdots + a_{m-1}(f^*)^{m-1}(\alpha) \right) (f^{m-1}(\vec{x})) \\ &= a_0\alpha(f^{m-1}(\vec{x})) + a_1\alpha(f^m(\vec{x})) + \cdots + a_{m-1}\alpha(f^{2m-2}(\vec{x})) \Rightarrow a_0 = 0. \end{aligned}$$

Supongamos que $a_0 = a_1 = \cdots = a_{i-1} = 0$ para $i < m$. Entonces, tenemos que

$$a_i(f^*)^i(\alpha) + \cdots + a_{m-1}(f^*)^{m-1}(\alpha) = 0.$$

Componiendo, obtenemos que

$$\begin{aligned} 0 &= \left(a_i(f^*)^i\alpha + \cdots + a_{m-1}(f^*)^{m-1}\alpha \right) (f^{m-i-1}(\vec{x})) \\ &= a_i\alpha(f^{m-i-1}(\vec{x})) + \cdots + a_{m-1}\alpha(f^{2m-i-2}(\vec{x})) \Rightarrow a_i = 0. \end{aligned}$$

Sea $W = L \left(\left\{ \alpha, f^*(\alpha), \dots, (f^*)^{m-1}(\alpha) \right\} \right)$. Tenemos que $\dim(W) = m$. Sea $L' = W^\perp$, entonces $\dim(L') = \dim(W^\perp) = n - m$. Si $\vec{y} \in L \cap L'$, entonces

$$\vec{y} = a_0\vec{x} + a_1f(\vec{x}) + \cdots + a_{m-1}f^{m-1}(\vec{x}),$$

y también tenemos que

$$\vec{0} = (f^*)^{m-1}(\alpha)(\vec{y}) = \alpha(a_0f^{m-1}(\vec{x}) + a_1f^m(\vec{x}) + \cdots + a_{m-1}f^{2m-2}(\vec{x})) = a_0\alpha(f^{m-1}(\vec{x})) \Rightarrow a_0 = 0.$$

Supongamos que $a_0 = a_1 = \cdots = a_{i-1} = 0$ con $i < m$. Así, tenemos que

$$\begin{aligned} a_if^i(\vec{x}) + \cdots + a_{m-1}f^{m-1}(\vec{x}) &= \vec{0} \\ \vec{y} &= a_if^i(\vec{x}) + \cdots + a_{m-1}f^{m-1}(\vec{x}) \end{aligned}$$

$$\vec{0} = (f^*)^{m-i-1}(\alpha)(a_if^i(\vec{x}) + \cdots + a_{m-1}f^{m-1}(\vec{x})) = \alpha(a_if^{m-i-1}(\vec{x}) + a_{m-1}f^{2m-i-1}(\vec{x})) \Rightarrow a_i = 0.$$

Así, tenemos que $a_i = 0$ para $i = 0, 1, \dots, m-1$, por lo que $V = L \oplus L'$. \square

Observación 4.27. Supongamos que $P_{cf}(x) = (-1)^n (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}$. Entonces, tenemos que $V = \text{Ker}(f - \lambda_1 \text{id}_V)^{r_1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(f - \lambda_k \text{id}_V)^{r_k}$. Tenemos que $(f - \lambda_i \text{id}_V)^{r_i}$ es nilpotente con índice de nilpotencia menor o igual que r_i .

Consideremos $f \in \text{End}(V)$ tal que $f^m = 0$ pero $f^{m-1} \neq 0$. Sea $\text{Ker}(f^{m-1}) \subsetneq \text{Ker}(f^m)$, sea $L \in \mathcal{L}(V)$ tal que $L \oplus \text{Ker}(f^{m-1}) = \text{Ker}(f^m)$ y sea $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r\}$ base de L . Entonces, la familia de vectores

$$\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r, f(\vec{x}_1), \dots, f(\vec{x}_r), \dots, f^{m-1}(\vec{x}_1), \dots, f^{m-1}f(\vec{x}_r)\}$$

es linealmente independiente. En efecto, si $c_j^i \in \mathbb{K}$, para $i = 1, \dots, r$ y $j = 0, \dots, m-1$, tenemos la combinación lineal

$$\sum_{i=1, j=0}^{r, m-1} c_j^i f^j(\vec{x}_i) = \vec{0}.$$

Tenemos que si aplicamos f^{m-1} ,

$$\begin{aligned} \vec{0} &= f^{m-1} \left(\sum_{i=1, j=0}^{r, m-1} c_j^i f^j(\vec{x}_i) \right) = \sum_{i=1, j=0}^{r, m-1} c_j^i f^{j+m-1}(\vec{x}_i) = \sum_{i=1}^r c_1^i f^{m-1}(\vec{x}_i) = c_1^1 f^{m-1}(\vec{x}_1) + \cdots + c_1^r f^{m-1}(\vec{x}_r) \\ &= f^{m-1}(c_1^1 \vec{x}_1 + \cdots + c_1^r \vec{x}_r). \end{aligned}$$

Entonces, tenemos que $c_1^1 \vec{x}_1 + \cdots + c_1^r \vec{x}_r \in L \cap \text{Ker}(f^{m-1})$, por lo que

$$c_1^1 \vec{x}_1 + \cdots + c_1^r \vec{x}_r = \vec{0}.$$

Al ser linealmente independientes, tenemos que $c_1^i = 0$ para $i = 1, \dots, r$. Repitiendo este cálculo, llegamos a que $c_j^i = 0$ para $i = 1, \dots, r$ y $j = 0, \dots, m-1$.

A continuación, tenemos que $\text{Ker}(f^{m-2}) \subsetneq \text{Ker}(f^{m-1})$, ampliamos la base de $\text{Ker}(f^{m-2})$ hasta obtener una base de $\text{Ker}(f^{m-1})$. Hacemos esto con todos los núcleos.

Observación 4.28. El número de bloques de Jordan de orden mayor o igual que i es la dimensión del núcleo de f^i menos la dimensión del núcleo de f^{i-1} .

Dado $f \in \text{End}(V)$, si existe canónica de f , tenemos que el polinomio característico tendrá la forma: $P_{cf}(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}$. Entonces, tenemos que $V = L_1 \oplus \cdots \oplus L_k$, donde $\dim(L_i) = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{id}_V)^{r_i}$ con $i = 1, \dots, k$. Así, si $\dim(L_i) = r_i$,

$$P_{cf}(x) = (x - \lambda_1)^{s_1} \cdots (x - \lambda_k)^{s_k}, \quad s_i \leq r_i.$$

tenemos que $f|_{L_i} \in \text{End}(L_i)$, $f - \lambda_i \text{id}_V$ es nilpotente de límite de nilpotencia s_i . Además, tenemos que $\text{Ker}(f - \lambda_i \text{id}_V) \subsetneq \cdots \subsetneq \text{Ker}(f - \lambda_i \text{id}_V)^{s_i-1} = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{id}_V)^{s_i}$.

Ejemplo 4.2. Consideremos la matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Tenemos que $P_{cA}(x) = -(x-1)^3$.

Calculamos la dimensión de $\text{Ker}(f - \text{id}_V)$,

$$A - I = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -2 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (A - I)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces, tenemos que $\dim(\text{Ker}(f - id_V)) = 1$ y $\dim(\text{Ker}(f - id_V)^2) = 2$. Así, debe ser que $(A - I)^3 = 0$. Tenemos que la ecuación de $\text{Ker}(f - id_V)^2$ será $x + 2y - z = 0$. Tenemos que coger un vector en L_2 que no esté en L_1 . Entonces, cogemos $\vec{u}_1 = (1, 0, 0)$ y $\vec{u}_2 = (3, -2, -1) = (f - id_V)(1, 0, 0)$. Para conseguir \vec{u}_3 :

$$(A - I)^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Así, $\vec{u}_3 = (1, -1, -1)$. Entonces, tenemos que la matriz cambio de base será

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Y la forma de Jordan será

$$C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 4.3. Consideremos $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Entonces, $P_{cB} = -(x - 1)^2(x + 1)$. Así,

$V = \text{Ker}(f - id_V)^2 \oplus \text{Ker}(f + id_V)$. Vamos a calcular la dimensión de L_1 :

$$(B - I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Así, $\dim(L_1) = 2$ y $\dim(L_2) = 1$. Ahora buscamos un vector que esté en L_1 pero no en L_2 . Obtenemos las ecuaciones $y + z = 0$ y $x = 0$. Entonces, cogemos $\vec{u}_1 = (1, 0, 0)$ y $\vec{u}_2 = (0, -1, 1)$.