

Paskaita 0

Pradmenys: prisiminimas

Šis lapas prasideda trumpa keturių skaičiavimo įgūdžių, kuriais remiasi pirmosios paskaitos, diagnostika. *Šaltai*, be užrašų, atlikite tik žemiau išvardytus septynis uždavinius ir sustokite po 45 minučių. Paskui pasitikrinkite savo darbą ir naudokitės pabaigoje esančiu nukreipimo vadovu: taisykite tik silpnąją giją ir atlikite jos pakartotinę patikrą. Likusieji algebros uždaviniai sudaro tikslinę rinkinį, o ne antrą šaltą testą. Visur $\mathbb{F}$ žymi $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$.

Vertinamoji algebros diagnostika (40–45 min.). Spręskite uždavinius **0.1, 0.2, 0.9, 0.15, 0.22, 0.23 ir 0.30**. Vieną tašką skirkite tik už teisingą rezultatą, paremtą pakankamu sprendimo aprašu, kad būtų matyti metodas. Šios septynios patikros apima kompleksinę aritmetiką ir trigonometrines formas, suderinamas matricų operacijas, determinantus, redukavimą eilutėmis, nulinės erdvės bazes ir suderinamumą pradedamą klasifikaciją.

- **Pasirengę:** bent 6/7, įskaitant 0.9, 0.15 ir 0.30, taip pat bent vieną teisingą kompleksinę patikrą (0.1–0.2) ir vieną teisingą redukavimo eilutėmis patikrą (0.22–0.23).
- **Tikslinis taisyimas:** 4–5 taškai arba bet kuri trūkstama aukščiau nurodyta privaloma gija. Naudokite atitinkamą prisiminimo skyrių ir rinkinio maršrutą, paskui prieš 1 paskaitą atlikite įvardytą pakartotinę patikrą.
- **Pirmiausia atstatyti:** 0–3 taškai arba spragos dviejose ar daugiau gijų. Su atvertais užrašais pereikite kiekvieną silpną maršrutą, o paskui kitą dieną iš naujo atlikite septynis diagnostines patikras.

Atskiras pasirengimo analizei maršrutas. Uždaviniai 0.32–0.36 yra nevertinama, 15–20 minučių trukmės nukreipimo patikra diferencijavimui, integravimui dalimis, elementariosioms tiesinėms diferencialinėms lygtims, eilutėms ir Furjė koeficientams. Jie neįeina į septynių taškų algebros įvertį ir nėra laikomi žinomais pačioje 0 paskaitoje. Naudokite juos prieš vėlesnes taikymų savaites; šis lapas nepakeičia matematinės analizės kurso.

Kompleksinė aritmetika

Pratimas 0.1 (diagnostic) Tarkime $z = 3 + 2i$ ir $w = 1 + i$. Apskaičiuokite $z + w$, zw , z/w , jungtinį $\bar{z}$ ir modulį $|z|$.

Atsakymas. $z + w = 4 + 3i$; $zw = 1 + 5i$; $z/w = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$; $\bar{z} = 3 - 2i$; $|z| = \sqrt{13}$.

Pratimas 0.2 (diagnostic) Užrašykite $1 - i$ trigonometriniu forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite $(1 - i)^8$.

Atsakymas. $1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$, todėl $(1 - i)^8 = 16$.

Pratimas 0.3 (computational) Raskite visus kompleksinius skaičius z , kuriems $z^2 = i$.

Užomina. Užrašykite i trigonometriniu forma ir traukite kvadratinės šaknis: argumentą padalinkite pusiau ir nepamirškite, kad kvadratinė lygtis turi dvi šaknis.

Atsakymas. $z = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \pm e^{i\pi/4}$.

Pratimas 0.4 (computational) Tarkime $z = 3 + i$ ir $w = 1 + 2i$. Apskaičiuokite $z + w$, zw , z/w , jungtinį $\bar{z}$ ir modulį $|z|$.

Atsakymas. $z + w = 4 + 3i$; $zw = 1 + 7i$; $z/w = 1 - i$; $\bar{z} = 3 - i$; $|z| = \sqrt{10}$.

Pratimas 0.5 (computational) Užrašykite $1 + i$ trigonometriniu forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite $(1 + i)^6$.

Atsakymas. $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$, todėl $(1 + i)^6 = -8i$.

Pratimas 0.6 (computational) Užrašykite $\sqrt{3} + i$ trigonometriniu forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite $(\sqrt{3} + i)^4$, pateikdami atsakymą Dekarto forma.

Atsakymas. $\sqrt{3} + i = 2 e^{i\pi/6}$, todėl $(\sqrt{3} + i)^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$.

Pratimas 0.7 (bridge) Kompleksiniams skaičiams $z = a + bi$ ir $w = c + di$ įrodykite, kad $\overline{zw} = \bar{z} \bar{w}$.

Pratimas 0.8 (extension) Raskite visus keturis kompleksinius skaičius z , kuriems $z^4 = -4$.

Užomina. Užrašykite -4 trigonometriniu forma kaip $4 e^{i\pi}$; ketvirtosios šaknies modulis yra $4^{1/4} = \sqrt{2}$, o argumentas $\frac{1}{4}(\pi + 2\pi k)$, kai $k = 0, 1, 2, 3$.

Atsakymas. $z \in \{1 + i, -1 + i, -1 - i, 1 - i\}$, t. y. $z = \pm 1 \pm i$.

Matricų algebra

Pratimas 0.9 (diagnostic) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite AB , BA ir A^T bei patikrinkite, kad $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, nors $AB \neq BA$.

Atsakymas. $AB = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$; $\text{tr}(AB) = 3 = \text{tr}(BA)$.

Pratimas 0.10 (computational) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite AB ir BA bei patikrinkite, kad $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, nors $AB \neq BA$.

Atsakymas. $AB = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$; $\text{tr}(AB) = 4 = \text{tr}(BA)$.

Pratimas 0.11 (computational) Matricai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ apskaičiuokite A^2 ir A^3 .

Atsakymas. $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Pratimas 0.12 (bridge) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 1+i & 2-i \\ 0 & 3i \end{pmatrix}$ virš $\mathbb{C}$. Užrašykite transponuotą matricą A^T ir jungtinę transponuotą $A^\dagger = \overline{A}^T$.

Atsakymas. $A^T = \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 2-i & 3i \end{pmatrix}$, $A^\dagger = \begin{pmatrix} 1-i & 0 \\ 2+i & -3i \end{pmatrix}$.

Pratimas 0.13 (extension) Tos pačios formos kvadratinėms matricoms A, B įrodykite ciklinę tapatybę $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Pratimas 0.14 (bridge) Matricoms $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ ir $B \in \mathcal{M}_{n \times p}(\mathbb{F})$ įrodykite, kad $(AB)^T = B^T A^T$.

Determinantai

Pratimas 0.15 (diagnostic) Apskaičiuokite $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

Atsakymas. $\det = 1$; apgręžiama.

Pratimas 0.16 (computational) Naudodami 2×2 formulę apgręžkite $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Pratimas 0.17 (bridge) Matricai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ raskite visas λ reikšmes, kurioms $\det(\lambda I - A) = 0$. (Šios reikšmės 5 savaitę vėl pasirodys kaip A tikrinės reikšmės.)

Atsakymas. $\lambda = 1$ ir $\lambda = 3$.

Pratimas 0.18 (computational) Apskaičiuokite $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

Atsakymas. $\det = 4$; apgręžiama.

Pratimas 0.19 (computational) Tarkime $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $\det A$, $\det B$ ir $\det(AB)$ bei patvirtinkite, kad $\det(AB) = \det A \det B$.

Atsakymas. $\det A = -2$, $\det B = 6$, $\det(AB) = -12 = (-2)(6)$.

Pratimas 0.20 (extension) Apskaičiuokite blokinį-įstrižaininį determinantą $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Užomina. Determinantas su nuliniu neįstrižaininiu bloku išsiskaido į įstrižaininių blokų determinantų sandaugą.

Atsakymas. $\det = 6$.

Pratimas 0.21 (extension) 2×2 matricoms A, B įrodykite, kad $\det(AB) = \det A \det B$, tiesiogiai iš elementų.

Gauso eliminacija

Pratimas 0.22 (diagnostic) Išspręskite, redukuodami eilutėmis,

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2, \\ x - y + 2z &= 5, \\ 2x + y - z &= 2. \end{aligned}$$

Atsakymas. $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ (vienintelis).

Pratimas 0.23 (diagnostic) Raskite $Ax = 0$ sprendinių erdvės (nulinės erdvės) bazę, kur $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, ir nurodykite jos dimensiją.

Užuomina. Redukuokite A eilutėmis, nustatykite bazinius ir laisvuosius stulpelius, paskui išreikškite bazinius kintamuosius per laisvuosius.

Atsakymas. Bazė $\{(1, 1, 0, 0), (-2, 0, 1, 1)\}$; dimensija 2.

Pratimas 0.24 (computational) Apskaičiuokite A^{-1} , redukuodami eilutėmis išplėstąjį bloką $[A \mid I]$, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Pratimas 0.25 (computational) Išspręskite, redukuodami eilutėmis,

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, \\ x - y + z &= 2, \\ 2x + y - z &= 1. \end{aligned}$$

Atsakymas. $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ (vienintelis).

Pratimas 0.26 (computational) Aprašykite visą sprendinių aibę sistemos

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3, \\ 2x + y + z &= 3, \end{aligned}$$

forma „atskirasis sprendinys + nulinės erdvės tiesinis apvalkalas“.

Atsakymas. $(x, y, z) = (1, 1, 0) + t(-1, 1, 1), t \in \mathbb{R}$.

Pratimas 0.27 (computational) Apskaičiuokite A^{-1} , redukuodami eilutėmis išplėstąjį bloką $[A \mid I]$, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pratimas 0.28 (bridge) Tarkime $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$. Įrodykite, kad nulinė erdvė $\text{null } A = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$ yra uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu (taigi ji yra $\mathbb{F}^n$ poerdvis).

Pratimas 0.29 (extension) Su kuriomis realiosiomis a reikšmėmis sistema

$$\begin{aligned} ax + y + z &= 1, \\ x + ay + z &= 1, \\ x + y + az &= 1 \end{aligned}$$

turi vienintelį sprendinį, be galo daug sprendinių ar neturi sprendinio? Vienaties atveju pateikite sprendinį.

Užuomina. Sudėję visas tris lygtis, gausite $(a+2)(x+y+z) = 3$; atėmę poromis, gausite $(a-1)(x-y) = 0$ ir $(a-1)(y-z) = 0$. Koeficientų matricos determinantas yra $(a-1)^2(a+2)$.

Atsakymas. Vienintelis tada ir tik tada, kai $a \neq 1$ ir $a \neq -2$, su $x = y = z = \frac{1}{a+2}$; be galo daug, jei $a = 1$ (plokštuma $x + y + z = 1$); nėra sprendinio, jei $a = -2$.

Pratimas 0.30 (diagnostic) Klasifikuokite kiekvieną pateiktą RREF išplėstąją matricą: sprendinių nėra, sprendinys vienintelis ar sprendinių yra be galo daug. Kiekvienai suderinamai sistemai nurodykite visą jos sprendinių aibę.

$$(a) \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right], \quad (b) \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad (c) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right].$$

Atsakymas. (a) Vienintelis: $(2, -1)$. (b) Sprendinių nėra. (c) Be galo daug: $(x, y, z) = (4, -1, 0) + t(2, -3, 1), t \in \mathbb{R}$.

Pratimas 0.31 (repair) Redukuokite eilutėmis ir klasifikuokite kiekvieną sistemą, o kai ji suderinama, nurodykite visą sprendinių aibę:

$$\begin{aligned} (a) \quad & x + y = 1, \quad x - y = 3, \\ (b) \quad & x + y = 1, \quad 2x + 2y = 3, \\ (c) \quad & x + y = 1, \quad 2x + 2y = 2. \end{aligned}$$

Atsakymas. (a) Vienintelis: $(2, -1)$. (b) Sprendinių nėra. (c) Be galo daug: $(x, y) = (1, 0) + t(-1, 1), t \in \mathbb{R}$.

Atskiras pasirengimo analizei maršrutas

Atlikite šias penkias patikras be užrašų per 15–20 minučių prieš taikymų savaites. Jos neprisideda prie pasirengimo algebrai įvertio.

Pratimas 0.32 (analysis route) Diferencijuokite $f(t) = t^2 e^{-t}$.

Atsakymas. $f'(t) = e^{-t}(2t - t^2)$.

Pratimas 0.33 (analysis route) Integravimu dalimis apskaičiuokite $\int_0^1 t e^t dt$.

Atsakymas. 1.

Pratimas 0.34 (analysis route) Raskite bendrąjį realųjį lygties $y'' - 3y' + 2y = 0$ sprendinį.

Atsakymas. $y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$.

Pratimas 0.35 (analysis route) Nustatykite, ar $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n}$ konverguoja, ir, jei taip, raskite jos sumą.

Atsakymas. Ji konverguoja į $\frac{3}{2}$.

Pratimas 0.36 (analysis route) Funkcijai $f(x) = x$ intervale $[-\pi, \pi]$ apskaičiuokite pirmąjį Furjė sinusinį koeficientą $b_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx$.

Atsakymas. $b_1 = 2$.

Rezultatų skaitymas

Sekite tik praleistos diagnostinės gijos maršrutu. Dirbkite atsivertę prisiminimą, uždarykite jį įvardytai pakartotinei patikrai ir, prieš skelbdami giją pataisyta, reikalaukite teisingo rezultato su sprendimu.

- ▶ **Kompleksinė aritmetika** (diagnostika 0.1–0.2): dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §1; pasipraktikuokite su 0.3–0.6; pakartotinei patikrai naudokite 0.4 ir 0.5. Uždavinys 0.7 yra įrodymo tiltas, o 0.8 — papildomas; nė vienas nevertinamas pasirengimui.
- ▶ **Matricų algebra** (diagnostika 0.9): dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §2; praktikuokite ir pakartotinai tikrinkite su 0.10–0.11. Uždavinys 0.12 yra jungtinės transponuotos tiltas, o 0.13–0.14 — įrodymų papildymai ir tiltai; jie į pasirengimo įvertį neįeina.
- ▶ **Determinantai** (diagnostika 0.15): dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §3; pasipraktikuokite su 0.16 ir 0.18–0.19; pakartotinei patikrai naudokite 0.18. Uždavinys 0.17 yra 5 savaitės charakteringojo polinomo tiltas; 0.20–0.21 yra papildomi.
- ▶ **Gauso eliminacija** (diagnostika 0.22–0.23 ir 0.30): dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §4; pasipraktikuokite su 0.24–0.27; suderinamumą ir pilnas sprendinių aibes pakartotinai patikrinkite su 0.31. Uždavinys 0.28 yra 1 paskaitos poerdvių tiltas, o 0.29 — parametrinės šeimos papildymas; nė vienas nevertinamas pasirengimui.

Nukreipimas analizėje. Uždaviniams 0.32–0.36: 4–5 teisingi reiškia, kad vėlesnis taikymų tiltas parengtas; 2–3 — taisykite tik įvardytas temas; o 0–1 — prieš tas savaites susitarkite dėl matematinės analizės (metodų) kartojimo. 0.32 nukreipia į sandaugos ir sudėtinės funkcijos taisykles, 0.33 — į integravimą dalimis, 0.34 — į pastoviųjų koeficientų diferencialines lygtis (prieš 1 ir 6 paskaitas), 0.35 — į geometrines eilutes (prieš 6 ir 13 paskaitas), o 0.36 — į Furjė koeficientus (prieš 13 paskaitą). Naudokitės ankstesniais matematinės analizės (metodų) užrašais ar konsultacijomis, išspręskite du panašius pavyzdžius, o paskui kitą dieną be užrašų perdarykite praleistą patikrą.