

A
Normalized contribution
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
cos α (coupling)
sin α (frequency)
−5
0
5
X–SCN lag
(phase-equivalent h)
B
Period fit
Coupling fit
Memory
3.42–3.47 h
3.00–3.06 h
240 h
10^1
10^2
Relaxation time (h)
C
Predicted X–SCN lag
(phase-equivalent h)
2
1
0
−1
−2
−3
−30
0
14
Time relative to DD
release (days)
D
Systemic memory, M_X (a.u.)
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.10
−0.12
−30
0
14
Time relative to DD
release (days)
E
Behavioral period
in vivo (h)
24.50
24.25
24.00
23.75
23.50
23.25
23.00
22.75
SP
LP
LD
T22
T26
F
D period ex vivo (h)
25.5
25.0
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
SP
LP
LD
T22
T26
G
V period ex vivo (h)
25.5
25.0
24.5
24.0
23.5
23.0
SP
LP
LD
T22
T26
H
D–V phase gap
first 7 days (h)
3
2
1
0
−1
−2
SP
LP
LD
T22
T26
SP
LP
LD
T22
T26
Oscillatory X
Independent reduction
Fitting target